

Analisi Matematica II

Analisi complessa

Virginia De Cicco
Sapienza Univ. di Roma

Potenze e funzioni trigonometriche

La funzione potenza in campo complesso

Definiamo la *funzione potenza in campo complesso*.

Si tratta di definire una funzione olomorfa su un aperto contenente la semiretta reale positiva, la cui restrizione a tale semiretta coincida con la funzione potenza in campo reale.

Per ogni coppia $\beta \in \mathbb{C}$ e $z \in \mathbb{C}^*$ (ossia $z \neq 0$) si definisce

$$\underline{z}^\beta := e^{\beta \log z}.$$

In generale ci sono infinite determinazioni (come per il logaritmo). La determinazione principale è

$$z^\beta := e^{\beta \operatorname{Log} z}$$

e si chiama *potenza principale*.

Tale funzione è definita in \mathbb{C}^* ed è continua ed olomorfa in \mathbb{C}^{**} .

Esempi

$$1) \underline{1}^i = e^{i \log 1} = e^{i(\log|1| + i \arg 1)} = e^{-2k\pi}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

e per $k = 0$ si ha la determinazione principale $1^i = e^0 = 1$;

$$2) \underline{i}^i = e^{i \log i} = e^{i(\log|i| + i \arg i)} = e^{-\arg i} = e^{-(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

e per $k = 0$ si ha la determinazione principale $i^i = e^{-\frac{\pi}{2}}$. Sorpresa!

Domanda a risposta multipla

Uno solo dei seguenti numeri è reale. Quale?

- a) π^i
- b) i^π
- c) e^i
- d) i^i .

Soluzione : d)

Domanda a risposta multipla

Uno dei seguenti numeri non è reale. Quale?

- a) π^π
- b) $(-\pi)^\pi$
- c) $\pi^{-\pi}$
- d) $(2\pi)^\pi$.

Soluzione : b)

La funzione potenza in campo complesso

Vediamo ora dei casi particolari:

1) Sia $\beta \in \mathbb{R}_+$.

In tal caso, la potenza (sia la sua determinazione principale, che tutte le altre) è definita anche in $z = 0$ e si ha $0^\beta = 0$:

infatti

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^\beta = \lim_{z \rightarrow 0} e^{\beta(\log|z| + i\text{Arg}(z))} = \lim_{z \rightarrow 0} e^{i\beta\text{Arg}(z)} \lim_{z \rightarrow 0} e^{\beta\log|z|} = 0$$

poichè $\lim_{z \rightarrow 0} e^{\beta\log|z|} = 0$ e $|e^{i\beta\text{Arg}(z)}| = 1$.

Quindi in questo caso z^β è definita in tutto \mathbb{C} e continua in $\mathbb{C}^{**} \cup \{0\}$.

La funzione potenza in campo complesso

2) Sia $\beta \in \mathbb{N} : \beta = n$.

In tal caso, c'è una sola determinazione: infatti a causa della periodicità dell'esponenziale (complesso) di periodo $2\pi i$ si ha

$$z^\beta = e^{n \log z} = e^{n(\log|z| + i(\text{Arg}(z) + 2k\pi))} = e^{n(\log|z| + i(\text{Arg}(z)))} = e^{n \text{Log} z}.$$

Inoltre z^β coincide con l'usuale potenza

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ volte},$$

definita in campo complesso, poichè

$$z^\beta = e^{n \text{Log} z} = e^{n \log|z| + i n \text{Arg}(z)} = e^{\log|z|^n} e^{i n \text{Arg}(z)} =$$

$$|z|^n (\cos(n \text{Arg}(z)) + i \sin(n \text{Arg}(z))) = z^n.$$

Si noti che in tal caso z^β è definita, continua ed olomorfa in tutto \mathbb{C} .

Analogamente, nel caso $\beta \in \mathbb{Z}$, $\beta = -n$, z^β è definita, continua ed olomorfa in tutto \mathbb{C}^* .

La funzione potenza in campo complesso

3) Sia $\beta \in \mathbb{Q}$:

$$\beta = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* := \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

In questo caso ci sono n determinazioni, quelle della radice n -esima di z :

infatti per ogni $k \in \mathbb{Z}$ si ha

$$z^\beta = e^{\frac{1}{n} \log z} = e^{\frac{1}{n} (\log |z| + i(\operatorname{Arg}(z) + 2k\pi))} =$$

$$= e^{\log |z| \frac{1}{n}} e^{i \left(\frac{\operatorname{Arg}(z) + 2k\pi}{n} \right)} = |z|^{\frac{1}{n}} \left(\cos \left(\frac{\operatorname{Arg}(z) + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\operatorname{Arg}(z) + 2k\pi}{n} \right) \right)$$

ma solo $k = 0, 1, \dots, n-1$ danno luogo a valori distinti (infatti a causa della periodicità del seno e del coseno di periodo 2π , per $k = n$ si ottiene lo stesso valore che si ottiene per $k = 0$ e così via).

Quindi per $k = 0, 1, \dots, n-1$ la formula precedente ridà gli n valori della radice n -esima di z .

La funzione potenza in campo complesso

In questo caso ($\beta = \frac{1}{n}$) la potenza z^β (con tutte le sue determinazioni) è definita e continua in \mathbb{C} ed è olomorfa in \mathbb{C}^{**} .

In maniera analoga si definisce z^β se β è un qualunque numero razionale, $\beta = \frac{m}{n}$, con $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$, n ed m primi tra di loro.

Basta considerare le n radici n -esime del numero z^m .

Si osservi infine che grazie alle usuali regole di derivazione ed alle formule viste si ha per ogni $z \in \mathbb{C}^{**}$ e per ogni $\beta \in \mathbb{C}$

$$\frac{d}{dz} z^\beta = \frac{d}{dz} e^{\beta \log z} = e^{\beta \log z} \frac{\beta}{z} = z^\beta \frac{\beta}{z} = \beta z^{\beta-1}.$$

Funzioni circolari in campo complesso

Definiamo ora le *funzioni circolari ed iperboliche in campo complesso*.

Come prima, si tratta di definire delle funzioni olomorfe su un aperto contenente la semiretta reale positiva, la cui restrizione a tale semiretta coincida con le analoghe funzioni in \mathbb{R} .

Sia $z = ix$, con $x \in \mathbb{R}$, allora

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x.$$

Sommando e sottraendo si ha per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Quindi per definire un'estensione di coseno e seno al campo complesso si definiscono per ogni $z \in \mathbb{C}$

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Funzioni circolari in campo complesso

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Dalla $2\pi i$ -periodicità della funzione esponenziale si deduce la 2π -periodicità delle funzioni seno e coseno.

Si può dimostrare che le funzioni circolari non hanno altri zeri che quelli della loro restrizione all'asse dei numeri reali.

Infatti si verifica facilmente, dato $z = x + iy$, che

$$\cos z = 0 \quad \text{sse} \quad y = 0 \quad \text{e} \quad \cos x = 0$$

$$(x = \pi/2 + k\pi, \text{ con } k \in \mathbb{Z})$$

$$\sin z = 0 \quad \text{sse} \quad y = 0 \quad \text{e} \quad \sin x = 0$$

$$(x = k\pi, \text{ con } k \in \mathbb{Z}).$$

Funzioni iperboliche in campo complesso

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \operatorname{sen} z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Analogamente al campo reale, si definiscono le funzioni coseno e seno iperbolico nel seguente modo:

$$\cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}.$$

Tutte queste funzioni sono intere (poichè l'esponenziale lo è), cioè definite ed olomorfe in tutto \mathbb{C} .

Funzioni circolari ed iperboliche in campo complesso

Usando le definizioni si verifica facilmente che valgono le usuali formule delle derivate

$$D\cos z = -\operatorname{sen} z, \quad D\operatorname{sen} z = \cos z,$$

$$D\cosh z = \operatorname{senh} z, \quad D\operatorname{senh} z = \cosh z$$

e valgono le identità

$$\cos^2 z + \operatorname{sen}^2 z = 1$$

$$\cosh^2 z - \operatorname{senh}^2 z = 1.$$

In campo complesso non è vero che seno e coseno sono funzioni limitate. Infatti si noti che, considerata la restrizione della funzione $\cos z$ all'asse immaginario (cioè $z = iy$, $y \in \mathbb{R}$), si ha

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \cos(iy) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^{-y} + e^y}{2} = +\infty.$$

Domanda a risposta multipla

Solo una delle seguenti affermazioni è vera

- a) $|\sin(3i)| = 1$ b) $|\sin(3i)| > 1$
c) $|\sin(3i)| < 1$ d) $|\sin(3i)| = 3$.

Soluzione : b)

Domanda a risposta multipla

Solo una delle seguenti identità è vera

a) $\sin iz = i \sinh z$ b) $\sin iz = i \sinh iz$

c) $\sin iz = \sinh z$ d) $\sin iz = \sinh iz$.

Soluzione : a)

Domanda a risposta multipla

1) La parte reale di $\sin z$ è

- a) $\cosh y \sinh x$
- b) $\sin x \cosh y$
- c) $\sin x \sin y$
- d) $\sinh x \cos y$.

Soluzione : b)