Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse

Notes en bas de la page 33 et seule ligne de la page 35

À RETENIR

- PSA : limite de détection **0,02** ; limite de quantification **0,05**.
- ^{89}Sr : AMM → cancer de la prostate (métastases osseuses).
- Avant RIV : biphosphonates ⊖ **6 jours**.
- Après RIV : grossesse ⊖ **6 mois** ; mictions fréquentes + hydratation ; NFS hebdomadaire pendant **6 semaines**.
- Effet antalgique pendant **6 mois**, puis 2e cure.
- Synoviorthèse = action sur la **couche superficielle** (et non profonde) de la synoviale.

I. PSA

- Limite de détection = **0,02**.
- Limite de quantification = **0,05**.

II. RIV des métastases osseuses

- ^{89}Sr = AMM → prostate.
- Avant RIV : biphosphonates ⊖ **6 jours**.
- RIV : grossesse ⊖ **6 mois** ; miction + hydratation.
- NFS : 1 fois/semaine pendant **6 semaines**.
- Effet antalgique pendant **6 mois**, puis 2e cure.

III. Synoviorthèse

- Action sur la couche **superficielle** et non profonde.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est l'AMM du ^{89}Sr ?	Métastases osseuses du cancer de la prostate.
2. Quelle surveillance biologique après RIV osseuse ?	NFS hebdomadaire pendant 6 semaines.
3. Durée de l'effet antalgique et suite ?	6 mois, puis 2e cure.
4. Durée de contre-indication de la grossesse après RIV ?	6 mois.
5. Sur quelle couche agit la synoviorthèse ?	Couche superficielle (et non profonde).