Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires

À RETENIR

- Hospitalisation en **chambre plombée** **2 à 3 jours** (hôpital de jour pour le faible risque), avec toilettes et salle de bain.
- Chambre : sol et murs lisses sans jointure, facilement décontaminables ; **ventilation indépendante**, en dépression ; évier et toilettes reliés à des **cuves**.
- Déchets : « **≥ 8 jours** → **10 périodes** » (T de l'^{131}I = 8 j ; stockage 10 périodes) ; déchets solides en sac, aiguilles en conteneur.
- Conseils : douche, hydratation **1,5–2 l/j**, mictions fréquentes, laxatif **3 j**, distanciation selon l'activité, éviter une grossesse **6 mois**, arrêt de l'allaitement, ustensiles personnels.
- Effets à court terme (**< 7 jours**) : sialadénite aiguë, nausées/vomissements, œdème cervical (→ corticoïdes), douleurs des M1.
- Effets à long terme : sialadénite chronique (caries, xérostomie, hypoagueusie), xérophtalmie, azoospermie, aménorrhée/ménopause précoce, fausses couches, leucémie (**> 20 GBq**), 2e cancer, fibrose.
- Conversion : **1 mCi = 37 MBq**.

I. Hospitalisation (H)

- **Chambre plombée** = **2 à 3 jours** (HDJ → FR, faible risque) ; avec toilettes + salle de bain.

1. Disposition de la chambre

- Nature du sol + murs lisses, sans jointure, facilement décontaminables.
- **Ventilation** indépendante du circuit général, en **dépression**.
- Évier + toilettes connectés à des **cuves de décantation** (décroissance) avec [illisible].

2. Déchets

- Gestion des déchets : **≥ 8 jours** → **10 périodes** **[à vérifier]** *à vérifier : 8 j = période de l'^{131}I ; stockage en décroissance de 10 périodes ≈ 80 jours*.
- Déchets solides → sac ; aiguilles → conteneur.

3. Radioprotection (consignes au patient)

- Douche + hydratation **1,5 à 2 l/jour** + mictions fréquentes.
- Laxatif **3 jours** ; IPP.
- Distanciation en fonction de l'activité administrée + conjoint.
- Grossesse à éviter **6 mois** ; allaitement (arrêt).
- Ustensiles + couverts à usage personnel → laver séparément.
- Eau citronnée – bonbons acidulés.

II. Effets secondaires de l'^{131}I

1. Court terme (< 7 jours)

- **Sialadénite aiguë** : bonbons, jus de citron ; corticoïdes, AINS.
- Xérostomie aiguë.
- Xérophtalmie.
- Œdème cervical ⇒ RT (radiothyroïdite) ⇒ corticoïdes.

- Nausées / vomissements.
- Douleurs osseuses / douleurs des M1.

2. Long terme

- **Sialadénite chronique** (retentit sur la **qualité de vie**) → caries ; mycose buccale ; xérostomie ; hypoagueusie.
- Xérophtalmie.
- Hématotoxicité.
- Reproduction : hypo-/azoospermie ; aménorrhée – ménopause précoce ; fausses couches.
- **Leucémie** – hémopathies → activité cumulée **> 20 GBq**.
- 2e cancer ; cancer du sein = facteur de risque (« FDR »).
- Fibrose (pulmonaire).

> **Rappel de calcul (bas de page)** — **1 mCi = 37 MBq** ; annotation « 20 000 / 37 » et « 1–6 20 µSv/h ».

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Durée habituelle d'hospitalisation en chambre plombée ?	2 à 3 jours.
2. Caractéristiques de la ventilation de la chambre ?	Indépendante du circuit général, en dépression.
3. Règle de stockage des déchets ?	10 périodes (notes : « ≥ 8 jours → 10 périodes »).
4. Combien de temps éviter une grossesse après IRA ?	6 mois.
5. Citez les effets secondaires précoces de l'^{131}I.	Sialadénite aiguë, xérostomie, xérophtalmie, œdème cervical, nausées/vomissements, douleurs des M1.
6. Au-delà de quelle activité cumulée le risque de leucémie est-il retenu ?	> 20 GBq.
7. Effets gonadiques à long terme ?	Azoospermie ; aménorrhée, ménopause précoce ; fausses couches.