Médecine nucléaire et pédiatrie

Mots-clés notés en marge : « Pediatric Dosage Card » (carte de dosage pédiatrique EANM)

À RETENIR

- Âge pédiatrique selon l'OMS : **1–19 ans**.
- Adaptation du protocole en 9 points : indication, information, préparation, dossier, injection, hydratation, acquisition, interprétation, dosimétrie.
- Injection : principe **ALARA** → carte de dosage **EANM** (poids × MRP).
- Acquisition : contention, sédation, choix du collimateur (**pinhole**).
- Interprétation : fixations physiologiques propres à l'enfant (thymus, cartilages de croissance).
- Dosimétrie : plus l'âge ↓, plus la dose (sensibilité) ↑.

I. Définition

- Âge pédiatrique selon l'OMS : **1–19 ans**.

II. Adaptation du protocole

1. **Indication** → justification.
2. **Information** : rassurer, expliquer, (établir la) confiance…
3. **Préparation** : couche, sucette, « AUS »…
4. **Recueil du dossier**…
5. **Injection** : ALARA → EANM (activité fonction du poids et du MRP).
6. **Hydratation** : biberon, jus…
7. **Acquisition** : contention, sédation, choix du collimateur (Φ) → **pinhole**.
8. **Interprétation** : fixations physiologiques → **thymus**, **cartilages de croissance**.
9. **Dosimétrie** : âge ↓ → dose ↑.

III. Points particuliers

- **Syndrome de Pendred** : si test au perchlorate ⊕ → TDM des rochers.
- **DMSA** → traumatisme (rénal).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Âge pédiatrique selon l'OMS (d'après les notes) ?	1–19 ans.
2. Sur quoi repose le calcul de l'activité injectée chez l'enfant ?	ALARA → carte de dosage EANM (poids et MRP).
3. Quelles adaptations pour l'acquisition ?	Contention, sédation, collimateur pinhole.
4. Quelles fixations physiologiques connaître chez l'enfant ?	Thymus, cartilages de croissance.
5. Conduite si test au perchlorate positif (syndrome de Pendred) ?	TDM des rochers.