Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions

À RETENIR

- Tumeurs neurogènes : des enveloppes nerveuses (schwannome, neurofibrome), des cellules nerveuses (ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome), paragangliome, tumeur d'Askin.
- Ganglioneurome, ganglioneuroblastome et neuroblastome = différentes phases de différenciation d'une même maladie, de malignité croissante.
- Ganglioneurome : bénin, encapsulé, adolescent / adulte jeune (♀), chaîne sympathique latérovertébrale.
- Neuroblastome : haut grade, enfant < **5 ans** ; **70 %** abdominal, **8–20 %** thoracique ; métastases synchrones os, foie.
- Paragangliome : aux dépens des paraganglions (cellules neuroendocrines le long des axes vasculaires de la tête, du cou et de la colonne vertébrale).
- Non fonctionnel (parasympathique) → effet de masse ; fonctionnel (catécholamines) → HTA, palpitations.
- Médullosurrénale → phéochromocytome ; **2 %** médiastinaux ; possible cadre familial.

I. Tumeurs neurogènes

- **Tumeurs des enveloppes nerveuses** : schwannome, neurofibrome.
- **Tumeurs des cellules nerveuses** : ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome.
- **Paragangliome** : fonctionnel ou non fonctionnel.
- **Tumeur d'Askin.**

II. Tumeurs des cellules nerveuses

Tumeurs qui touchent les cellules nerveuses des ganglions du système nerveux autonome et des glandes adrénergiques. Les **trois tumeurs** de cette catégorie constituent **différentes phases de différenciation d'une même maladie**, avec des grades de malignité différents.

1. Ganglioneurome

- Tumeur souvent **encapsulée**, constituée de cellules ganglionnaires + cellules de Schwann.
- Tumeur **bénigne** de l'adolescent ou de l'adulte jeune (♀).
- Localisation : face antérolatérale du rachis, au niveau des ganglions de la chaîne sympathique latérovertébrale, ou exceptionnellement des ganglions des racines médullaires.
- Survient habituellement *de novo*, mais sa genèse peut se faire à partir d'un NB ou d'un ganglioneuroblastome.

2. Ganglioneuroblastome et neuroblastome

- **Ganglioneuroblastome** : tumeur de **grade intermédiaire**, constituée de cellules ganglionnaires et de neuroblastes malins caractéristiques des NB.
- **Neuroblastome** : tumeur de **haut grade de malignité**, retrouvée chez l'enfant < **5 ans**.
  - Localisation : **8–20 %** thoracique ; **70 %** abdominale.
  - Métastases synchrones découvertes au moment du diagnostic : os, foie.
  - De rares cas, en particulier chez le sujet jeune, sont susceptibles de **régresser ou de devenir matures spontanément** ; la maturation se fait vers le stade ganglionnaire bénin.

III. Paragangliome

Paragangliome : tumeur développée aux dépens des paraganglions, qui sont des groupements de cellules neuroendocrines situés le long des axes vasculaires de la tête, du cou et de la colonne vertébrale.

	Paragangliomes non fonctionnels	Paragangliomes fonctionnels
Sécrétion	Ne sécrètent pas de catécholamines	Peuvent sécréter des catécholamines
Origine / siège	Système parasympathique, le long des gros vaisseaux	Partie centrale de la glande surrénale (médullosurrénale) → **phéochromocytome** ; **2 %** médiastinaux
Symptômes	Par effet de masse : dyspnée, dysphagie…	HTA, palpitations…
Remarque		Peuvent s'inscrire dans un cadre familial

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les tumeurs des cellules nerveuses ?	Ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome (phases de différenciation d'une même maladie).
2. De quoi est constitué le ganglioneurome et qui touche-t-il ?	Cellules ganglionnaires + cellules de Schwann ; tumeur bénigne de l'adolescent/adulte jeune (♀).
3. Âge et localisations du neuroblastome ?	Enfant < 5 ans ; 70 % abdominal, 8–20 % thoracique ; métastases os, foie.
4. Qu'est-ce qu'un ganglioneuroblastome ?	Tumeur de grade intermédiaire : cellules ganglionnaires + neuroblastes malins.
5. Définissez un paragangliome.	Tumeur des paraganglions, groupements de cellules neuroendocrines le long des axes vasculaires de la tête, du cou et de la colonne vertébrale.
6. Comment se manifeste un paragangliome non fonctionnel ?	Par effet de masse (dyspnée, dysphagie) ; origine parasympathique.