

Práctica 3. Las integrales y sus aplicaciones


Matemáticas 2. Ingeniería Informática

- 1 La integral
- 2 Integral indefinida
- 3 Integral definida
- 4 Integral impropia
- 5 Integrales múltiples
- 6 Aplicaciones
- 7 Ejercicios

La integral

Definición de área bajo una curva

Área bajo la curva $f(x) = x^2 + 1$ entre el eje x , desde $x = 1$ a $x = 9$



La integral se define como el área bajo la curva de una función

La integral


Ejemplo

Vamos a calcular el área dividiendo en rectángulos, de forma que la suma de las áreas de estos rectángulos será una aproximación del valor del área bajo la curva.

```
>> f = @(x)x.^2 + 1;  
>> a = 1; b = 9; n = 1;  
>> ezplot(f(x), [a - 1, b + 1]);  
>> axis(double([a - 1 b + 1 0 f(b + 1)]));  
>> hold on;
```

La integral

Ejemplo



La integral


Ejemplo. Dibujar rectángulos

Para dibujar un rectángulo se utilizan los comandos

```
>> Ll = plot([a a], double([0 f(a)]), 'g');  
>> Lt = plot([a b], double([f(a) f(a)]), 'g');  
>> Lr = plot([b b], double([0 f(a)]), 'g');  
>> Rl = plot([a a], double([0 f(b)]), 'r');  
>> Rt = plot([a b], double([f(b) f(b)]), 'r');  
>> Rr = plot([b b], double([0 f(b)]), 'r');
```

La integral

Ejemplo. Dibujar rectángulos



La integral

Ejemplo. Dibujar rectángulos

Crea un script con el siguiente código

```
f = @(x)x.^2 + 1;  
a = 1; b = 9; n = 1;  
ezplot(f, [a - 1, b + 1]);  
axis(double([a - 1 b + 1 0 f(b + 1)]));  
hold on;  
n = n * 2;  
xi = linspace(a, b, n + 1);
```


La integral

Ejemplo. Dibujar rectángulos

Añade el código para representar los rectángulos inferiores y superiores
for $i = 1 : n$

```
Ll(i) = plot([xi(i) xi(i)], double([0 f(xi(i))]), 'g');
```

```
Lt(i) = plot([xi(i) xi(i + 1)], double([f(xi(i)) f(xi(i))]), 'g');
```

```
Lr(i) = plot([xi(i + 1) xi(i + 1)], double([0 f(xi(i))]), 'g');
```

```
Rl(i) = plot([xi(i) xi(i)], double([0 f(xi(i + 1))]), 'r');
```


```
Rt(i) = plot([xi(i) xi(i + 1)], double([f(xi(i + 1)) f(xi(i + 1))]), 'r');
```

```
Rr(i) = plot([xi(i + 1) xi(i + 1)], double([0 f(xi(i + 1))]), 'r');
```

```
end
```

La integral

Ejemplo. Dibujar rectángulos



La integral


Ejemplo. Dibujar rectángulos

Cambia el código para que el script divida el área en 2^k rectángulos, tanto superiores como inferiores

```
for k = 0 : 9
    n = 2^k;
    xi = linspace(a, b, n + 1);
    for i = 1 : n
        Ll(i) = plot([xi(i) xi(i)], double([0 f(xi(i))]), 'g');
        Lt(i) = plot([xi(i) xi(i + 1)], double([f(xi(i)) f(xi(i))]), 'g');
        Lr(i) = plot([xi(i + 1) xi(i + 1)], double([0 f(xi(i))]), 'g');
        Rl(i) = plot([xi(i) xi(i)], double([0 f(xi(i + 1))]), 'r');
        Rt(i) = plot([xi(i) xi(i + 1)], double([f(xi(i + 1)) f(xi(i + 1))]), 'r');
        Rr(i) = plot([xi(i + 1) xi(i + 1)], double([0 f(xi(i + 1))]), 'r');
    end
end
```

La integral

Ejemplo. Dibujar rectángulos



La integral

Suma Izquierda y Suma Derecha

Fíjate que para dibujar los rectángulos hemos elegido, para cada subintervalo, los valores del extremo izquierdo de $f(x)$ primero y los valores del extremo derecho de $f(x)$ a continuación. Las sumas de las áreas de esos rectángulos es lo que se denomina suma izquierda en un caso y suma derecha en el otro

La integral

Suma Izquierda y Suma Derecha

Tomando cada intervalo de igual longitud $h = (b - a)/n$, con n número de intervalos definidos por $\{a = x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1} = b\}$, se obtiene

Suma Izquierda

$$L_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

Suma Derecha

$$R_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_{i+1})$$

La integral

Suma Izquierda y Suma Derecha

Prueba el siguiente script y comprueba como la suma izquierda y derecha se aproximan al mismo valor conforme se aumenta el número n de intervalos

La integral

Suma Izquierda y Suma Derecha

```
syms x; f = @(x)x^2 + 1; a = 1; b = 9;
for k = 0 : 12
    n = 2^k;
    xi = linspace(a, b, n + 1);
    h = (b - a)/n;
    for i = 1 : n + 1
        yi(i) = f(xi(i));
    end
    Ln = h * sum(double(yi(1 : n)));
    Rn = h * sum(double(yi(2 : n + 1)));
    double([Ln Rn]); pause
end
```


Integral indefinida

Integración simbólica

La integración simbólica se lleva a cabo mediante el comando $\text{int}(f)$ o $\text{int}(f,x)$, donde f es la **expresión simbólica** o el nombre de una expresión simbólica y x la variable respecto a la que se integra

Integral indefinida

Ejemplo

$$\int (2 \cos x - 6x) dx$$

```
>> syms x;  
>> f = 2 * cos(x) - 6 * x;  
>> int(f)  
ans  
2 * sin(x) - 3 * x^2
```

MATLAB no incluye la constante de integración

Integral indefinida

Ejemplo

$$\int \sin(ax) \cos(bx) dx$$

```
>> syms x a b;
```

```
>> int(sin(a * x) * cos(b * x), x)
```

```
ans
```

```
-(b * sin(a * x) * sin(b * x) + a * cos(a * x) * cos(b * x))/(a^2 - b^2)
```

Se pueden introducir parámetros en las integrales y trabajar con ellos como si fueran constantes

Integral definida

Integrales definidas

Para calcular integrales definidas se utilizan variantes del comando *int*

$$\textit{int}(f, a, b) \text{ o } \textit{int}(f, \textit{var}, a, b)$$

Integral definida

Ejemplo

$$\int_0^{\pi} (\sin(y) - 5y^2) dy$$

```
>> syms y;  
>> f = sin(y) - 5 * y^2  
>> int(f, 0, pi)  
ans  
2 - (5 * pi^3)/3
```

Integral definida

Ejemplo

$$\int_0^{\pi} (\sin(y) - ay^2) dy$$

```
>> syms y a;
```

```
>> int(sin(y) - a * y^2, y, 0, pi)
```

```
ans
```

```
2 - (a * pi^3)/3
```

Integral impropia

Ejemplo

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$$

```
>> syms x;  
>> f = sin(x)/x;  
>> int(f, 0, inf)  
ans
```

$\pi/2$

Combina el concepto de integral y el de limite

Integral impropia

Ejemplo

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx$$

```
>> syms x;  
>> int(1/x, 0, 1)  
ans  
Inf
```


Integrales dobles y triples

Veamos el cálculo de una integral doble en MATLAB mediante un ejemplo

Integrales dobles

Para calcular integrales dobles

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) \cdot dy \cdot dx$$

se puede usar la función *dblquad* o *integral2*

```
>> w = dblquad(fun, a, b, c, d)
```

Con *fun* de la forma *fun(x, y)*

Para integrales triples se puede usar la función *triplequad* o *integral3*

```
>> w = triplequad(fun, a, b, c, d, e, f)
```

Con *fun* de la forma *fun(x, y, z)* y admitir un vector como argumento x

Integrales dobles y triples

Veamos el cálculo de una integral doble en MATLAB mediante un ejemplo

Ejemplo

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \sin(x) \cos(y) dx dy$$

Con $0 \leq x \leq \pi$ y $0 \leq y \leq \pi/2$

Integrales dobles y triples

Ejemplo 1

Crea un script con

- ❶ `syms x y;`
- ❷ `f=@(x,y) sin(x)*cos(y)`
- ❸ `a=input('Límite integración inferior (x)')`
- ❹ `b=input('Límite integración superior (x)')`
- ❺ `c=input('Límite integración inferior (y)')`
- ❻ `d=input('Límite integración superior (y)')`
- ❼ `F=double(int(int(f,x,a,b),y,c,d))`

Integrales dobles y triples

Ejemplo 2

Crea un script con

- ❶ `f=@(x,y) sin(x)*cos(y)`
- ❷ `a=input('Límite integración inferior (x)')`
- ❸ `b=input('Límite integración superior (x)')`
- ❹ `c=input('Límite integración inferior (y)')`
- ❺ `d=input('Límite integración superior (y)')`
- ❻ `F=dblquad(f,a,b,c,d)`

Integrales dobles y triples

Ejemplo

Crea un script con

- ❶ `fun=@(x,y,z) x.*sin(x)+z*cos(y)*cos(x)`
- ❷ `a=input('Límite integración inferior (x)')`
- ❸ `b=input('Límite integración superior (x)')`
- ❹ `c=input('Límite integración inferior (y)')`
- ❺ `d=input('Límite integración superior (y)')`
- ❻ `e=input('Límite integración inferior (z)')`
- ❼ `f=input('Límite integración superior (z)')`
- ❽ `F=triplequad(fun,a,b,c,d,e,f)`

Aplicaciones

Área bajo una curva

El cálculo de la integral de una función no negativa en un intervalo $[a, b]$ se interpreta como el área delimitada por la gráfica de la función, el eje de abscisas y las rectas $x = a, x = b$

Aplicaciones

Cálculo de volúmenes

Si cortamos un cuerpo por un plano perpendicular al eje de abscisas, obtenemos una sección de área $A(x)$ en cada punto de abscisa x . Entonces, el volumen de ese cuerpo comprendido entre los planos perpendiculares al eje OX en los puntos de abscisas a y b , viene dado por

$$\int_a^b A(x) \, dx$$

Aplicaciones

Ejemplo. Volumen limitado por un elipsoide

Dado el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Si cortamos el elipsoide por el plano $x = k$, la sección es la elipse $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{k^2}{a^2}$, es decir

$$\frac{y^2}{\frac{b^2}{a^2}(a^2 - k^2)} + \frac{z^2}{\frac{c^2}{a^2}(a^2 - k^2)} = 1$$

cuyos semiejes son $\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - k^2}$ y $\frac{c}{a}\sqrt{a^2 - k^2}$.

El área de la elipse es

$$A(k) = \pi \frac{bc}{a^2} (a^2 - k^2)$$

Aplicaciones

Ejemplo

```
>> syms a b c x;  
>> A = pi * (b * c/a^2) * (a^2 - x^2);  
>> V = int(A, x, -a, a)  
V =  
(4 * pi * b * c * a)/3
```

Aplicaciones

Volumen de un cuerpo de revolución

Si se hace girar la curva $y = f(x)$ alrededor del eje de abscisas, se genera un sólido de revolución cuyo volumen viene dado por:

$$\pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Aplicaciones

Ejemplo

Calcula el volumen del sólido generado al girar la región acotada por la función $f(x) = \sqrt{x}$, la recta $x = 3$ y el eje de abscisas

```
>> syms x
```

```
>> f(x) = sqrt(x)
```

```
>> V = pi * int(f^2, 0, 3)
```

```
V
```

```
(9 * pi)/2
```

Ejercicios

Ejercicio #1

Crea un script tal que para $f(x) = \sqrt{x}$ entre 1 y 2 calcula

- 1 L_4
- 2 R_4
- 3 Valor exacto de la integral (utilizar el comando *int*)
- 4 Porcentaje de error

Ejercicios

Ejercicio #2

Reutiliza el script de la Práctica #1 para calcular L_n y R_n de

- ❶ $f(x) = x^2 - 2x + 3$ en $[-2, 3]$ con 8, 16, 32 y 48 rectángulos respectivamente
- ❷ $f(x) = \text{sen}(2x)$ en $[-1, 5]$ con 10, 40, 60 y 80 rectángulos respectivamente
- ❸ $f(x) = -x^2 + 8x + 5$ en $[-2, 3]$ con 4, 12, 30 y 50 rectángulos respectivamente

Ejercicios

Ejercicio #3

Calcula

- 1 $\int e^{4x} dx$
- 2 $\int x^5 \log x dx$
- 3 $\int \cos(\sin x) dx$

Ejercicios

Ejercicio #4

Sean $f(x) = x$ y $g(x) = (x + 1)^2$, calcula

- 1 $\int_0^2 (f + g) dx$
- 2 $\int_0^2 f dx + \int_0^2 g dx$
- 3 Compara los resultados

Ejercicios

Ejercicio #5

Calcula

- 1 $\int_{-\pi/2}^{\pi} k f \, dx$ con $f(x) = \sin x$ y $k = 5$
- 2 $k \int_{-\pi/2}^{\pi} f \, dx$
- 3 Compara los resultados

Ejercicios

Ejercicio #6

Calcula $\int_1^1 x^2 dx$

Ejercicios

Ejercicio #7

Sea $f(x) = \cos x$, calcula

- 1 $\int_{-\pi}^{\pi} f \, dx$
- 2 $k \int_{-\pi}^0 f \, dx + k \int_0^{\pi} f \, dx$
- 3 Compara los resultados

Ejercicios

Ejercicio #8

Calcula $\int_4^{\infty} \frac{1}{x^2 - 5x + 4} dx$

Ejercicios

Ejercicio #9

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{x^2}{2y} dx dy$$

Con $1 \leq x \leq 2$ y $1 \leq y \leq 4$

Ejercicios

Ejercicio #10

$$\iiint_Q x^2 \sin(z) dx dy dz$$

Con $0 \leq x \leq \sqrt{5}$, $0 \leq y \leq 2\pi$ y $0 \leq z \leq \arctan 2$

Ejercicios

Ejercicio #11

Calcula el volumen del sólido generado al girar $f(x) = \sqrt{x-1}$, la recta $x = 3$ y el eje de ordenadas