

Grundbegriffe der Statistik

Arithmetisches Mittel

Für Daten x_1, \dots, x_n ist das Arithmetische Mittel definiert als

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} (x_1 + \dots + x_n)$$

Geometrisches Mittel

Für Daten x_1, \dots, x_n ist das Geometrische Mittel definiert als

$$\bar{x}_{geom} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$$

Harmonisches Mittel

Für Daten x_1, \dots, x_n ist das Harmonische Mittel definiert als

$$\bar{x}_{harm} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^{-1} \right)^{-1} = n \cdot \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \right)^{-1}$$

Modus

Für Daten x_1, \dots, x_n ist der Modus definiert als der am häufigsten auftretende Wert.

Median

Für aufsteigend sortierte Daten x_1, \dots, x_n ist der Median definiert als x_k mit $k = \lceil \frac{1}{2}n \rceil$.

p-Quantil

Für aufsteigend sortierte Daten x_1, \dots, x_n ist das p-Quantil definiert als $x_p = x_k$ mit $k = \lceil p \cdot n \rceil$.

Spannweite

Für Daten x_1, \dots, x_n ist die Spannweite definiert als

$$R(\vec{x}) = \max_{1 \leq i \leq n} x_i - \min_{1 \leq i \leq n} x_i$$

Quartilsabstand

Für Daten x_1, \dots, x_n ist der Quartilsabstand definiert als

$$QA(\vec{x}) = x_{0.75} - x_{0.25}$$

Varianz

Für Daten x_1, \dots, x_n ist die Varianz definiert als

$$\text{Var}(\vec{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \bar{x^2} - \bar{x}^2$$

Standardabweichung

Für Daten x_1, \dots, x_n ist die Standardabweichung definiert als

$$\sigma(\vec{x}) = \sqrt{\text{Var}(\vec{x})}$$

Aufgabe 1

Zwei Rennfahrer fahren ein Wettrennen mit drei identischen Runden. Nach jeder Runde wird die Geschwindigkeit in km/h veröffentlicht.

Runde	1	2	3
Rennfahrer A	149	162	132
Rennfahrer B	143	193	98

Berechnen sie die durchschnittliche Geschwindigkeit mit dem Harmonischen Mittel und bestimmen sie welcher Fahrer gewinnt.

Aufgabe 2

Wissenschaftler finden in einem gerade eingeschlagenem Kometen eine unbekannten organischen Zellmasse, die sich schnell vermehrt. Bei einer ursprünglichen Masse von einem Kilogramm messen die Wissenschaftler alle 10 Minuten die Wachstumsrate:

T in min	0	10	20	30	40
Wachstumsrate	1.56	1.45	1.73	1.45	1.62

Berechnen sie als Annäherung das geometrische Mittel und schätzen sie mit diesem die entstandene Masse nach einem Tag ab.

Aufgabe 3

Die drei benachbarten Inselstaaten Lummerland, Taka-Tuka-Land und Liliput haben alle 10 Einwohner und unterscheiden sich in ihrer Wirtschaftspolitik sehr stark. Zum Jahres Zensus geben alle Bewohner ihr Jahreseinkommen in Tausend Dollar an.

Lummerland	5	6	6	7	7	8	9	9	147	198
Taka-Tuka-Land	5	6	6	7	45	46	51	52	56	57
Liliput	5	6	21	22	23	24	26	67	69	75

Berechnen sie für alle drei Inselstaaten jeweils das Arithmetische Mittel, den Median, die 0.25 und 0.75 Quantile. Finden sie für jeden Inselstaat jeweils einen Wert, der das Wirtschaftssystem dieses Staates als den anderen überlegen darstellt. Berechnen sie nun jeweils die Spannweite, den Quartilsabstand und die Varianz und überlegen sie deren Aussagekraft.

Aufgabe 4

Gegeben sei die folgende zweidimensionale Stichprobe zur Abhängigkeit der Dichte D (in Gramm pro Liter) von der Temperatur T (in Grad Celsius) bei trockener Luft:

T	-20	-10	0	10	20
D	1.39	1.34	1.29	1.25	1.20

Berechnen Sie die arithmetischen Mittel \bar{T} und \bar{D} sowie die Standardabweichungen s_T und s_D . (SoSe16 Aufgabe 2).

Aufgabe 5

Die Lebensdauer T (=Zeit bis zum Ausfall) von Halogenlampen werde als normalverteilt angenommen. Die Überprüfung von vier Halogenlampen eines bestimmten Typs ergab Lebensdauern von

1720, 2100, 1800 und 2180 (*Stunden*)

Berechnen Sie Mittelwert und Standardabweichung von T . (WiSe14/15 Aufgabe 5).