









	verbatim_name	dataset	tp	AOO	relative_occupancy_area	D_AOO_s	log_R2_1	Telfer_1_2
1	Hirundo rustica	Birds_Atlas_Czechia	1	83907.51	0.9264470	1.971650	-0.001560694	-0.1497577
2	Hirundo rustica	Birds_Atlas_Czechia	2	83776.66	0.9250022	1.971168	-0.001560694	-0.1497577
3	Hirundo rustica	Birds_atlas_EBBA	2	8654539.18	0.6418514	1.816990	0.186989139	1.4614493
4	Hirundo rustica	Birds_atlas_EBBA	1	7178531.28	0.5323854	1.715565	0.186989139	1.4614493
5	Hirundo rustica	Birds_atlas_Japan	1	265530.53	0.4389515	1.676967	-0.094828302	-0.5198887
6	Hirundo rustica	Birds_atlas_Japan	2	241507.74	0.3992391	1.638708	-0.094828302	-0.5198887
7	Hirundo rustica	Birds_Atlas_New_York	2	115676.30	0.8670604	1.954080	-0.060829102	-1.0907629
8	Hirundo rustica	Birds_Atlas_New_York	1	122931.20	0.9214401	1.974285	-0.060829102	-1.0907629









Occupancy–Area Relationship

Hirundo rustica

