

Übungen zur Vorlesung Differentialgeometrie II

Blatt 6

Aufgabe 21. (4 Punkte)

Sei $n \geq 3$ und (M^n, g) eine Mannigfaltigkeit, so dass $R_{ij} = f g_{ij}$ für eine Funktion $f \in C^\infty(M)$ gilt.

Zeige, dass

$$R_{ij} = \frac{R}{n} g_{ij}$$

gilt und dass R konstant ist.

Aufgabe 22. (12 Punkte)

Sei $n = 3$ und M^n eine glatte Mannigfaltigkeit und $g = g(t)$ eine Familie von Riemannschen Metriken, welche den Ricci-Fluss $\partial_t g_{ij} = -2R_{ij}$ lösen. Nehme an, dass für $x_0 \in M$ und $t_0 \in \mathbb{R}$ eine Karte (U, φ) von M existiert, so dass

$$g_{ij}(x_0) = \delta_{ij}, \quad \Gamma_{ij}^k(x_0) = 0$$

gilt, wobei die Größen zur Zeit t_0 ausgewertet werden. Definiere

$$B_{ijkl} = g^{pr} g^{qs} R_{piqj} R_{rksl}.$$

Zeige in dem oben gewählten Koordinatensystem:

(i) Die Symmetrie

$$B_{ijkl} = B_{jilk} = B_{klij}$$

und

$$g^{jl}(B_{ijkl} - 2B_{ijlk}) = 0.$$

(ii) Die Identität

$$\begin{aligned} \Delta R_{ijkl} + 2(B_{ijkl} - B_{ijlk} - B_{iljk} + B_{ikjl}) \\ = R_{jl;ik} - R_{jk;il} - R_{il;jk} + R_{ik;jl} + g^{pq}(R_{pjkl}R_{qi} + R_{ipkl}R_{qj}). \end{aligned}$$

Hinweis: Benutze die 1. und die 2. Bianchi Identität, welche lautet:

$$R_{jklm;i} + R_{kil m;j} + R_{ijlm;k} = 0.$$

(iii) Die Evolutionsgleichung des Riemannschen Krümmungstensors

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} R_{ijkl} = \Delta R_{ijkl} + 2(B_{ijkl} - B_{ijlk} - B_{iljk} + B_{ikjl}) \\ + g^{pq}(R_{pjkl}R_{qi} + R_{ipkl}R_{qj} + R_{ijpl}R_{qk} + R_{ijkp}R_{ql}). \end{aligned}$$

(iv) Die Evolutionsgleichung der Ricci-Krümmung

$$\frac{\partial}{\partial t} R_{ik} = \Delta R_{ik} + 2g^{pr} g^{qs} R_{piqk} R_{rs} - 2g^{pq} R_{pi} R_{qk}.$$

(v) Die Evolutionsgleichung der Skalkrümmung

$$\frac{\partial}{\partial t} R = \Delta R + 2g^{ij} g^{kl} R_{ik} R_{jl}.$$

(vi) Falls $R > 0$ zu Zeit $t = 0$ gilt, dann gilt dies auch für $t > 0$.

Abgabe: Bis Donnerstag, 31.05.2018, 10.00 Uhr, in die Mappe vor Büro F 402.