

# Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen

## Praktikumsblatt 6

### Aufgabe 15 (Transportgleichung)

Lena Hilpp Matr.Nr.: 1941997  
Jan Frithjof Fleischhammer Matr.Nr.: 2115491

08.06.2020

#### Problemstellung

In dieser Aufgabe betrachtet man das Randwertproblem

$$\begin{cases} -\varepsilon \Delta u + b \cdot \nabla u = f & \text{in } \Omega \\ u = 0 & \text{auf } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1)$$

mit  $\varepsilon = 0.02$   $b = [1, 1/2]$  und als Gebiet  $\Omega = (0, 1)^2$ . Die rechte Seite  $f$  von (1) wird so gewählt, dass die exakte Lösung durch

$$u(x, y) = x \left( 1 - \exp \left( -\frac{b_1}{\varepsilon} (1 - x) \right) \right) y \left( 1 - \exp \left( -\frac{b_2}{\varepsilon} (1 - y) \right) \right)$$

gegeben ist.

Mit Hilfe der Finiten-Differenzen-Methode wird eine numerische Lösung berechnet und die experimentelle Konvergenzordnung der 5-Punkte-Stern-Approximation mit dem zentralen Differenzenquotienten, für die Diskretisierung des Gradienten, bestimmt.

#### Ergebnis

In *Abbildung 1* sieht man die numerische Lösung des Transportproblems für verschiedene  $\varepsilon$  auf dem Gebiet mit 11 Knoten pro Dimension. Man kann erkennen, dass die Lösung für größere  $\varepsilon$  flacher wird.




Abbildung 1: Gitter  $\mathcal{G}_h$  und numerische Lösung  $u_h$  für  $\varepsilon = 0.001/0.02/0.1$

In *Abbildung 2* ist die numerische Lösung für die selben  $\varepsilon$  und für 100 Knoten pro Dimension abgebildet.




Abbildung 2: Gitter  $\mathcal{G}_h$  und numerische Lösung  $u_h$  für  $\varepsilon = 0.001/0.02/0.1$

Dieses Randwertproblem ist für kleine  $\varepsilon > 0$  ein Beispiel für ein konvektionsdominiertes Modellproblem (Transportgleichung) und zeigt die typisch auftretenden Schwierigkeiten dieser Klasse von partiellen Differentialgleichungen. Dies kann man für die verschiedenen  $\varepsilon$  in *Abbildung 3* deutlich erkennen. Die Konvergenz für sehr kleine  $\varepsilon$  ist sehr schlecht und die Lösung instabil. Das zentrale Differenzenverfahren versagt für  $\varepsilon \ll h$ .




Abbildung 3: Konvergenzordnung und Rechenzeit für  $\epsilon = 0.001/0.02/0.1$

Abhilfe schafft das *upwind-Verfahren*. Hier erhält man auch für kleine  $\epsilon$  eine gute Approximation an die Lösung. Dies kann man für  $\epsilon = 0.001$  in *Abbildung 4* sehen.




Abbildung 4: upwind-Verfahren für  $\epsilon = 0.001$