From Patagonia
SEAFOOD



INIDEP / FISHBASE

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA SHEET

Mero — Patagonian Grouper

Acanthistius patachonicus (Jenyns, 1840)

IDENTIFICACIÓN / *IDENTIFICATION*

Nombre comercial *Commercial name*	**Mero** *Patagonian Grouper*
Nombre científico *Scientific name*	*Acanthistius patachonicus*
Familia *Family*	**Serranidae**
Órden *Order*	**Perciformes**
Código HS *HS Code*	**0302.89 / 0303.89**

ZONA DE PESCA / *FISHING AREA*

Océano *Ocean*	**Atlántico Sudoccidental** *Southwest Atlantic*
Zona FAO *FAO Area*	**41**
País *Country*	**Argentina — Mar Argentino** *Argentina — Argentine Sea*
Distribución *Distribution*	**30°S–48°S (sur de Brasil–Patagonia) · arrecifes rocosos y fondos mixtos** *30°S–48°S (southern Brazil–Patagonia) · rocky reefs and mixed bottoms*
Profundidad *Depth*	**5–100 m** *5–100 m*
Arte de pesca *Fishing gear*	**Arrastre de fondo costero/offshore; nasas y línea artesanal** *Coastal/offshore bottom trawl; traps and artisanal handline*
Temporada *Fishing season*	**Todo el año · pico nov–feb · agregaciones ago–dic** *Year-round · peak Nov–Feb · spawning aggregations Aug–Dec*



Mar Argentino
Argentine Sea · Fuente/Source: INIDEP

BIOLOGÍA / *BIOLOGY*

Talla máx. *Max size*	**80 cm / 6.010 g (INIDEP) · 65 cm (IUCN)** *80 cm / 6,010 g (INIDEP) · 65 cm (IUCN)*
Longevidad *Longevity*	**48–50 años** *48–50 years*
Madurez *Maturity*	**29 cm / 8 años** *29 cm / 8 years*
Crecimiento *Growth*	**$L_\infty \approx 66$ cm · k 0,08** *$L_\infty \approx 66$ cm · k 0.08*
Reproducción *Reproduction*	**Ago–dic · desove parcial oct–nov** *Aug–Dec · partial spawning Oct–Nov*
Dieta *Diet*	**Cangrejos, bivalvos, cefalópodos, peces y poliquetos** *Crabs, bivalves, cephalopods, fish and polychaetes*

Especie longeva y de crecimiento lento, asociada a arrecifes rocosos, cuevas y fondos mixtos. Forma agregaciones reproductivas; juveniles costeros y adultos más profundos. Su baja tasa de renovación la hace vulnerable a la presión pesquera.

Long-lived, slow-growing species associated with rocky reefs, caves and mixed bottoms. It forms spawning aggregations; juveniles are coastal and adults occur deeper. Its low renewal rate makes it vulnerable to fishing pressure.

PRESENTACIONES / *PRESENTATIONS*

Producto *Product*	Presentación *Form*	Envase y congelado *Packing & freezing*
Entero	Con cabeza, eviscerado *With head, gutted*	Fresco 0–4 °C · Congelado IQF / Block
Tronco / H&G	Sin cabeza ni vísceras *Headed and gutted*	Congelado · IQF / Block
Filete	Sin piel y sin espinas *Skinless, boneless*	Congelado · IQF / Block

Producto fresco refrigerado o congelado a bordo/en tierra. Conservación congelada a ≤ −18 °C.

Fresh refrigerated or frozen on board/on shore. Frozen storage at ≤ −18 °C.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL / *NUTRITIONAL COMPOSITION (PER 100 G, RAW)*

14–20 g	1,0–1,5 g	0,71 g	85–95 kcal
PROTEÍNA *Protein*	LÍPIDOS *Fat*	OMEGA-3 (EPA+DHA)	ENERGÍA *Energy*

Proteína y omega-3: referencia FishBase/FAO (0,40–1,31 g omega-3/100 g). Lípidos y energía: estimación genérica para mero. No sustituyen un análisis de laboratorio del lote.

Protein and omega-3: FishBase/FAO reference (0.40–1.31 g omega-3/100 g). Fat and energy: generic mero estimate. Not a substitute for a batch laboratory analysis.

CONSERVACIÓN Y TRAZABILIDAD / *STORAGE & TRACEABILITY*

Conservación *Storage*	**Fresco 0–4 °C · Congelado ≤ −18 °C** *Fresh 0–4 °C · Frozen ≤ −18 °C*
Sistema *System*	**IQF / Block** *IQF / Block*
Vida útil *Shelf life*	**Fresco: cadena de frío · Congelado: 24 meses** *Fresh: cold chain · Frozen: 24 months*
Trazabilidad *Traceability*	**Por lote / captura** *By batch / catch*