

Table of Contents

Hantavirus-Factsheet: Was Sie wissen müssen.....	1
Was ist Hantavirus?	1
Wie wird es übertragen?.....	2
Symptome im Überblick.....	3
Hantavirus in Deutschland – Die Zahlen.....	3
Wer ist besonders gefährdet?.....	5
Gibt es eine Impfung?	5
Quellen.....	6
Tipps für visuelle Elemente	6

Hantavirus-Factsheet: Was Sie wissen müssen

 **Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Verdacht auf eine Hantavirus-Infektion konsultieren Sie umgehend einen Arzt oder das Gesundheitsamt. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Mai 2026.

Was ist Hantavirus?

Hantaviren sind **RNA-Viren** aus der Familie *Hantaviridae*, die bei Nagetieren (Mäusen) vorkommen und auf den Menschen übertragen werden können. In Deutschland gibt es drei relevante Virustypen ¹²:

Virus-Typ	Reservoirwirt	Region	Schwere
Puumala-Virus (PUUV)	Rötelmaus	Süd-, Westdeutschland	Mild – verursacht ~90% aller Fälle
Dobrava-Belgrad-Virus (DOBV)	Brandmaus	Nord-, Ostdeutschland	Moderat – schwerer als PUUV
Tula-Virus (TULV)	Feldmaus	Deutschlandweit	Sehr selten

¹ Robert Koch-Institut (RKI). “Hantavirus-Infektionen.”
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Hantavirus.html>

² CDC. “About Hantavirus.” <https://www.cdc.gov/hantavirus/about/index.html>

Das durch Puumala-Virus verursachte Krankheitsbild nennt man **Nephropathia epidemica** – eine milde Form des hämorrhagischen Fiebers mit Nierenbeteiligung (HFRS).³⁴

Gut zu wissen: 70–80% aller Hantavirus-Infektionen verlaufen beschwerdefrei oder mit nur unspezifischen Symptomen.⁵

Wie wird es übertragen?

Übertragungsweg	Risiko	Details
Aerosole / Staub	⚠ Hoch	Einatmen virushaltiger Partikel aus Mäusekot, -urin oder -speichel – z.B. beim Fegen, Staubsaugen oder Umschichten von Holz
Hautkontakt	Mittel	Bei offenen Wunden durch Kontakt mit kontaminiertem Material
Lebensmittel	Niedrig	Verzehr von Nahrung, die mit Nagetierausscheidungen kontaminiert ist
Mensch-zu-Mensch	❌ Nein (Europa)	Nur das Andes-Virus in Südamerika kann von Mensch zu Mensch übertragen werden – europäische Virustypen sind hierfür nicht bekannt ⁶⁷

Besonders wichtig: Für eine Ansteckung ist **kein direkter Kontakt mit Mäusen** nötig. Die Viren können in getrockneten Ausscheidungen mehrere Wochen infektiös bleiben und als Staubpartikel eingeatmet werden.⁸⁹

³ Robert Koch-Institut (RKI). “Hantavirus-Infektionen.” <https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Hantavirus.html>

⁴ Parahealth. “Hantavirus-Ratgeber: Symptome, Diagnose & Therapie.” <https://parahealth.de/blogs/blog/hantavirus-ratgeber-symptome-diagnose-therapie>

⁵ UniversitätsSpital Zürich. “Hantavirus-Infektion.” <https://www.usz.ch/krankheit/hantavirus-infektion/>

⁶ CDC. “About Hantavirus.” <https://www.cdc.gov/hantavirus/about/index.html>

⁷ RKI Merkblatt. “Informationen zur Vermeidung von Hantavirus-Infektionen.” https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf

⁸ RKI Merkblatt. “Informationen zur Vermeidung von Hantavirus-Infektionen.” https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf

Symptome im Überblick

Die Inkubationszeit beträgt typischerweise **2–4 Wochen** (Ausnahme: 5–60 Tage). ¹⁰

Phase	Symptome	Dauer
Inkubationszeit	Keine Symptome	2–4 Wochen (5–60 Tage)
Fieberphase	Plötzliches Fieber >38°C, starke Kopf-/Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, Übelkeit, gerötetes Gesicht	3–5 Tage
Nierenphase	Kreuzschmerzen, Eiweiß im Urin, verminderte Urinmenge, in seltenen Fällen Blut im Urin	2–7 Tage
Erholung	Langsame Rückbildung aller Symptome, Müdigkeit kann monatelang anhalten	2–6 Wochen

 **Wann zum Arzt?** Bei plötzlichem Fieber mit Rücken-/Kopfschmerzen – besonders wenn Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten oder möglicherweise kontaminierten Staub eingeatmet haben. Informieren Sie Ihren Arzt über mögliche Expositionen. ¹¹¹²

Hantavirus in Deutschland – Die Zahlen

Key Facts auf einen Blick:

- **Meldepflicht:** Seit 2001 (IfSG § 7) ¹³
- **Gesamtfälle:** ~18.053 Fälle (2001–2026) ¹⁴

⁹ Onmeda. “Hantavirus: Symptome, Ansteckung und Verlauf.”
<https://www.onmeda.de/krankheiten/hantavirus-infektion-id202494/>

¹⁰ RKI Falldefinitionen 2026. “Hantavirus-Erkrankung.”
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Meldewesen/Falldefinitionen/Downloads/Hantavirus.pdf>

¹¹ Parahealth. “Hantavirus-Ratgeber: Symptome, Diagnose & Therapie.”
<https://parahealth.de/blogs/blog/hantavirus-ratgeber-symptome-diagnose-therapie>

¹² NetDoktor. “Hantavirus-Symptome.”
<https://www.netdoktor.de/krankheiten/hantavirus/symptome/>

¹³ RKI. Infektionsepidemiologisches Jahrbuch 2001.
<https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/3272/infektionsepidemiologisches-jahrbuch%20meldepflichtiger-krankheiten-fuer-2001.pdf>

- **Jährlich:** 150–500 Fälle (stark schwankend, Spitzenjahre: ~1.700–2.950) ¹⁵
- **Letalität:** <1% (Puumala: ca. 0,1%; Dobrava: 0,3–0,9%) ¹⁶¹⁷
- **Todesfälle:** Extrem selten – seit 2001 nur wenige Einzelfälle dokumentiert ¹⁸
- **Haupt-Risikogebiete:** Baden-Württemberg (Schwäbische Alb), Bayern (Bayerischer Wald, Unterfranken), Hessen (Spessart, Mittelgebirge) ¹⁹²⁰

Warum schwanken die Zahlen so stark?

Die Fallzahlen folgen einem **3- bis 6-jährigen Zyklus**, der direkt mit der Buchenmast zusammenhängt: Nach reichen Bucheckerjahren vermehren sich Rötelmäuse stark – und im Folgejahr steigen die Hantavirus-Fälle. ²¹²²

¹⁴ Proplanta/RKI SurvStat. “Hantavirus-Fälle in Deutschland 2017–2026.”
<https://www.proplanta.de/karten/hantavirus-faelle-in-deutschland-2017-2026-uebersichtskarte260262020.html>

¹⁵ Proplanta/RKI SurvStat. “Hantavirus-Fälle in Deutschland 2017–2026.”
<https://www.proplanta.de/karten/hantavirus-faelle-in-deutschland-2017-2026-uebersichtskarte260262020.html>

¹⁶ Robert Koch-Institut (RKI). “Hantavirus-Infektionen.”
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Hantavirus.html>

¹⁷ Parahealth. “Hantavirus-Ratgeber: Symptome, Diagnose & Therapie.”
<https://parahealth.de/blogs/blog/hantavirus-ratgeber-symptome-diagnose-therapie>

¹⁸ Eurosurveillance/RKI-Daten. “Surveillance von Hantavirus-Infektionen in Deutschland, 2001–2017.” <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6693291/>

¹⁹ Umweltbundesamt. “Hantavirusprognose.”
<https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/infektionsschutz/hantavirusprognose>

²⁰ Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). “Hantavirus-Infektionen.”
https://www.lgl.bayern.de/gesundheits/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/hantavirus/index.htm

²¹ Umweltbundesamt. “Hantavirusprognose.”
<https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/infektionsschutz/hantavirusprognose>

²² Stuttgarter Zeitung. “Hantavirus-Karte zeigt Risikozonen in Deutschland.”
<https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hantavirus-karte-zeigt-risikozonen-in-deutschland.812f010b-9d1e-41dd-8803-1844c162c03c.html>

Wer ist besonders gefährdet?

Die folgenden Personengruppen haben ein erhöhtes Infektionsrisiko, weil sie häufiger mit potenziell kontaminiertem Staub in Kontakt kommen ²³²⁴:

-  **Forstarbeiter und Waldarbeiter**
-  **Landwirte** (Relative Risiko 5,2× erhöht)
-  **Hausbesitzer** bei Mäusebefall (Keller, Dachboden, Schuppen, Garage)
-  **Schädlingsbekämpfer**
-  **Camper, Wanderer und Gartenbesitzer**
-  **Bauarbeiter** und Reinigungspersonal

Demografie: Über zwei Drittel der Erkrankten sind Männer zwischen 30 und 50 Jahren. ²⁵

Gibt es eine Impfung?

Nein. Derzeit ist keine Impfung gegen Hantavirus verfügbar. ²⁶

✓ **Prävention ist der beste Schutz:** Das Einatmen von Staub in Verdachtsgebieten vermeiden, Handschuhe und Atemschutz tragen, Flächen vor dem Putzen anfeuchten (nicht trocken fegen!), Lüftung sicherstellen und Nagetierbefall vorbeugen. ²⁷²⁸

²³ RKI Merkblatt. "Informationen zur Vermeidung von Hantavirus-Infektionen."
https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf

²⁴ Proplanta/RKI. "Hantavirus-Demografie." https://www.proplanta.de/karten/hantavirus-fallzahlen-2026-einzelkarte260262020_1.html

²⁵ Proplanta/RKI. "Hantavirus-Demografie." https://www.proplanta.de/karten/hantavirus-fallzahlen-2026-einzelkarte260262020_1.html

²⁶ Parahealth. "Hantavirus-Ratgeber: Symptome, Diagnose & Therapie."
<https://parahealth.de/blogs/blog/hantavirus-ratgeber-symptome-diagnose-therapie>

²⁷ RKI Merkblatt. "Informationen zur Vermeidung von Hantavirus-Infektionen."
https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf

²⁸ BAUA. "Berufliche Gefährdung der Landwirte durch Hantaviren."
<https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Schriftenreihe/Forschungsberichte/2005/Fb1036.pdf>

Quellen

Tipps für visuelle Elemente

Element	Beschreibung	Einsatz
Infografik “Virus unter dem Mikroskop”	Schematische Darstellung des Hantavirus (80–160 nm, mit Glykoprotein-Spikes)	Header/Titelbereich
Übertragungsweg-Illustration	Grafik: Maus → Kot/Urin/Speichel → Staub → Einatmen durch Mensch	Abschnitt “Wie wird es übertragen?”
Symptom-Timeline	Visuelle Darstellung der 4 Phasen mit Icons (Thermometer für Fieber, Niere für Nierenphase, etc.)	Abschnitt “Symptome im Überblick”
Deutschland-Karte	Risikogebiete farblich markiert (Schwäbische Alb, Bayerischer Wald, Spessart, etc.)	Abschnitt “Statistiken”
Buchenmast-Zyklus-Diagramm	Kreislaufgrafik: Buchenblüte → Bucheckern → Rötelmaus → Hantavirus	Abschnitt “Warum schwanken die Zahlen?”
Schutzmaßnahmen-Icons	Icons für: Lüften, Anfeuchten, Handschuhe, FFP2-Maske, Nagetierbekämpfung	Abschnitt “Prävention”
Risikogruppen-Avatare	Silhouetten/Icons für die 6 Risikogruppen	Abschnitt “Wer ist gefährdet?”

Dieses Factsheet wurde im Mai 2026 erstellt und basiert auf Daten des Robert Koch-Instituts, der CDC, des ECDC, des Umweltbundesamtes und weiterer anerkannter Quellen.