

Hantavirus — Die 25 wichtigsten Fragen

Stand: Mai 2026 | Zielgruppe: Laien | Wortzahl: ~1.800

Disclaimer

⚠ **Wichtiger Hinweis:** Diese FAQ ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Angaben sind nach bestem Wissen recherchiert (Quellen: RKI, CDC, gesund.bund.de). Bei Gesundheitsbeschwerden oder Hantavirus-Verdacht konsultieren Sie immer Ihren Arzt oder den Notarzt (112). Die Inhalte dienen ausschließlich der Information — bei medizinischen Entscheidungen sind aktuelle Fachliteratur und Behördenmeldungen maßgeblich.

Kategorie 1: Grundlagen

Was ist Hantavirus?

Hantaviren sind Viren, die von Nagetieren (vor allem Mäusen) auf den Menschen übertragen werden. Sie gehören zur Familie der *Bunyaviren* und verursachen in Europa eine Erkrankung namens HFRS (*hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom*), die vor allem die Nieren betrifft. In Deutschland sind die meisten Fälle durch das Puumala-Virus verursacht, das von der Rötelmaus übertragen wird. Weltweit gibt es verschiedene Hantavirus-Typen mit unterschiedlichem Krankheitsverlauf. → Mehr dazu in: [Dokument 01 — Grundlagen]

Wie gefährlich ist Hantavirus in Deutschland?

In Deutschland ist Hantavirus deutlich weniger gefährlich als in Amerika oder Asien. Die Sterblichkeit liegt beim Puumala-Virus unter 0,1 %, beim Dobrava-Virus bei 0,3–0,9 %. Seit Einführung der Meldepflicht 2001 wurden bundesweit rund 18.000 Fälle gemeldet — Todesfälle sind extrem selten. Die meisten Infektionen verlaufen mild bis mittelschwer und heilen vollständig aus. → Mehr dazu in: [Dokument 08 — Notfallmanagement]

Woher kommt das Virus?

Hantaviren kommen weltweit vor und sind eng an ihre Nagetier-Wirte gebunden. In Deutschland ist die *Rötelmaus* das Hauptreservoir für das Puumala-Virus — besonders in Regionen mit viel Buchenwald wie der Schwäbischen Alb, dem Bayerischen Wald und dem Odenwald. In Ostdeutschland (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern) kann das Dobrava-Virus über die *Brandmaus* übertragen werden. Das Risiko steigt nach sogenannten

“Buchenmastjahren”, wenn reichlich Bucheckern die Mäusepopulation explosionsartig wachsen lassen. → Mehr dazu in: [Dokument 09 — Nagetierökologie]

Gibt es verschiedene Hantavirus-Typen?

Ja. In Deutschland sind drei Typen relevant: **Puumala-Virus** (PUUV) verursacht ~90 % aller Fälle — milde Nierenerkrankung. **Dobrava-Belgrad-Virus** (DOBV, Genotyp Kurkino) kommt in Ostdeutschland vor — schwererer Verlauf. **Tula-Virus** (TULV) ist selten, wird aber zunehmend als krankmachend erkannt. Weltweit gibt es weitere Typen, darunter das Sin Nombre-Virus in den USA und das Andes-Virus in Südamerika — beide greifen die Lunge an und sind deutlich tödlicher. → Mehr dazu in: [Dokument 01 — Virus-Typologie]

Kann ich mich mehrfach infizieren?

Nach einer durchgemachten Infektion mit dem gleichen Virustyp entwickelt der Körper wahrscheinlich eine lebenslange Immunität. Ob ein anderer Hantavirus-Typ erneut krank machen kann, ist nicht vollständig geklärt — es gibt Hinweise auf partielle Kreuzimmunität, aber keine absolute Sicherheit. Die meisten Menschen in Risikogebieten sind aber ohnehin nur einmal im Leben erkrankt. → Mehr dazu in: [Dokument 02 — Symptome & Verlauf]

Kategorie 2: Übertragung

Wie wird Hantavirus übertragen?

Der Hauptübertragungsweg ist das **Einatmen virushaltigen Staubs** aus Mäusekot, -urin oder -speichel. Das passiert typischerweise beim Fegen, Staubsaugen oder Umschichten von Holz in Kellern, Schuppen, Dachböden oder Gartenhäusern. Direkter Kontakt mit toten Mäusen oder deren Ausscheidungen ist ebenfalls möglich. Selten kann ein Nagetierbiss die Infektion übertragen. → Mehr dazu in: [Dokument 03 — Übertragungswege]

Kann ich mich von einem anderen Menschen anstecken?

Nein — bei den in Europa vorkommenden Hantaviren (Puumala, Dobrava, Tula) gibt es keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Das gilt auch für Deutschland seit über 20 Jahren Erfahrung. Einzige Ausnahme weltweit: das **Andes-Virus** in Südamerika (Argentinien/Chile), das bei engem, anhaltendem Kontakt übertragen werden kann — für Deutschland irrelevant, da das Reservoir hier nicht vorkommt. → Mehr dazu in: [Dokument 10 — Internationale Perspektive]

Können Hunde oder Katzen das Virus übertragen?

Hunde können das Virus nicht übertragen. Katzen können theoretisch Mäuse fangen und Viren übertragen, wenn sie Nagetierausscheidungen am Fell haben — dies gilt aber als extrem unwahrscheinlich. Katzen helfen sogar als natürliche Mäuseabwehr im Haus. Wichtig: Haustiere müssen nicht isoliert oder behandelt werden, wenn jemand im Haushalt erkrankt ist. → Mehr dazu in: [Dokument 03 — Übertragungswege]

Kann ich mich durch Mückenstiche infizieren?

Nein. Hantavirus wird **nicht** durch Mücken, Zecken, Flöhe oder andere Insekten übertragen. Es gibt keine Vektorübertragung. Die einzige Übertragungsquelle sind Nagetiere und deren Ausscheidungen. Das RKI bestätigt ausdrücklich: “Eine Ansteckung über Haustiere oder über Vektoren (Mücken oder Zecken) findet wahrscheinlich nicht statt.” → Mehr dazu in: [Dokument 03 — Übertragungswege]

Wie lange bleibt das Virus in der Umwelt aktiv?

Hantaviren können in getrockneten Nagetierausscheidungen **mehrere Tage bis Wochen** infektiös bleiben. In der Sonne und bei UV-Licht werden sie jedoch schnell zerstört. Das ist der Grund, warum Kellerräume, die lange ungenutzt waren, besonders riskant sind — dort kann sich staubtrockener, virushaltiger Mäusekot ansammeln. Feuchtigkeit und Kälte verlängern die Überdauerung. → Mehr dazu in: [Dokument 07 — Reinigungsprotokolle]

Kategorie 3: Symptome & Diagnose

Welche Symptome hat eine Hantavirus-Infektion?

Die Infektion beginnt plötzlich mit hohem Fieber (über 38,5 °C), starken Kopf- und Rückenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Typisch sind auch Gliederschmerzen und ein gerötetes Gesicht. In der zweiten Phase können die Nieren betroffen sein: verminderter Urin, Eiweiß oder Blut im Urin. 70–80 % aller Infektionen verlaufen jedoch beschwerdefrei oder nur mit leichten Grippe-Symptomen. → Mehr dazu in: [Dokument 02 — Symptome & Verlauf]

Wie lange dauert die Inkubationszeit?

Typisch sind **2 bis 4 Wochen** zwischen der Exposition (z. B. Kellerreinigung) und dem ersten Symptom. In Ausnahmefällen kann die Inkubationszeit nur 5 Tage oder bis zu 60 Tage (ca. 2 Monate) betragen. Wer also im Frühjahr einen belasteten Keller putzt, kann erst Wochen später Symptome bemerken — die Verzögerung erschwert oft die Zuordnung. → Mehr dazu in: [Dokument 02 — Inkubationszeit]

Wie wird Hantavirus diagnostiziert?

Die Diagnose erfolgt durch einen Bluttest im Labor: Der Nachweis spezifischer Antikörper (IgM, IgG) gegen Hantavirus mittels ELISA oder Immunblot ist der Goldstandard. In der frühen Phase (erste 5 Tage) kann auch eine PCR-Untersuchung helfen. Wichtig ist, dem Arzt möglichst den Verdacht auf Hantavirus zu nennen — ohne diesen Hinweis wird die Erkrankung oft übersehen, da die Symptome einer Grippe ähneln. → Mehr dazu in: [Dokument 08 — Diagnostik]

Was ist der Unterschied zwischen Hantavirus und Grippe?

Beide beginnen mit Fieber, Schmerzen und Müdigkeit — aber beim Hantavirus treten typischerweise **Nierenbeschwerden** (Flankenschmerzen, verminderter Urin, Blut im Urin) hinzu, die bei der Grippe fehlen. Hantavirus hat keine Atemwegssymptome wie Schnupfen oder Husten. Die entscheidende Frage ist: War es vor den Symptomen einen Kontakt mit Mäusen, Kellerreinigung oder eine Aktivität in einem Risikogebiet? Das Abgrenzungskriterium "Fieber + Nieren + Mäusekontakt" hilft Ärzten bei der richtigen Diagnose. → Mehr dazu in: [Dokument 02 — Symptome]

Muss ich ins Krankenhaus?

Nicht jeder Hantavirus-Fall erfordert einen Krankenhausaufenthalt — leichte Verläufe können zu Hause ausgeheilt werden. Eine Hospitalisierung ist nötig, wenn starke Nierenprobleme auftreten (verminderter Urin, Blut im Urin, starke Flankenschmerzen), der Blutdruck stark fällt oder Fieber über Tage anhält. Bei schweren Verläufen kann eine vorübergehende Dialyse notwendig sein — diese betrifft aber weniger als 10 % der Patienten. → Mehr dazu in: [Dokument 08 — Krankenhausaufenthalt]

Kategorie 4: Prävention

Wie kann ich mich schützen?

Die wichtigste Regel: **Nie trockenen Staub aufwirbeln!** Vor dem Putzen von Kellern, Dachböden oder Schuppen mindestens 30 Minuten lüften, dann Flächen mit Desinfektionsmittel oder einer Bleichlösung (1:10 Verdünnung) einsprühen, feucht aufwischen und Handschuhe sowie eine FFP2-/FFP3-Maske tragen. In Risikogebieten (Schwäbische Alb, Bayerischer Wald etc.) sollten besonders Forstarbeiter, Gärtner und Camper diese Maßnahmen konsequent umsetzen. Staubsauger ist tabu — dazu mehr bei Frage 18. → Mehr dazu in: [Dokument 07 — Reinigungsprotokolle]

Was tun bei Mäusen im Haus?

Erste Hilfe: Nahrungsquellen abschotten (Lebensmittel in dichten Behältern, kein Tierfutter über Nacht stehenlassen), Eintrittslücken verschließen (alle Öffnungen über 6 mm abdichten) und Schlagfallen aufstellen. Bei starkem Befall einen professionellen Schädlingsbekämpfer rufen (Kosten: ca. 400–600 €). Niemals mit dem Staubsauger Mäusekot entfernen! Essensreste gehören nicht auf den Kompost — das lockt Nager an. → Mehr dazu in: [Dokument 06 — Prävention Haus & Umfeld]

Darf ich den Staubsauger benutzen?

Nein — auf keinen Fall! Das RKI warnt ausdrücklich: Staubsauger verteilen die Viren durch das Gebläse in der Luft und können aus einer lokalen Kontamination eine ganze Raumluft verseuchen. Das gilt auch für Besen — trockenes Fegen wirbelt ebenfalls virushaltigen Staub auf. Die korrekte Methode: Einsprühen mit Desinfektionslösung, dann feucht aufwischen mit Papier oder Lappen. Erst danach kann normal gereinigt werden. → Mehr dazu in: [Dokument 07 — Reinigungsprotokolle]

Hilft eine Impfung?

Nein — es gibt derzeit **keinen zugelassenen Impfstoff** gegen Hantavirus in Europa. Die einzige Schutzmaßnahme ist die Vermeidung von Exposition. Forschungsarbeiten an Impfstoffen laufen, aber keine ist kurzfristig verfügbar. Prävention durch Verhaltensmaßnahmen und Mäusekontrolle bleibt daher die einzige effektive Strategie. → Mehr dazu in: [Dokument 01 — Grundlagen]

Was ist die 6mm-Regel?

Mäuse können durch Öffnungen von nur **6 Millimetern** schlüpfen — das ist die Dicke eines Bleistifts. Jede Lücke in Wänden, Türen, Fundamenten oder Rohrdurchführungen, die größer ist, muss verschlossen werden. Am besten eignet sich Stahlwolle (die Mäuse nicht durchbeißen können), ergänzt mit Silikon oder Beton. Diese Regel stammt von der CDC und ist das A und O der Mäuseprävention im Haus. → Mehr dazu in: [Dokument 06 — 6mm-Regel & Eintrittsschutz]



Kategorie 5: Behandlung & Nachsorge

Gibt es ein Medikament gegen Hantavirus?

Nein — es gibt **kein spezifisches Medikament** gegen Hantavirus. Die Behandlung ist *supportiv*, das heißt: Fiebersenkung (Paracetamol), ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Kreislaufstabilisierung und bei Bedarf Dialyse. Das Medikament Ribavirin wurde in Studien getestet, seine Wirksamkeit ist jedoch umstritten und es ist nicht offiziell zugelassen. Bei Verdacht auf Hantavirus sollten Sie sofort zum Arzt — auch wenn es kein spezifisches

Medikament gibt, kann die symptomatische Behandlung lebenswichtig sein. → Mehr dazu in: [Dokument 08 — Behandlung]

Wie lange dauert die Genesung?

Die akute Phase dauert typischerweise 1–2 Wochen, die vollständige Erholung **3 bis 6 Wochen**. In manchen Fällen kann Müdigkeit und Schwäche auch mehrere Monate anhalten. Die meisten Patienten erholen sich vollständig ohne bleibende Schäden. Eine Kontrolluntersuchung der Nierenwerte nach 3–6 Monaten wird empfohlen, besonders wenn es während der Erkrankung Nierenprobleme gab. → Mehr dazu in: [Dokument 08 — Genesung]

Kann ich Nieren-Schäden davontragen?

Bleibende Nierenschäden sind beim Puumala-Virus (dem häufigsten Typ in Deutschland) **sehr selten**. Die meisten Patienten erholen sich vollständig. In seltenen schweren Fällen kann eine chronische Nierenfunktionsstörung oder Bluthochdruck zurückbleiben — das betrifft weniger als 1 % der Erkrankten. Wer nach einer Infektion weiterhin Probleme mit der Nierenfunktion hat, sollte regelmäßig nierenärztlich kontrolliert werden. → Mehr dazu in: [Dokument 08 — Langzeitfolgen]

Kann ich wieder Sport machen?

Nach der akuten Phase und der vollständigen Fieberfreiheit kann langsam mit leichter Bewegung begonnen werden. Intensive Belastung sollte jedoch vermieden werden, bis die Nierenwerte wieder im Normbereich sind und keine Müdigkeit mehr besteht. Das individuelle Tempo ist entscheidend — wer zu früh überlastet, riskiert einen Rückfall. Ein klarer Arztbesuch vor dem Wiedereinstieg in den Leistungssport ist ratsam. → Mehr dazu in: [Dokument 08 — Nachsorge]

Muss ich das Gesundheitsamt informieren?

Nein — das übernimmt Ihr Arzt. Hantavirus ist in Deutschland seit 2001 meldepflichtig nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG § 7). Das heißt: Ihr behandelnder Arzt ist gesetzlich verpflichtet, einen bestätigten Fall anonym an das Gesundheitsamt zu melden. Sie selbst müssen nichts unternehmen. Die Meldung hilft, Ausbrüche frühzeitig zu erkennen und Risikogebiete zu identifizieren. → Mehr dazu in: [Dokument 04 — Meldepflicht]

Quellen

Quelle	URL	Abrufdatum
--------	-----	------------

Quelle	URL	Abrufdatum
Robert Koch-Institut (RKI) — Hantavirus	https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Hantavirus.html	Mai 2026
RKI Merkblatt — Vermeidung von Hantavirus-Infektionen	https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf	Mai 2026
RKI-Ratgeber Hantavirus-Erkrankung	https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Hantaviren.html	Mai 2026
CDC — About Hantavirus	https://www.cdc.gov/hantavirus/about/index.html	Mai 2026
gesund.bund.de — Hantavirus-Erkrankungen	https://gesund.bund.de/hantavirus-erkrankungen	Mai 2026
WHO — Hantavirus Fact Sheet	https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hantavirus	Mai 2026
ECDC — Hantavirus Annual Report 2023	https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/HANTAVIRUS_NTA_AER_2023.pdf	Mai 2026
Umweltbundesamt — Hantavirusprognose	https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/infektionsschutz/hantavirusprognose	Mai 2026
Proplanta — Hantavirus-Fallzahlen Deutschland	https://www.proplanta.de/karten/hantavirus-faelle-in-deutschland-2017-2026-uebersichtskarte260262020.html	Mai 2026
NetDoktor — Hantavirus	https://www.netdoktor.de/krankheiten/hantavirus/	Mai 2026
Barmer Krankenkasse — Hantavirus	https://www.barmer.de/gesundheitsverstehen/wissen/krankheiten-a-z/hantavirus-1238662	Mai 2026

Quelle	URL	Abrufdatum
ADAC — Hantavirus	https://www.adac.de/gesundheit/krankheiten/hantavirus/	Mai 2026
MSD Manual — Hanta-Virusinfektion	https://www.msdmanuals.com/de/profi/infektionskrankheiten/arboviren-arenaviren-und-filoviren/hanta-virusinfektion	Mai 2026
CDC — Seal Up to Prevent Rodents	https://www.cdc.gov/healthy-pets/rodent-control/seal-up.html	Mai 2026

Visuelle Tipps — Klappkarten-Format für Web

 SUCHFUNKTION – FAQ schnell finden Tippe: "Grippe" "Staubsauger" "Impfung" "Nieren"		
 Grundlagen  Übertragung  Symptome  Prävention  Behandlung	Q1-Q5 Q6-Q10 Q11-Q15 Q16-Q20 Q21-Q25	→ Was, Gefahr, Herkunft, Typen → Staub, Mensch, Tiere, Mücken → Anzeichen, Inkubation, Arzt → Schutz, Mäuse, 6mm-Regel → Medikamente, Genesung, Meldung
 Roter Kasten – Sofort zum Arzt wenn: • Fieber >38,5°C + starke Rücken-/Flankenschmerzen • Blut im Urin oder stark verminderter Urin • Plötzlicher Blutdruckabfall nach Mäusekontakt • Atemnot (nach Südamerika-Reise – Andes-Virus!)		

Recherchebasis: Dimension 01–10 der Hantavirus-Research-Serie, Cross-Verification-Dokument. Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Für medizinische Entscheidungen sind immer aktuelle Fachliteratur und Behördenmeldungen zu konsultieren.