

Hantavirus für besondere Gruppen: Schwangere, Kinder, Senioren, Immunsupprimierte

Ein spezialisierter Ratgeber für vulnerable Gruppen und deren Angehörige

⚠️ 1. Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und ersetzt keinesfalls eine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung. Risikogruppen sollten bei jeder Erkrankung mit Fieber und möglichem Mäusekontakt IMMER ärztlich beraten werden — zögern Sie nicht!

🇩🇪 2. Warum besondere Gruppen?

Bei den meisten Menschen verläuft Hantavirus mild: 80–85 % haben nur schwache oder keine Beschwerden [^56^]. Die Letalität von PUUV in Deutschland liegt deutlich unter 0,1 % [^40^]. Aber schwere Verläufe mit Nierenbeteiligung und Hospitalisierung treten bei bestimmten Gruppen häufiger auf.

Faktor	Auswirkung auf den Verlauf
Geschwächtes Immunsystem	Längere, schwerere Krankheitsphasen
Reduzierte Nierenreserve	Höheres Risiko für Dialysebedürftigkeit
Vorerkrankungen	Diabetes, Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen verschärfen den Verlauf
Unspezifische Symptome	Verzögerte Erkennung, spätere Behandlung

Frühe Erkennung und Vorsorge sind entscheidend.

👩 3. Schwangere & Stillende

Risiko: Daten begrenzt — maximale Vorsorge

Für Hantavirus in der Schwangerschaft gibt es nur begrenzte Daten. Aus medizinischer Sicht besteht **ein theoretisch erhöhtes Risiko** für einen schweren Verlauf: Schwangerschaft verändert Immunsystem und Nierenfunktion [^62^]. Mögliche Auswirkungen auf den Fetus sind **nicht gut erforscht**.

Prävention: Null-Toleranz-Strategie

Maßnahme	Umsetzung
Keine Reinigungsarbeiten in riskanten	Keller, Dachboden, Schuppen — andere

Maßnahme	Umsetzung
Bereichen	erledigen lassen
Kein Umschichten von Brennholz, kein trockenes Fegen	Staubaufwirbelung vermeiden
Kein direkter Mäusekontakt	Auch keine toten Mäuse berühren

Bei Verdacht: Sofort handeln

- **SOFORT Gynäkologe/Frauenarzt informieren** — auch bei “nur” leichtem Fieber nach Mäusekontakt
- **Expositionsverdacht** explizit nennen (Wohnort in Risikogebiet, Mäusebefall)
- **Keine Selbstmedikation** — bei Fieber nur **Paracetamol**. Keine NSAIDs (Ibuprofen, Diclofenac) ohne ärztliche Absprache [^1^]

4. Kleinkinder & Babys

Risiko: Milder Verlauf, aber Dehydrierung gefährlich

Hantavirus bei Kindern verläuft meist milder. Doch Fieber plus Erbrechen birgt bei Kleinkindern eine **erhöhte Dehydrierungsgefahr**.

Symptome bei Kindern: Oft unspezifisch

Altersgruppe	Typische Symptome
Babys	Fieber, Unruhe, verminderter Trinklust, blasser Teint
Kleinkinder (1–3 J.)	Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Fieber — oft als Magen-Darm-Infekt fehlgedeutet
Vorschulkinder (3–6 J.)	Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen; Rückenschmerzen schwer zu beschreiben

Prävention

- Spielzeug nicht im Keller/Dachboden lassen
- Kein Spielen in Räumen mit Mäusebefall
- Bettwäsche aus Kellerräumen vor Gebrauch waschen

Wann zum Kinderarzt?

Fieber + Erbrechen nach Mäusekontakt → Kinderarzt am selben Tag

Warnsignal	Handlung
Kaum Urin, trockene Windeln	Sofort Kinderarzt — Dehydrierungsgefahr!
Trinkt deutlich weniger	Sofort ärztliche Abklärung
Blut im Urin / dunkler Urin	Notfall — sofort Klinik
Apathie, Benommenheit, blasse Haut	Notarzt (112)

5. Senioren (65+)

Risiko: Höchste Hospitalisierungsrate

Senioren sind die am stärksten gefährdete Altersgruppe. **Patienten über 65 haben eine deutlich höhere Hospitalisierungsrate** [⁵⁶]. Von den wenigen dokumentierten Todesfällen in Deutschland seit 2001 waren die meisten ältere Patienten mit Vorerkrankungen [⁵⁶].

Vorerkrankungen verschärfen den Verlauf

Vorerkrankung	Risiko	Grund
Diabetes	Hoch	Immunabwehr eingeschränkt, Nieren vorbelastet
Herz-Kreislauf	Hoch	Blutdruckabfall wird schlecht toleriert
Chronische Nierenprobleme	Sehr hoch	Geringe Reserve, schnelles Nierenversagen
Bluthochdruck	Erhöht	Blutdrucksenker können Verlauf verschleiern

Prävention

- **Keine eigene Kellerreinigung** — Hilfe von Familie oder Dienste nutzen
- Brennholz nicht selbst umschichten
- FFP2-Maske bei Staubexposition

Regelmäßige Urin-Kontrollen bei Verdacht

Urin Teststreifen aus der Apotheke (Protein, Blut) täglich prüfen. Bei positivem Befund: sofortige ärztliche Abklärung.

6. Immunsupprimierte — HÖCHSTE GEFÄHRDUNG!

 **Höchstes Risiko für schweren, längeren Verlauf mit lebensbedrohlichen Komplikationen.**

Betroffene Gruppen

Organtransplantierte, Chemo-/Strahlentherapie-Patienten, Autoimmunerkrankungen unter Biologika/Steroiden, HIV/AIDS mit niedrigem CD4-Count, Langzeit-Steroidtherapie.

Warum so gefährlich?

Ein abgeschwächtes Immunsystem bekämpft das Virus nicht effektiv. Das führt zu längerer Virämie, verzögerter Antikörperbildung (Serodiagnostik verspätet positiv), schwererem Verlauf aller 5 Krankheitsphasen [¹⁶] und höherem Risiko für Organkomplikationen.

Prävention: Absolute Vermeidung

- **Kein Betreten** von Keller, Dachboden, Schuppen ohne professionelle Vorabreinigung
- Professionellen Schädlingsbekämpfer bei Mäusebefall beauftragen

- Risikogebiete für Outdoor-Aktivitäten meiden

Bei Verdacht: SOFORT Eskalation

1. **Transplantationszentrum / Onkologe / HIV-Schwerpunkt SOFORT kontaktieren**
2. **Nicht auf Hausarzt warten** — direkt Spezialist
3. **Ribavirin** wird in Einzelfällen diskutiert, ist aber **nicht zugelassen** — nur off-label im klinischen Setting unter Spezialisten [^1^][^11^]
4. **Frühe Hospitalisation** zur Überwachung empfohlen



7. Berufsgruppen mit erhöhtem Risiko

Beruf	Risiko	Empfohlene Maßnahmen
Forstarbeiter	Hoch	FFP3 bei Holzarbeiten, Handschuhe; Impfung nicht verfügbar [^79^][^83^]
Landwirte	Hoch	Schutzkleidung, keine offenen Wunden; RR = 5,2 [^79^]
Schädlingsbekämpfer	Sehr hoch	Professionelle Ausrüstung, regelmäßige Checks [^50^]
Camper/Outdoor	Mittel	Zelt nicht auf Mäusekot, keine provisorischen Unterkünfte [^11^]
Soldaten im Gelände	Mittel	Feldlager-Hygiene, keine Schlafplätze in verlassenem Gebäuden [^50^]

Hinweis: Eine Hantavirus-Impfung existiert **nicht**. Schutzmaßnahmen sind die einzige Prävention [^62^].



8. Spezielle Warnsignale (bei vulnerablen Gruppen)

Regel für alle Risikogruppen: Bei Fieber + Mäusekontakt = sofort ärztliche Abklärung, auch bei milden Symptomen.



Rote Warnkarte — SOFORT NOTARZT (112)

Symptom	Bedeutung
Blutdruck <90/60 mmHg	Schockgefahr
<400 ml Urin/Tag	Akutes Nierenversagen
Blut im Urin	Schwere Nierenphase
Atemnot, Bewusstseinsstörung	Lungenödem / Schock



Gelbe Warnkarte — Am selben Tag zum Arzt

Symptom	Bedeutung
Fieber >38,5°C + Rücken-/Kopfschmerzen	Beginn Hantavirus-Infektion
Erbrechen + Fieber nach Mäusekontakt	Verdacht (besonders bei Kindern)

Symptom	Bedeutung
Dunkler/tee-farbener Urin	Blut im Urin möglich
Extreme Müdigkeit plötzlich	Beginn hypotensive Phase

Grüne Karte — Beobachten & dokumentieren

Symptom	Handlung
Leichtes Fieber <38,5°C	Stündlich messen, Tracker führen
Kopf-/Gliederschmerzen	Paracetamol, Flüssigkeit, Arzt informieren

9. Notfall-Plan für Risikogruppen

Vorsorge: Jetzt vorbereiten

Schritt	Umsetzung
Hausarzt vorab informieren	“Ich gehöre zur Risikogruppe und lebe in Risikogebiet/wir haben Mäuse”
Notfallkontakt	24h erreichbaren Arzt identifizieren
Krankenhaus finden	Nächstes Haus mit Nephrologie + Intensivstation
Symptom-Tracker	Tägliche Dokumentation führen (siehe unten)

Notfallkarte für den Kühlschrank

NOTFALLKARTE – HANTAVIRUS-RISIKO	
Patient/in: _____ Risikogruppe: ☐ Schwanger ☐ Kind ☐ 65+ ☐ Immun- ☐ Transplantiert ☐ Chemo ☐ Autoimmun	
HAUSARZT: _____ Tel: _____ NOTFALL-24h: _____ Tel: _____ FACHARZT: _____ Tel: _____	
NÄCHSTES KRANKENHAUS (Nephrologie + ITS): Name: _____ Tel: _____ Adresse: _____	
BEI VERDACHT SOFORT:  112 (Notarzt)	

Täglicher Symptom-Tracker

Parameter	Normal	Alarm
Körpertemperatur	<37,5°C	>38,5°C
Blutdruck	>90/60	<90/60
Urinmenge/Tag	>500 ml	<400 ml
Urin-Farbe	Hellgelb	Dunkel/rot/braun

Parameter	Normal	Alarm
Herzfrequenz	60–100/min	>100/min
Schmerzen (0–10)	0–2	>5

Zwei oder mehr Alarmwerte → SOFORT ARZT oder NOTARZT!

10. Quellen

Nr.	Quelle	Institution
[^1^]	RKI-Ratgeber Hantavirus-Erkrankung	Robert Koch-Institut
[^11^]	RKI Merkblatt Hantavirus	Robert Koch-Institut
[^16^]	Human hantavirus infections: A review	PMC/NIH
[^40^]	Die Welt der Hantaviren	Pharmazeutische Zeitung
[^50^]	Erregersteckbrief Hantaviren	Zoonosen.net / FLI
[^56^]	RKI Surveillance-Daten 2001-2017	Eurosurveillance / RKI
[^62^]	Hantavirus-Informationen	Robert Koch-Institut
[^67^]	About Hantavirus	CDC
[^79^]	Berufliche Gefährdung durch Hantaviren	BAUA
[^83^]	Virus aus dem Wald	SVLFG / agrarheute

Fachgesellschaften

RKI — Robert Koch-Institut | **CDC** — Centers for Disease Control | **DGGG** — Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe | **DGKN** — Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin | **AWMF** — Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftl. Medizin. Fachgesellschaften

11. Visuelle Tipps

Ampel-Risikosystem pro Gruppe

Gruppe	Risikolevel	Eskalation bei
Allgemeine Bevölkerung	 Mittel	Fieber >38,5°C + Rücken-/Nierenschmerzen
Kinder (0–6 J.)	 Mittel	Fieber + Erbrechen + Mäusekontakt
Schwangere & Stillende	 Hoch	Fieber + Expositionsverdacht → Gynäkologe
Senioren (65+)	 Sehr hoch	Fieber + Vorerkrankung → sofort Arzt
Immunsupprimierte	 Sehr hoch	Jede Temperatur + Exposition → Spezialist

Symptom-Warnkarte (Kurzreferenz)

SYMPTOM-WARNKARTE – RISIKOGRUPPEN

● **SOFORT 112 (NOTARZT)**

- Blutdruck <90/60 mmHg
- Weniger als 400 ml Urin/Tag
- Blut im Urin
- Atemnot oder Bewusstseinsstörung
- Starke Blutungen / blaue Flecken

● **Am selben Tag zum Arzt**

- Fieber >38,5°C + Rücken-/Kopfschmerzen
- Dunkler/tee-farbener Urin
- Extremes Schwächegefühl
- Erbrechen + Fieber nach Mäusekontakt (Kinder!)

● **Beobachten & dokumentieren**

- Leichtes Fieber <38,5°C
- Kopfschmerzen, Gliederschmerzen
- Allgemeines Unwohlsein nach Risikoaktivität

Letzte Aktualisierung: Mai 2026. Alle Angaben ohne Gewähr — medizinische Informationen ersetzen keine ärztliche Beratung.

Gehören Sie zu einer Risikogruppe und haben Fieber nach möglichem Mäusekontakt — zögern Sie nicht. Rufen Sie Ihren Arzt an. Heute. Jetzt.