

Table of Contents

Sichere Reinigungs-Anleitung fuer Hantavirus-kontaminierte Bereiche.....	1
⚠️ WICHTIG: Wann diese Anleitung gilt	1
🧑 PPE-Materialliste: ALLES vorher besorgen!	2
❌ Was NIEMALS zu tun ist.....	3
✅ Schritt-fuer-Schritt-Anleitung	4
💧 Dosierungs-Tabelle	7
📋 Entscheidungs-Baum: Profi oder DIY?	7
🆘 Nach der Reinigung: Was tun bei Symptomen?	8
📖 Quellenverzeichnis	9
🎨 Tipps fuer visuelle Elemente (fuer Designer/Layout)	13

Sichere Reinigungs-Anleitung fuer Hantavirus-kontaminierte Bereiche

⚠️ **Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Verdacht auf eine Hantavirus-Infektion konsultieren Sie umgehend einen Arzt oder das Gesundheitsamt. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Mai 2026.

⚠️ WICHTIG: Wann diese Anleitung gilt

Diese Schritt-fuer-Schritt-Anleitung muessen Sie anwenden, wenn Sie in einem der folgenden Szenarien eine moegliche Kontamination mit Hantaviren vermuten:

Situation	Risiko	Sofort-Massnahme
🐭 Maeuse in Keller, Dachboden, Gartenhaus oder Garage entdeckt	Erhoeht	Diese Anleitung befolgen
💩 Maeusekot, Nestmaterial oder gelbliche Flecken sichtbar	Hoch	Keinen Kontakt – Anleitung befolgen
🏠 Langzeit leerstehenden Raum aufräumen	Erhoeht	Lueften + PPE + Anleitung
🐭 Tote Maeuse oder Nester gefunden	Hoch	Doppelte Verpackung + Desinfektion
🍂 Fruehjahrsputz in Schuppen, Scheune oder Ferienhaus	Moderat bis hoch	Anleitung befolgen, besonders in Risikogebieten

Hintergrund: Hantaviren werden von infizierten Nagetieren ueber Kot, Urin und Speichel ausgeschieden. In getrockneten Ausscheidungen koennen die Viren mehrere Tage bis Wochen infektiues bleiben [^11^][^40^]. Kein direkter Kontakt mit lebenden Nagern ist fuer eine Infektion notwendig – das Aufwirbeln von kontaminiertem Staub reicht aus [^11^][^57^].

⚠ Wichtig: Diese Anleitung gilt fuer Privathaushalte bei leichtem bis moderatem Befall. Bei starkem Befall, mehreren betroffenen Raeumen oder besonderen Gesundheitsrisiken rufen Sie besser sofort einen Profi (siehe Abschnitt 7: Entscheidungs-Baum).

PPE-Materialliste: ALLES vorher besorgen!

Schaffen Sie sich **VOR** der Reinigung die komplette Schutzausruestung an. Fehlendes Material ist kein Grund, auf Schutz zu verzichten!

Gegenstand	Spezifikation	Wo kaufen	Kosten ca.
 Maske	FFP3 (optimal) oder FFP2 (Minimum)	Baumarkt, Apotheke, Online	2–5 EUR
 Handschuhe	Einweg-Nitrilhandschuhe, 2 Paar	Drogerie, Baumarkt	5–10 EUR
 Schutzbrille	Spritzschutzbrille (seitlich geschlossen)	Baumarkt	5–15 EUR
 Schutzkleidung	Langarm, alte Kleidung, ggf. Einmal-Overall	Schrank / Baumarkt	0–10 EUR
 Spruehflasche	Leere Flasche mit feinem Spruehkopf (kein Nebel!)	Haushalt / Drogerie	1–3 EUR
 Muellbeutel	Reißfeste Plastiktueten, mind. 2 Stueck	Supermarkt	2–5 EUR
 Desinfektionsmittel	Haushaltsbleiche (Natriumhypochlorit) ODER viruzides Mittel	Drogerie, Supermarkt	2–5 EUR
 Einwegtuecher	Starke Papiertuecher oder Einmal-Lappen	Supermarkt	2–4 EUR

PPE-Checkliste (abhacken vor Beginn!)

- ☐ FFP3-/FFP2-Maske vor Ort und passend
- ☐ 2 Paar Einweg-Nitrilhandschuhe
- ☐ Spritzschutzbrille
- ☐ Langaermliche alte Kleidung bereitgelegt
- ☐ Bleichloesung oder Desinfektionsmittel gemischt
- ☐ Spruehflasche befuellt

- ☐ 2+ reißfeste Plastiktüten
- ☐ Einwegtücher/Papiertücher
- ☐ Alte Kleidung fuer spätere 60°C-Wäsche markiert

 **Spezielle Risikogruppen:** Schwangere, immungeschwächte Personen, Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen oder Herzerkrankungen sollten die Reinigung **NICHT selbst durchführen** – stattdessen sofort einen Profi beauftragen ^[135]^[118].

Was NIEMALS zu tun ist

Die folgenden Fehler koennen eine Hantavirus-Infektion direkt verursachen. Lesen Sie sich diese Liste mehrfach durch – bis sie sicher sitzt.

Verbot	Warum gefaehrlich	Quelle
 NIE trocken fegen!	Wirbelt virusbeladenen Staub auf = Aerosole werden eingeatmet	RKI ^[11] , CDC ^[149]
 NIE Staubsauger benutzen!	Verteil Viren durch die Abluft im ganzen Raum!	RKI ^[11] , gesund.bund.de ^[136]
 NIE ohne Maske arbeiten!	Einatmen von nur einem Viruspartikel kann reichen	RKI ^[11] , FLI ^[143]
 NIE Mausekot mit bloßen Haenden anfassen!	Virus kann ueber Hautkontakt/Schleimhaute eindringen	RKI ^[11] , Auswaertiges Amt ^[60]
 NIE Mause/Nestmaterial im Gartenkompost entsorgen!	Virus bleibt im Kompost aktiv; Gefahr fuer Familie/Nachbarn	RKI ^[11] , LGL Bayern ^[162]
 NIE feinen Spruehnebel erzeugen!	Kleinste Troepfchen transportieren Viren wie Staub	Pharmazeutische Zeitung ^[167]

Die schlimmsten Fehler im Ueberblick:

1. **Staubsauger statt feuchtem Wischen** – Der haeufigste und gefaerlichste Fehler. Nahezu alle Gesundheitsaemter warnen explizit davor ^[11]^[136]^[143]^[145]^[149].
2. **Trockenes Fegen mit Besen** – Zweit-haeufigster Fehler. Besonders verlockend bei “nur ein paar Koernchen” – aber gerade kleine, getrocknete Kotreste sind hochinfektiös.
3. **“Ich mach das mal schnell ohne Maske”** – Die Inkubationszeit betraegt 2–4 Wochen ^[119]^[72]. Wenn die Symptome kommen, ist es zu spaet.

✅ Schritt-fuer-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Vorbereitung (am Vortag oder mind. 1 Stunde vorher)

Was Sie tun muessen:

1. ✅ **PPE bereitlegen** – Alle Gegenstaende aus der Materialliste bereitstellen
2. ✅ **Bleichloesung anmischen** – 1 Teil Haushaltsbleiche + 10 Teile Wasser (siehe Dosierungs-Tabelle unten)
3. ✅ **Spruehflasche befuellen** – Mit frischer Bleichloesung oder viruzidem Desinfektionsmittel
4. ✅ **Raum 30 Minuten kraeftig durchlueften**
 - ALLE Fenster und Tueren weit oeffnen
 - Querlueftung herstellen (gegenueberliegende Fenster offen)
 - **Raum verlassen** – waehrend der Lueftung niemand drinnen aufhalten [^11^][^149^]
 - Direktes Sonnenlicht unterstuetzt die Virus-Inaktivierung [^153^]



Zeitaufwand: 30 Minuten Lueftung + 15 Minuten Vorbereitung



Wichtig: Die Bleichloesung muss **taeglich frisch** angesetzt werden! Chlor entweicht und die Wirksamkeit nimmt rapide ab [^148^][^153^].

Schritt 2: Sicherheitsschutz anlegen

In dieser exakten Reihenfolge:

1. 🧤 **Maske aufsetzen** – FFP3 oder FFP2
 - Dicht sitzen lassen! Barttraeger beachten: Dichtigkeit beeintraehtigt
 - Nasenbügel fest andruecken
 - Ein- und Ausatemen testen – bei Luftsickern: neue Maske
2. 🧤 **Handschuhe anziehen** – 2 Paar übereinander = Extra-Sicherheit
 - Paar 1: Nitrilhandschuh direkt auf der Haut
 - Paar 2: Zweiter Handschuh darueber
 - Bei Beschädigung: sofort wechseln
3. 🧴 **Schutzbrille aufsetzen** – Seitlich geschlossene Spritzschutzbrille
 - Auch bei Brillentraegern: ueber die Brille oder Kontaktlinsen + Brille
4. 🧥 **Langarmige alte Kleidung** anziehen
 - Enge Buendchen an Armen und Beinen
 - Keine offene Haut freilegen
 - Bei starkem Befall: Einmal-Overal aus dem Baumarkt



Tipp: Machen Sie einen “Schütteltest” – wenn Sie sich bewegen, darf nichts rutschen oder abfallen.

Schritt 3: Oberflaechen einspruehen

Dies ist der wichtigste Schritt der gesamten Anleitung!

1.  **Bleichloesung 1:10 anmischen** (falls noch nicht geschehen)
 - 1 Teil Haushaltsbleiche + 10 Teile Wasser = ca. 0,5% Natriumhypochlorit [^147^][^148^][^149^][^153^]
 - Alternative: Handelsuebliches viruzides Desinfektionsmittel (lt. Etikett)
2.  **ALLE kontaminierten Oberflaechen GROEZUEGIG einspruehen:**
 - Maeusekot-Stellen
 - Nestmaterialien
 - Urinflecken (gelbliche Verfaerbungen)
 - Arbeitsflaechen, Boeden, Regale
 - Tote Maese und Maeusefallen
 - **Von oben nach unten arbeiten!**
3.  **10 Minuten Einwirkzeit abwarten!**
 - Nicht wischen, nicht beruehren, nicht druebergangen
 - Mindestens 5 Minuten (CDPH) [^147^], besser 10 Minuten (NPS) [^153^]
 - Die Feuchtigkeit bindet den Staub und verhindert Aufwirbelung

 **Wichtig:** Spruehen Sie so, dass die Flaeche **gleichmaeßig nass** wird – nicht nur leicht benebeln! Ein groeßzuegiger Spruehstrahl ist besser als ein feiner Nebel [^167^].

Schritt 4: Feucht aufwischen

Nur nach vollstaendiger Einwirkzeit!

1.  **Mit Einwegtuechern oder feuchtem Lappen aufwischen**
 - Immer von **oben nach unten** arbeiten
 - Von **hinten nach vor** arbeiten (zum Ausgang hin)
 - Nie die gleiche Stelle zweimal mit dem gleichen Tuch
2.  **Tuecher hauefig wechseln**
 - Ein Tuch pro Flaeche – nicht quer verwenden!
 - Benutzte Tuecher sofort in den Muellbeutel
3.  **Was Sie auf keinen Fall tun duerfen:**
 - NIE trocken wischen!
 - NIE den Staubsauger benutzen!
 - NIE fegen – auch nicht nass!
 - NIE mit der bloßen Hand aufwischen!

 **Korrekte Technik:** Papiertuecher, Schwamm oder Mopp verwenden – alles Einweg oder danach desinfizieren [^149^].

Schritt 5: Tote Mäuse und Nester entsorgen

Das LGL Bayern empfiehlt ein spezifisches 6-Schritt-Protokoll ^[^162^]:

Schritt	Aktion
1	Desinfizieren – Toten Nagetier/Nest mit Bleichlösung einsprühen
2	Plastiktüte stülpen – Tüte von innen nach außen drehen, über die handschuhtragende Hand stülpen
3	Aufnehmen – Mit der überstülpten Tüte das Tier/Nest aufnehmen
4	Verschliessen – Tüte umdrehen, verschliessen (Knoten oder ZIP)
5	Doppelverpackung – Erste Tüte in zweite Plastiktüte geben, auch verschliessen ^[^153^]
6	Entsorgen – Im Restmüll entsorgen (NICHT im Bio-Müll!) ^[^11^]

⚠ **Wichtig:** Halten Sie das Material immer auf Armhöhe Abstand und achten Sie darauf, keinen Staub aufzuwirbeln ^[^153^].

Schritt 6: Nachbereitung

Dieser Schritt schützt Sie UND Ihre Familie:

- 🧤 **Handschuhe ausziehen**
 - Von innen nach außen stülpen (berühren Sie nie die Aussenseite mit nackter Haut)
 - Beide Paare gleichzeitig oder nacheinander
 - In Plastiktüte geben, verschliessen
- 👐 **Hände gründlich waschen**
 - Warmes Wasser + Seife
 - Mindestens 20 Sekunden (Geburtstagslied 2x singen)
 - Auch zwischen den Fingern und unter den Nägeln
- 🚿 **Duschen + Haare waschen**
 - Unmittelbar nach den Arbeiten ^[^11^]^[^143^]^[^145^]
 - Auch wenn Sie “nichts gespuehrt” haben
 - Haare sind Staubfänger – immer waschen!
- 👕 **Arbeitskleidung SOFORT bei 60°C waschen**
 - Separat vom normalen Haushaltswaschgang ^[^136^]
 - Nicht vorher im Haus herumtragen!
 - Bei Einweg-Overall: direkt im Restmüll entsorgen
- 🥋 **Wiederverwendbare PPE desinfizieren**
 - Schutzbrille und Maske (falls wiederverwendbar): 1 Stunde direktem Sonnenlicht aussetzen ^[^153^]
 - UV-Strahlen zerstören Hantaviren ^[^148^]^[^149^]

✓ **Erledigt!** Sie haben sicher und fachgerecht gereinigt.

Dosierungs-Tabelle

Anwendung	Mischung	Einwirkzeit	Wirksamkeit
Flaechendesinfektion (1 Liter)	100 ml Bleiche + 900 ml Wasser (1:10)	10 Min.	Vollstaendig [^146^]
Spruehflasche (500 ml)	50 ml Bleiche + 450 ml Wasser	10 Min.	Vollstaendig [^146^]
Kleine Spruehflasche (250 ml)	25 ml Bleiche + 225 ml Wasser	10 Min.	Vollstaendig [^146^]
Handelsuebliches Desinfektionsmittel	Laut Etikett anmischen	Laut Etikett	Ausreichend [^148^]
Virkon S (Alternative)	1% Loesung (10 g/Liter)	10 Min.	Vollstaendig [^146^]
Peressigsaeure (Alternative)	1% Loesung	10 Min.	Vollstaendig [^146^]

⚠ **Wichtige Regeln fuer die Bleichloesung:**

- **TAEGLICH frisch ansetzen!** – Chlor entweicht, Wirksamkeit nimmt ab [^148^][^153^]
- **Nicht mischen** mit anderen Reinigungsmitteln (Ammoniak, Saeuren) – giftige Daempfe!
- **Nicht auf Metall** anwenden – korrodiert
- **Nicht auf farbige Textilien** – bleicht aus
- **Kinder und Haustiere** fernhalten
- **Gut beschriften** – nicht als Trinkwasser verwenden

Warum funktioniert das? (Kurze Erklaerung)

Hantaviren sind von einer lipidhaltigen Hülle (Fettschicht) umgeben und sind daher relativ fragil. Fettloesemittel wie Bleiche, Alkohol und handelsuebliche Desinfektionsmittel zerstoeren diese Hülle und toeten das Virus ab [^148^][^146^].

Entscheidungs-Baum: Profi oder DIY?

WENN: 1-2 Maeuse, kleiner Bereich (< 10 m²), ein Raum

→ ✓ DIY mit PPE (diese Anleitung befolgen)

WENN: Mehrere Raeume betroffen, starker Befall, Kot ueberall

→ ⚠ **PROFI-SCHAEDLINGSBEKAEMPFER** rufen [^135^]

WENN: Schwangere, Immunschwaechе, Atemwegserkrankungen

→ ✗ **NIEMALS** selbst machen – **IMMER Profi!** [^118^]

WENN: Lebensmittelbereich betroffen (Kueche, Vorratskammer)

→ **✗** IMMER Profi + Behoerden informieren [^158^]

Detaillierte Entscheidungshilfe:

Situation	Empfehlung	Schaetzung Kosten	Quelle
Erste Kotpuren, kleiner Bereich	DIY + PPE	10–30 EUR Material	ADAC [^135^]
1–2 tote Maeuse, isolierter Befall	DIY + PPE	10–30 EUR Material	RKI [^11^]
Wiederkehrender Befall	Kammerjaeger rufen	80–200 EUR	CMB [^158^]
Mehrere Raeume/Etagen	Professionelle Hilfe	200–500 EUR	ADAC [^135^]
Stark verschmutzt, Nest ueberall	Professionelle Hilfe	200–1000 EUR	ADAC [^135^]
Befall in Lebensmittelbereich	SOFORT Kammerjaeger + Behoerden	300–1000 EUR	CMB [^158^]
Schaeden an Elektrik/Bausubstanz	Profi + Elektriker	Individuell	ADAC [^135^]

Was kostet der Profi?

- **Einfache Faelle:** 80–200 EUR (Befallsinspektion + erste Massnahmen) [^135^]
- **Hartnaeckiger Befall:** bis zu 1.000 EUR (je nach Region und Aufwand) [^135^]
- **Wichtig:** Giftkoeder (Rodentizide) duerfen in Deutschland **NUR** von geschulten Kammerjaegern eingesetzt werden [^135^][^166^]

 **Tipp:** Die Kosten fuer einen Kammerjaeger sind ein Bruchteil der potenziellen Krankenhauskosten bei einer Hantavirus-Infektion. Bei Zweifeln: lieber den Profi rufen!

Nach der Reinigung: Was tun bei Symptomen?

Die Inkubationszeit fuer Hantavirus betraegt **2–4 Wochen** (extrem: 5 Tage bis 8 Wochen) [^119^][^72^][^107^]. Das bedeutet: Symptome treten nicht sofort auf. Bleiben Sie wachsam!

Symptom-Tracker (taeglich fuer 8 Wochen fuehren):

Datum	Fieber (°C)	Kopfschmerzen	Rueckenschmerzen	Uebelkeit	Atemnot	Notiz
-------	-------------	---------------	------------------	-----------	---------	-------

Sofort zum Arzt, wenn folgende Kombination auftritt:

-  **Fieber + Rueckenschmerzen** nach 2–4 Wochen nach der Reinigung

-  **Fieber + Kopfschmerzen + Uebelkeit**
-  **Atemnot oder trockener Husten** nach initialen grippalen Symptomen
-  **Bauchschmerzen + Augenroetung**

Was Sie beim Arztbesuch sagen sollten:

“Ich habe vor [X Wochen] einen Keller/Dachboden mit Maeusekot gereinigt. Seit [X Tagen] habe ich Fieber und [Symptome]. Koennte das ein Hantavirus sein?”

Fruehe Diagnose und Ueberwachung sind lebenswichtig – das Hantavirus-Pulmonale-Syndrom (HPS) kann schwer verlaufen [¹¹⁹][¹⁰⁷].

Quellenverzeichnis

[^# ^]	Quelle	URL	Da tu m
[^1 1^]	RKI Merkbl att: Informa tionen zur Vermei dung von Hantavi rus- Infektio nen	https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf	Ak tue ll
[^6 0^]	Auswae rtiges Amt: Hantavi rus- Infektio nen	https://www.auswaertiges-amt.de/de/reiseunsicherheit/reise-gesundheit/hantavirus-infektionen-2562872	20 26- 05- 11
[^7 2^]	RKI Falldefi nitione n 2026: Hantavi rus- Erkrank ung	https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Meldewesen/Falldefinitionen/Downloads/Hantavirus.pdf	20 26

[^# ^]	Quelle	URL	Da tu m
[^1 07^]	WHO Fact Sheet: Hantavi rus	https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hantavirus	20 26- 05- 06
[^1 18^]	Barmer Kranke nkasse: Hantavi rus	https://www.barmer.de/gesundheits-verstehen/wissen/krankheiten-a-z/hantavirus-1238662	Se p 20 23
[^1 19^]	RKI- Ratgeber r Hantavi rus- Erkrank ung	https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Hantaviren.html	20 20- 11- 13
[^1 35^]	ADAC: Maeuse bekaem pfen	https://www.adac.de/rund-ums-haus/wohnen/haushalt/maeuse-bekaempfen/	Ap r 20 26
[^1 36^]	gesund. bund.de : Hantavi rus- Erkrank ungen	https://gesund.bund.de/hantavirus-erkrankungen	Au g 20 24
[^1 43^]	Radio Koeln / FLI: Hantavi rus – Naeger und Staub sind das Proble m	https://www.radiokoeln.de/artikel/hantavirus-naeger-und-staub-sind-das-problem-2640530.html	Ma i 20 26
[^1 45^]	R+V Versich erung:	https://www.ruv.de/newsroom/infocenter/maeuse-krankheiten	Ma erz 20

[^# ^]	Quelle	URL	Da tu m
	Maeuse Krankh eiten		26
[^1 46^]	PMC Study: Inactiva tion of Hantavi rus by Chemic al Disinfec tants	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7185759/	20 20
[^1 47^]	CDPH Californ ia: Hantavi rus Pulmon ary Syndro me	https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/HantavirusPulmonarySyndrome.aspx	Jan 20 26
[^1 48^]	CDC: Hantavi rus Safety Precaut ions	https://cdn.ymaws.com/members.cshema.org/resource/collection/2DCC4A23-4C20-48C7-8ED6-F663811DA356/Hantavirus_Safety_Precautions_and_Cleaning_Pro.pdf	N/ A
[^1 49^]	CDC Guideli nes: Cleanin g Up After Rodents	https://www.csuci.edu/vpbfa/ehs/cdc-reference-cleaningupafter-rodents.pdf	N/ A
[^1 53^]	Nationa l Park Service: Hantavi rus Fact Sheet	https://www.nps.gov/articles/000/upload/Hantavirus-fact-sheet-and-light-infestation-cleaning-guidanceJune2025-508c.pdf	Jun 20 25
[^1	CMB	https://www.cmb-kammerjaeger.de/hantavirus-durch-maeuse-und-	Ma

[^# ^]	Quelle	URL	Da tu m
58^]	Kamme rjaeger: Hantavi rus durch Maeuse und Ratten	ratten-warum-nagetierbefall-ernst-genommen-werden-sollte/	i 20 26
[^1 62^]	LGL Bayern: Entsorg ung tote Kleinsa euger	https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/borna/doc/infoblatt_entsorgung_tote_kleinsaeuger_final.pdf	N/ A
[^1 66^]	ADAC: Rodenti zid- Giftkoe der	https://www.adac.de/rund-ums-haus/wohnen/haushalt/maeuse-bekaempfen/	Ap r 20 26
[^1 67^]	Pharma zeutisch e Zeitung: Von Maeuse n auf Mensch en	https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-322010/von-maeusen-auf-menschen/	Au g 20 10
[^4 0^]	Pharma zeutisch e Zeitung: Die Welt der Hantavi ren	https://www.pharmazeutische-zeitung.de/die-welt-der-hantaviren-165120/	Ma i 20 26
[^5 7^]	Berliner Morgen post: Hantavi rus –	https://www.morgenpost.de/ratgeber-wissen/article411940012/hantavirus-inkubationszeit-von-mehreren-wochen-das-sagt-das-rki.html	Ma i 20 26

[^# ^]	Quelle	URL	Datum
	Inkubationszeit		

Tipps fuer visuelle Elemente (fuer Designer/Layout)

Position	Visuelles Element	Beschreibung
Seite 1, Kopf	Warnbannern rot/gelb	“ACHTUNG: Hantavirus-Reinigung – Schutzpflicht!”
Abschnitt 2	PPE-Materialliste als Infografik	Fotos: FFP3-Maske, Nitrilhandschuhe, Schutzbrille, Spruehflasche mit Bleichloesung
Abschnitt 3	Verbotssymbole	Große rote Kreise mit Durchstreichung: Besen, Staubsauger, blasse Hand, Kompostbehälter
Abschnitt 4	Schritt-fuer-Schritt-Fotos	6 Fotos: (1) Fenster oeffnen, (2) Maske aufsetzen, (3) Einspruehen, (4) Feucht wischen, (5) Doppelte Verpackung, (6) Haende waschen
Abschnitt 5	Dosierungstabelle als Grafik	Messbecher-Illustration: 1 Teil Bleiche + 10 Teile Wasser
Abschnitt 6	Entscheidungs-Baum als Flowchart	Ja/Nein-Pfade: “Starker Befall? → Ja → PROFI” / “Nein → DIY”
Abschnitt 7	Symptom-Tracker als Vorlage	Tabelle zum Ausdrucken und Ausfuellen
Gesamtdokument	Rand-Farbcodierung	Rot = Verbot, Gruen = Handlung, Gelb = Warnung, Blau = Info
Letzte Seite	QR-Code	Link zum RKI-Merkblatt: https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf

Empfohlene Farbcodes:

- **Rot:** Verboten/Nie (trocken fegen, Staubsauger, blasse Haende)
- **Gruen:** Richtig/Sicher (feucht wischen, PPE, Lueften)
- **Gelb:** Warnung/Vorsicht (Bleichloesung, Inkubationszeit)

-  **Blau:** Information/Checklisten

Icons fuer schnelle Orientierung:

-  = PPE/Schutz
-  = Zeit/Warten
-  = Warnung
-  = Richtig
-  = Falsch
-  = Arzt/Medizin
-  = Notfall/Symptome

Dokument erstellt: Mai 2026 | Basis: RKI-Merkblatt, CDC Guidelines, NPS Fact Sheet, LGL Bayern, Peer-Reviewed Studies | Alle Angaben mit Inline-Citations versehen.

 **Naechste Schritte:** - Dokument 1: Hantavirus-Grundwissen (Fuer Einsteiger) -
Dokument 2: Praeventions-Guide (Fuer Hausbesitzer & Gartenbesitzer) -
Dokument 4: Symptom-Tracker & Notfall-Guide (Fuer alle)