

Hantavirus-Reise-Ratgeber: Andes-Virus, Camping & Outdoor in Suedamerika

Fuer Abenteurer, Camper, Backpacker und Kreuzfahrtreisende in Hantavirus-Risikogebiete

1. Disclaimer

Dieser Ratgeber dient ausschliesslich der Information und Reisevorbereitung. Er ersetzt keine medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Alle Angaben basieren auf aktuellen Veroeffentlichungen der CDC, WHO, ECDC und des Auswaertigen Amts (Stand: Mai 2026). Bei gesundheitlichen Beschwerden konsultieren Sie stets einen Arzt vor Ort. Die Autoren uebernehmen keine Haftung fuer Entscheidungen, die auf Grundlage dieses Ratgebers getroffen werden.

2. Zwei Welten: Europa vs. Suedamerika

Hantaviren gibt es weltweit — doch die Unterschiede zwischen europaeischen und suedamerikanischen Staemmen sind dramatisch. Als Reisender muessen Sie diese Unterschiede kennen.

	Europa (Puumala/Dobrava)	Suedamerika (Andes/Sin Nombre)
Uebertragung	Aerosole/Staub (Nagetierausscheidungen)	Aerosole/Staub (Nagetierausscheidungen)
Mensch-zu-Mensch	NEIN	Ja — Andes-Virus!
Letalitaet	<1% (PUUV ca. 0,1%)	35-40% (Andes)
Primaer betroffenes Organ	Nieren (HFRS)	Lungen (HPS/ARDS)
Risiko fuer Touristen	Gering	Moderat
Wirtstier	Roetelmaus, Brandmaus	Langschwanz-Zwergreisratte (<i>Oligoryzomys longicaudatus</i>)

Der entscheidende Unterschied: In Europa erkranken Sie mit ueber 70% Wahrscheinlichkeit ueberhaupt nicht oder nur mild an Hantavirus — das Puumala-Virus fuehrt zu Nierenbeschwerden, die sich in den meisten Faellen vollstaendig zurueckbilden.

In Suedamerika kann das Andes-Virus innerhalb weniger Tage zum akuten Lungenversagen (ARDS) fuehren — mit einer Sterblichkeit von bis zu 40% ¹².

3. Andes-Virus — Was Reisende wissen muessen

Der MV-Hondius-Ausbruch 2026: Ein Weckruf

Im April 2026 ereignete sich ein historischer Ausbruch auf der niederlaendischen MV *Hondius*, einem Expeditionsschiff, das von Ushuaia (Argentinien) in die Antarktis aufbrach. Die Fallzahlen sind alarmierend:

- **11 Faelle** insgesamt (9 bestaetigt, 2 wahrscheinlich) ³
- **3 Todesfaelle** (CFR ~38%) ⁴
- Passagiere aus **23 Nationen**, darunter Deutschland [¹⁹]
- Ein deutscher Passagier starb an Bord am 2. Mai 2026 ⁵

Wichtig: Die Exposition erfolgte vermutlich bereits in Argentinien/Chile — zwei bestaetigte Indexfaelle hatten eine mehrmonatige Vogelbeobachtungsreise vor der Kreuzfahrt unternommen ⁶.

Die Alleinstellung des Andes-Virus

Das Andes-Virus (ANDV) ist das **einzige bekannte Hantavirus weltweit**, das von Mensch zu Mensch uebertragen werden kann ⁷. Dies wurde erstmals 1996 in Argentinien

¹ CDC — About Andes Virus. <https://www.cdc.gov/hantavirus/about/andesvirus.html>

² Hantavirusrealtime.com — Mortality Rate.
<https://www.hantavirusrealtime.com/en/mortality-rate>

³ Wikipedia — MV Hondius hantavirus outbreak.
https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Hondius_hantavirus_outbreak

⁴ WHO — Disease Outbreak News DON600. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON600>

⁵ NBC News / Reuters — Third victim was German.
<https://www.nbcnews.com/health/health-news/hantavirus-cruise-ship-docking-cape-verde-hondius-who-rcna343415>

⁶ Wikipedia — MV Hondius hantavirus outbreak.
https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Hondius_hantavirus_outbreak

⁷ CDC — About Andes Virus. <https://www.cdc.gov/hantavirus/about/andesvirus.html>

dokumentiert. Eine NEJM-Studie (2020) zeigte sogar “Super-Spreader”-Phaenomene: Eine Person infizierte 5 andere innerhalb von 90 Minuten — ohne direkten Koerperkontakt ⁸.

Uebertragungswege Andes-Virus: - Enger, anhaltender Kontakt (Paare, Familienmitglieder) - Tröpfcheninfektion (aerogene Verbreitung) moeglich - Inkubationszeit: 9-42 Tage ⁹

Symptome: Nicht Nieren — **LUNGEN!** Das Hantavirus-Pulmonale-Syndrom (HPS) beginnt grippeaehnlich (Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen), verschlechtert sich aber nach 4-10 Tagen rapide zu Kurzatmigkeit, Lungenoedem und akutem Atemnotsyndrom (ARDS). Beatmungspflichtigkeit ist haeufig ¹⁰.

Risikogebiete: Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Bolivien — insbesondere laendliche Regionen, Waelder und Campingplaetze.

4. Camping & Outdoor in Risikogebieten

Die CDC empfiehlt spezifische Massnahmen fuer Camper und Outdoor-Aktivisten in Hantavirus-Endemiegebieten ¹¹:

Zelt-Aufstellplatz

- **NIE** auf Mäusekot, in hohem Gras oder in der Naehe von Nagetierbauten aufschlagen
- Schlafplaetze mindestens 30 cm ueber dem Boden — idealerweise auf einer Feldliege/Cot
- Zelte mit integriertem Boden verwenden — keine bodenlosen Planenzelte
- Schlafsack **immer** im Innenzelt, **niemals** direkt auf den Boden legen

Huetten und Cabins

- Vor Einzug alle Fenster und Tueren oeffnen — **mindestens 30 Minuten lueften** ¹²
- Oberflaechen mit Desinfektionstuechern oder Bleichloesung (1:10) behandeln
- Betten nicht ohne Pruefung unter Matratzen und Kissen benutzen
- Dunkle Ecken, Schraenke und Vorratskammern besonders kontrollieren

⁸ NEJM — Martinez et al. (2020). “Super-Spreaders and Person-to-Person Transmission of Andes Virus.” <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2009040>

⁹ WHO — Disease Outbreak News DON600. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON600>

¹⁰ CEPI — The Hantaviruses. <https://cepi.net/hantaviruses>

¹¹ CDC MMWR — Interim Recommendations for Risk Reduction. <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00030643.htm>

¹² NPS — Hantavirus Fact Sheet. <https://www.nps.gov/articles/000/upload/Hanta-kit-and-fact-sheet-combined-508c-2.pdf>

Feuerholz und Lagerung

- **Kein Holz aus Mäusenähe** mitnehmen — Mäuse nisten gerne unter Holzstapeln
 - Feuerholz nur von offenen, sonnendurchfluteten Stellen sammeln
 - Essen in **verschlossenen, luftdichten Behältern** aufbewahren
 - **Nie** Essen oder Getränke im Schlafzelt lagern
-

5. Vor der Reise

- **Reiseziel recherchieren:** Prüfen Sie Hantavirus-Vorkommen (siehe Abschnitt 9), lesen Sie aktuelle WHO Disease Outbreak News und die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes
 - **Krankenhaus-Kapazität prüfen:** Suchen Sie Kliniken mit Intensivstation/Beatmungsmöglichkeit am Reiseziel
 - **Reiseapotheke erweitern:** FFP3-Masken (5-10 St.)¹³, Einweghandschuhe (10 Paar), Desinfektionstücher (1 Packung viruzid), Sprühdésinfektion (100 ml), Müllbeutel (10 St.), digitales Fieberthermometer
 - **Reiseversicherung prüfen:** Krankenrücktransport abgedeckt? Notrufnummer gespeichert? Leistungsumfang bei Infektionskrankheiten geklärt?
-

6. Während der Reise

- **Hütten/Cabins:** Fenster öffnen, 30 Minuten warten vor Einzug¹⁴. Keine trockene Reinigung — Trockenfegen und Staubsaugen wirbeln virushaltigen Staub auf¹⁵. Mäusekot an Betreiber melden.
 - **Outdoor-Aktivitäten:** Lange Kleidung und geschlossene Schuhe tragen. Handschuhe beim Feuerholz-Sammeln und Lager-Aufbau. Kein Wasser aus ungesicherten Quellen.
-

7. Symptome auf Reisen — Was tun?

Fieber + Atemnot nach Outdoor-Aufenthalt = SOFORT Arzt aufsuchen! Das HPS verschlechtert sich rapide — Beatmungspflichtigkeit kann innerhalb von Stunden entstehen.

¹³ RKI — Merkblatt Hantavirus.

https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf

¹⁴ NPS — Hantavirus Fact Sheet. <https://www.nps.gov/articles/000/upload/Hanta-kit-and-fact-sheet-combined-508c-2.pdf>

¹⁵ RKI — Merkblatt Hantavirus.

https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf

- **In Suedamerika:** Suchen Sie ein **Krankenhaus mit Beatmungsmoeglichkeit** (UCI = Unidad de Cuidados Intensivos). In Grossstaedten (Santiago, Buenos Aires, Montevideo) sind Kapazitaeten am besten.

- **Sprachbarriere ueberwinden:**

Deutsch	Spanisch	Portugiesisch
Hantavirus	Hantavirus	Hantavirus
Fieber	Fiebre	Febre
Kurzatmigkeith	Dificultad para respirar	Falta de ar
Notfall	Emergencia	Emergencia

- **Reiseversicherung:** Notrufnummer stets bereithalten (Handy + ausgedruckt). Versicherung **vor** Krankenhausaufnahme kontaktieren, wenn moeglich.

8. Packliste: Hantavirus-Reise-Kit

Gegenstand	Anzahl	Zweck
FFP3-Masken	5-10 Stück	Huetten-Reinigung, Notfall
Einweghandschuhe (Nitril)	10 Paar	Notfall-Reinigung, Holz sammeln
Desinfektionstuecher (viruzid)	1 Packung	Oberflaechen, Haende, Gegenstaende
Spruehdesinfektion (100 ml)	1 Flasche	Kleine Flaechen, Zeltoberflaeche
Muellbeutel (zum Zuziehen)	10 Stück	Entsorgung kontaminierter Materialien
Digitales Fieberthermometer	1	Selbstkontrolle bei Symptomen
Kleiner Spruehflakon mit Bleichloesung	100 ml (1:10)	Desinfektion bei Bedarf (taeglich neu ansetzen!)
Notfallkontaktliste (ausgedruckt)	1	Versicherung, Botschaft, Aerzte

Tipp: Packen Sie das Kit in einen separaten, leicht zugaenglichen Beutel — nicht tief im Rucksack verstaut.

9. Andere Reiseziele mit Hantavirus

Hantaviren sind weltweit verbreitet. Gleiche Präventionsprinzipien gelten ueberall:

Region	Virus	Syndrom	Risiko fuer Touristen
USA (Four Corners: NM, CO, AZ, UT)	Sin Nombre Virus	HPS (Lungen)	Moderat — Camping/Wandern
Kanada (British Columbia, Alberta)	Sin Nombre Virus	HPS (Lungen)	Gering-Moderat
Asien (Korea, China, Russland)	Hantaan-Virus	HFRS (Nieren)	Moderat — laendliche Gebiete
Europa (Skandinavien, DE, AT)	Puumala-Virus	HFRS (Nieren, mild)	Gering — Massstaeblicher Risikozone

Region	Virus	Syndrom	Risiko fuer Touristen
Balkan	Dobrava-Belgrad-Virus	HFRS (Nieren, schwer)	Sehr gering

Fuer ALLE gilt: Lueften vor Benutzung von Huetten, kein Trockenfegen, FFP-Maske bei Staub, lange Kleidung im Gelaende.

10. Internationale Notfall-Kontakte

Organisation	Kontakt	Zweck
SOS International	+45 38 48 95 50	Krankenruecktransport, weltweit
REGA (Schweiz)	+41 333 333 333	Luftrettung/Ruecktransport
Auswaertiges Amt (DE)	+49 30 5000-2000	Krisenvorsorgeliste, Botschaftskontakte
Auswaertiges Amt Krisenliste	https://krisenvorsorgeliste.diplo.de	Online-Registrierung
WHO Disease Outbreak News	https://who.int/emergencies/disease-outbreak-news	Aktuelle Ausbrueche weltweit
ECDC	https://ecdc.europa.eu	Europaische Risikobewertungen
CDC Travel Health	https://wwwnc.cdc.gov/travel	Reisegesundheit nach Land

Tipp: Speichern Sie diese Nummern in Ihrem Handy UND tragen Sie sie auf einer Karteikarte bei sich — Handys koennen verloren gehen oder ohne Netz sein.

11. Quellen

12. Visuelle Tipps

Weltkarte Risikoregionen (nach CFR = Case Fatality Rate): - **Hoch (35-40%):** Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Bolivien (Andes) | USA Four Corners (Sin Nombre) - **Moderat (5-15%):** China, Korea, Russland (Hantaan) | Balkan (Dobrava) - **Niedrig (<1%):** Skandinavien, Deutschland, Oesterreich, Schweiz (Puumala) - **Kein Risiko:** Australien, Ozeanien, Groessteile Afrikas

Packliste-Infografik: 8 Gegenstaende — FFP3-Masken, Handschuhe, Desinfektionstuecher, Spruehdesinfektion, Muellbeutel, Fieberthermometer, Bleichloesung, Notfallkontaktliste.

Zelt-Setup-Illustration: Zelt auf ebenem Boden ohne Mausekot/Gras — Feldliege (30cm Hoehe) — Schlafsack im Innenzelt — Essen ausserhalb des Schlafbereichs.

Zusammenfassung: Die 5 goldenen Regeln fuer Reisende

1. **ANDES = ANDERS** — Das Andes-Virus ist das einzige Hantavirus mit Mensch-zu-Mensch-Uebertragung. CFR 35-40%. Betrifft die LUNGEN, nicht die Nieren.
2. **Lueften vor Benutzung** — Jede Huette, jede Cabin: 30 Minuten durchlüften vor Einzug.
3. **Nie trocken reinigen** — Kein Trockenfegen, kein Staubsaugen. Einspruehen, einwirken lassen, feucht entfernen.
4. **FFP3-Maske dabei haben** — Besonders bei Huetten-Reinigung und Outdoor-Aktivitaeten in Risikogebieten.
5. **Fieber + Atemnot = Notfall** — Bei diesen Symptomen nach Outdoor-Aufenthalt in Suedamerika: Sofortige aerztliche Hilfe suchen. Jede Stunde zaehlt.

*Ratgeber erstellt: Mai 2026 | Quellen: CDC, WHO, ECDC, RKI, NEJM, Auswaertiges Amt
Wortzahl: ca. 1.500 Woerter*