

Hantavirus auf einen Blick — Schnellreferenz

⚠ **Disclaimer:** Dieses Blatt dient ausschließlich der schnellen Information und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Verdacht auf Hantavirus-Infektion immer einen Arzt konsultieren. Alle Angaben ohne Gewähr.



DAS WESENTLICHSTE

WAS	WIE	WO
Nagetiervirus aus Kot, Urin, Speichel von Röteln- und Waldmäusen	Aerosole einatmen — virushaltiger Staub beim Aufwirbeln. Kein Mensch-zu-Mensch in Europa!	BW, Bayern, Hessen, NRW — besonders Buchenwälder, Schwäbische Alb, Bayerischer Wald, Münsterland
Virus bleibt in getrockneten Ausscheidungen mehrere Wochen infektiös	Direktkontakt (verletzte Haut, Schleimhäute) oder Nagetierbiss möglich, aber selten	Risiko besonders hoch nach Buchenmast (Mäusepopulation explodiert)



SYMPTOME — Was beobachten?

Symptom	Typisch für Hanta?	Wann
Plötzliches Fieber >38,5°C	✅ Ja — Hauptsymptom (87% der Fälle)	Tag 1–5
Kreuz-/Rückenschmerzen (Lumbalgie)	✅ Sehr typisch — Leitsymptom (>50%)	Tag 2–7
Kopf-/Gliederschmerzen	✅ Möglich, unspezifisch	Frühphase
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall	⚠ Häufig begleitend	Frühphase
Blut im Urin (Hämaturie)	🚑 NOTFALL! Nierenbeteiligung	Spätphase (Tag 9–12)
Wenig Urin (Oligurie)	🚑 NOTFALL! Akutes Nierenversagen	Spätphase
Blutdruckabfall, Schwindel	⚠ Schockgefahr	Tag 5–8
Atemnot	🚑 Lebensbedrohlich (HPS/HCPs)	Spätphase

Merke: 80–85% der Infektionen verlaufen mild oder asymptomatisch. In Deutschland: meist grippeähnliche Symptome mit Nierenbeteiligung (Nephropathia epidemica). Nur bei schweren Verläufen treten alle 5 Phasen (febrile → hypotensive → oligurische → diuretische → Erholungsphase) voll ausgeprägt auf.

ZAHLEN

Parameter	Wert
Inkubationszeit	2–4 Wochen (Ausnahme: 5 Tage bis 60 Tage)
Letalität in Deutschland	<1% (PUUV: <0,1%; DOBV-Kurkino: ~0,5%)
Fälle pro Jahr	ca. 150–500 (schwankend je nach Mastjahr)
Hospitalisierungsrate	~48% in Endemiegebieten
Dialyse-Bedarf	<10% der Fälle
Meldepflicht	Seit 2001 (namentlich meldepflichtig)
Erholungszeit	3–6 Wochen (max. 6 Monate)
Virusstabilität	2–14+ Tage in der Umwelt (getrocknet)

IMMER VERMEIDEN

-  **Trocken fegen oder kehren** — wirbelt virushaltigen Staub auf
-  **Staubsauger** in kontaminierten Bereichen — verteilt Viren über Abluft
-  Nagetierkot mit bloßen Händen anfassen
-  Feinen Sprühnebel erzeugen (wie Staub)
-  **Aspirin/NSAR** bei Verdacht (Blutungsrisiko bei Thrombozytopenie!)
-  Kinder/Schwangere ohne Schutz in kontaminierte Bereiche lassen

IMMER TUN — Reinigungsprotokoll

Schritt	Aktion
1. Lüften	30 Min alle Fenster + Türen öffnen, Bereich verlassen
2. Schutz anlegen	FFP3-Maske (mindestens FFP2) + Gummihandschuhe + Schutzbrille + langärmelige Kleidung
3. Einsprühen	Mäusekot, Nester, tote Mäuse mit Bleichlösung 1:10 (oder handelsübliches Desinfektionsmittel) großzügig einsprühen — Staub binden!
4. Einwirkzeit	10 Minuten warten
5. Feucht aufwischen	Mit Papiertuch/Schwamm/Mopp feucht abwischen, niemals trocken
6. Flächen desinfizieren	Erneut mit Desinfektionsmittel nachwischen
7. Entsorgen	Alles doppelt in Plastiktüten → Hausmüll
8. Nachbereitung	Handschuhe desinfizieren → abnehmen → Hände waschen → Duschen + Haare waschen → Arbeitskleidung bei 60°C waschen

NOTFALL

Situation	Handlung
Fieber + Kreuzschmerzen nach Mäusekontakt	→ Sofort zum Arzt — Expositionsgeschichte nennen!
Blut im Urin	→ SOFORT 112 — Akutes Nierenversagen möglich
Wenig/nichts urinieren + Ödeme	→ SOFORT Notarzt — Dialyse nötig?
Atemnot nach Mäusekontakt	→ SOFORT 112 — HPS/HCPS lebensbedrohlich
Blutdruckabfall/Schwindel	→ Notaufnahme — Schockgefahr
Expositionsgeschichte ist entscheidend! Erwähne Mäusekontakt, Keller-/Dachbodenreinigung, Gartenarbeit, Risikogebiet — erst dann denkt der Arzt an Hantavirus. Ohne Hinweis auf Nagetierkontakt wird Hantavirus oft übersehen (grippeähnliche Symptome).	

SAISON

Zeitraum	Risiko	Typische Aktivitäten
April-September	 Hochrisiko	Frühjahrsputz, Gartenarbeit, Camping, Forstarbeit, Ferienhaus-Reinigung
Oktober-März	 Moderat	Kellerreinigung, Holzumschichtung, Winterreinigung
Nach Buchenmast	 Besonders hoch	Folgejahr: deutlich mehr Fälle!

MERKBLATT: Hantavirus-Reinigung in 4 Schritten

- | | |
|---------------|--|
| 1. LÜFTEN | 30 Min alle Fenster + Türen öffnen |
| 2. SCHUTZ | FFP3 + Handschuhe + Schutzbrille |
| 3. EINSPRÜHEN | Bleiche 1:10, 10 Min einwirken lassen |
| 4. FEUCHT | Aufwischen, nie trocken! Duschen danach. |

Quellen (minimal)

Quelle	URL
RKI — Ratgeber Hantavirus	www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Hantaviren.html
RKI — Merkblatt PDF	www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf
CDC — Cleaning Guidelines	www.cdc.gov/hantavirus

Quelle	URL
WHO — Hantavirus Fact Sheet	www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hantavirus
Gesund.bund.de	gesund.bund.de/hantavirus-erkrankungen

*Erstellt: Mai 2026 | Datenbasis: RKI, CDC, WHO, Peer-Reviewed Journals | Wortzahl: ~950
Wörter*

Dieses Blatt ist für private Nutzung und A4-Ausdruck (zweiseitig laminierbar) optimiert.