

Table of Contents

Hantavirus: Symptom-Checkliste & Notfall-Guide	1
 Symptom-Übersicht	1
 ROTE FLAGS: Sofort zum Arzt!	3
 Was dem Arzt sagen?	3
 Symptom-Tracker-Vorlage	4
 Behandlung: Was erwartet mich im Krankenhaus?	5
 Notfall-Kontakte	6
 Verlaufs-Typen: Was statistisch erwartet	6
Quellenverzeichnis	7
 Tipps für visuelle Elemente	9

Hantavirus: Symptom-Checkliste & Notfall-Guide

 **Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Verdacht auf eine Hantavirus-Infektion konsultieren Sie umgehend einen Arzt oder das Gesundheitsamt. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Mai 2026.

Symptom-Übersicht

Hantavirus-Infektionen beginnen typischerweise **plötzlich** und mit **grippeähnlichen Symptomen**. Das Besondere: Die Kombination aus hohem Fieber und Kreuzschmerzen ist ein wichtiger Hinweis auf Hantavirus [^1^][^2^].

Frühe Symptome (Fieberphase, Tag 1-7)

Die erste Phase dauert in der Regel **3 bis 7 Tage** und ähnelt stark einer schweren Grippe [^3^]:

Symptom	Beschreibung
 Plötzliches Fieber	Oft >38,5°C, häufig >39°C; tritt abrupt auf [^1^]
 Starke Kopfschmerzen	Besonders intensiv hinter den Augen [^3^]
 Gliederschmerzen	Besonders Kreuzschmerzen (Lumbalgie), Rücken- und Muskelschmerzen [^4^]
 Übelkeit, Erbrechen	Nicht selten das dominierende Symptom

Symptom	Beschreibung
🔴 Bauchschmerzen	Können Appendizitis vortäuschen
🤯 Schwindel, Müdigkeit	Starke Abgeschlagenheit, allgemeines Krankheitsgefühl
🔴 Gerötetes Gesicht	Rötung im Gesichtsbereich möglich
👁️ Sehstörungen	Verschwommenes Sehen [^3^]

Späte Symptome (Nierenbeteiligung, ab ca. Tag 5-12)

Bei manchen Patienten tritt nach der Fieberphase eine **Nierenbeteiligung** auf. Diese Phase dauert typischerweise **3 bis 7 Tage** [^5^]:

Symptom	Beschreibung
🔑 Kreuzschmerzen verstärkt	Kolikartige, oft einseitige Flankenschmerzen [^6^]
🚽 Weniger Urin (Oligurie)	Deutlich verringerte Urinmenge – manchmal fast null
🔴 Blut im Urin (Hämaturie)	Nicht immer mit bloßem Auge sichtbar; Labor nachweisbar [^7^]
↓ Blutdruckabfall	Möglicherweise bis in den Schockbereich

⚠️ **Wichtig:** Bei den in Deutschland vorkommenden Virustypen (PUUV, DOBV-Kurkino) verlaufen die meisten Infektionen **mild bis moderat**. Nicht alle Patienten durchlaufen alle Phasen – viele bleiben bei den grippeähnlichen Symptomen [^2^].

Seltene Begleitsymptome

- **Bindehautentzündung** mit Einblutungen
- **Rachenentzündung**
- **Petechien** (kleine Hautblutungen) am Gaumen und in den Achselhöhlen [^8^]
- **Durchfall** (ca. 13,5% der Fälle) [^9^]

Symptome nach Häufigkeit (RKI-Daten 2001-2017, n=12.131 Fälle) [^9^]

Symptom	Häufigkeit	Wichtigkeit
Fieber >38,5°C	~87% der Fälle	🟢 Klassisches Leitsymptom
Kreuz-/Rückenschmerzen	>65%	🔴 Typisch für Hantavirus
Kopfschmerzen	~53%	🟡 Weniger spezifisch
Nierenbeteiligung	~68%	🟢 Wichtiger Hinweis
Übelkeit	~24%	🟡 Wichtig
Erbrechen	~18%	🟡 Wichtig
Blut im Urin (Hämaturie)	Selten sichtbar	🔴⚠️ SOFORT ARZT!

⚠️ **ROTE FLAGS: Sofort zum Arzt!**

Die folgenden Warnsignale erfordern **sofortige ärztliche Abklärung**. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt – frühe Erkennung hilft [^10^]:

🚑 **Notfall – Sofort Notarzt (112)**

Warnsignal	Was es bedeuten kann
🩸 Blut im Urin (rot, braun, dunkel)	Nierenbeteiligung, renale Phase [^11^]
🚽 Plötzlich wenig Urin (<400 ml/Tag)	Oligurie – akutes Nierenversagen möglich [^5^]
😵 Bewusstseinsveränderung	Schock, Enzephalopathie
🫁 Atemnot, Rasseln	Lungenödem, Kreislaufversagen
🩸 Starke Blutungen	Thrombozytopenie (Blutplättchenmangel)

⚠️ **Dringend – Innerhalb von 24 Stunden zum Arzt**

Warnsignal	Was es bedeuten kann
🩸 Fieber + Kreuzschmerzen nach Mäusekontakt	Klassischer Verdacht auf Hantavirus [^1^]
🩸 Fieber + Kreuzschmerzen nach Risikogebiet	Exposition vor 2-4 Wochen beachten!
🏠 Symptome nach Keller-/Dachbodenreinigung	Hochrisiko-Exposition durch Aerosole [^10^]
↓ Blutdruckabfall + Schwindel	Beginn der hypotensiven Phase [^1^]
🔴 Starke Bauchschmerzen mit Fieber	Kann Hantavirus-typisch sein

🕒 **Beobachten – Arzt kontaktieren bei Anhalten**

- Fieber >38,5°C über mehr als 3 Tage
- Anhaltende Rückenschmerzen ohne Besserung
- Zunehmende Müdigkeit/Schwäche

💡 **Merksatz:** *Fieber + Kreuzschmerzen + Mäusekontakt = Arztbesuch nicht verschieben!*

💡 **Was dem Arzt sagen?**

Die richtigen Informationen helfen Ihrem Arzt, Hantavirus früh zu erkennen. Viele Infektionen werden anfangs übersehen, weil die Symptome wie Grippe aussehen [^10^].

🔑 **Entscheidende Informationen**

Sagen Sie Ihrem Arzt explizit:

„Ich hatte Kontakt mit Mäusen / Mäusekot – kann das Hantavirus sein?“

Gesagt werden sollte

Warum es wichtig ist

Gesagt werden sollte	Warum es wichtig ist
„Ich war in [Region/Bundesland] unterwegs“	Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen sind Risikogebiete
„Ich habe den Keller / Dachboden gereinigt“	Aerosol-Exposition ist Hauptübertragungsweg
„Ich hatte Kontakt mit Mäusen / Mäusekot“	Ohne Expositionsgeschichte wird Hantavirus selten getestet
„Die Symptome begannen vor [X] Tagen“	Zeitliche Zuordnung zur Inkubationszeit (2-4 Wochen nach Exposition)
„Ich habe Fieber + Kreuzschmerzen“	Klassische Symptomkombination
„Ich habe [weniger Urin / dunklen Urin] bemerkt“	Hinweis auf Nierenbeteiligung



Weitere hilfreiche Details

- Exakter Tag des Symptombeginns
- Aktivitäten der letzten 4-6 Wochen (Gartenarbeit, Forst, Camping)
- Haben Sie Nagersichtungen oder Kot gesehen?
- Verlauf der Symptome (werden sie besser oder schlechter?)



Symptom-Tracker-Vorlage

Drucken Sie diese Tabelle aus oder kopieren Sie sie in ein Notizbuch. Führen Sie sie bei Verdacht auf Hantavirus **mindestens 2 Wochen lang** – sie hilft Ihrem Arzt enorm bei der Diagnose und Verlaufsbeurteilung.

Täglicher Tracker

Datum	Uhrzeit	Temp. (°C)	Kopfschmerz (1-10)	Kreuzschmerz (1-10)	Urinmenge	Urinfarbe	Übelkeit	Notizen
Bsp: 15.05.	08:00	38,5	6	7	normal	normal	leicht	Fieber seit gestern
	20:00	39,2	8	9	normal	normal	mittel	Paracetamol genommen

Legende & Messhinweise

Urinmenge einschätzen: - **Normal** = wie gewohnt, regelmäßiges Wasserlassen - **Vermindert** = deutlich seltener als normal - **Wenig** = <400 ml/Tag (ca. 1 kleine Tasse) → **⚠️ ARZT!** - **Keiner** = gar kein Urin → **🚑 NOTARZT!**

Urin-Farbe beachten: - **Hellgelb/Normal** = 🟢 normal - **Dunkelgelb/Braun** = 🟡 Flüssigkeitsmangel oder Nierenbeteiligung - **Rötlich/Braun/Blut** = 🟠 → **SOFORT ARZT!**

Schmerzskala (1-10): - 1-3 = Leicht, aushaltbar - 4-6 = Mäßig, beeinträchtigend - 7-10 = Stark, stark beeinträchtigend → Arzt konsultieren

Wochenplan zum Selbstmanagement

Woche 1 (Tag 1-7) – Akute Phase: - ✅ 2x täglich Temperatur messen (morgens/abends) - ✅ Schmerzen notieren (Kopf, Kreuz, Glieder) - ✅ Urinmenge und -farbe beobachten - ✅ Flüssigkeitszufuhr: mind. 2,5 Liter/Tag bei Fieber - ✅ **Tag 5-8 besonders wichtig:** Blutdruck beobachten (hypotensive Phase!) - ❌ **Keine Aspirin oder Ibuprofen** - Blutungsrisiko bei Thrombozytopenie [^12^] - ✅ Paracetamol zur Fiebersenkung erlaubt

Woche 2 (Tag 8-14) – Renale Phase: - ✅ Weiter alle Parameter dokumentieren - 🔍 **Urinmenge kritisch beobachten!** Oligurie-Verdacht? - 🚑 **<400 ml Urin/Tag oder dunkler/blutiger Urin → SOFORT ARZT!** - 🫁 Bei Atemnot: **Notarzt 112!**

Woche 3-6+ – Erholungsphase: - ✅ Parameter weiter dokumentieren - 💧 Polyurie-Phase möglich: Flüssigkeitszufuhr anpassen - 😴 Langsame Rückkehr zu Aktivitäten - 🩺 Bei anhaltender Müdigkeit/Schwäche: Arztkontakt

Behandlung: Was erwartet mich im Krankenhaus?

Diagnostik – So wird Hantavirus nachgewiesen

Die Diagnose erfolgt in der Regel **serologisch** über Bluttests [^1^]:

Untersuchung	Was wird gemessen?	Ergebnis
Bluttest: IgM/IgG-Antikörper	ELISA oder Immunblot	Nachweisbar ab Symptombeginn; IgG in 80-90% in den ersten 5 Tagen [^1^]
Blutbild	Leukozyten, Thrombozyten	Leukozytose, Thrombozytopenie (<100 Giga/L) [^1^]
Nierenwerte	Kreatinin, Harnstoff	Erhöhung bei Nierenbeteiligung
CRP	Entzündungsparameter	Meist erhöht
Urin-Test	Protein, Blut, α -1-Mikroglobulin	Proteinurie und Hämaturie fast immer vorhanden [^1^]
PCR (frühe Phase)	Virale RNA im Blut	Nur in den ersten Tagen aussagekräftig [^13^]

💡 **Tipp:** Bei Verdacht sofort Blut abnehmen lassen – in der frühen Phase kann eine PCR noch viralen Nachweis erbringen, später sind Antikörpertests aussagekräftiger [^13^].

Therapie – Supportiv, nicht spezifisch

Aspekt	Details
Spezifische Medikation	❌ Es gibt keine zugelassene antivirale Therapie gegen Hantavirus [^12^][^14^]
Fiebersenkung	✅ Paracetamol; keine Aspirin/NSAIDs wegen Blutungsrisiko
Flüssigkeitssubstitution	✅ Intravenös zur Kreislaufstabilisierung
Dialyse	Bei akutem Nierenversagen (ca. <10% der PUUV-Fälle) [^15^]
Intensivstation	Bei schwerem Verlauf: Kreislaufstabilisierung, ggf. Beatmung
Ribavirin	Nur kontrovers diskutiert; nicht zugelassen [^1^]

🏠 **Gute Nachrichten:** In Deutschland treten überwiegend **leichte Verläufe** auf. Die meisten Patienten werden **vollständig genesen** [^12^].

Meldepflicht

Hantavirus-Infektionen sind in Deutschland **seit 2001 namentlich meldepflichtig** [^16^]. Ihr Arzt informiert das zuständige Gesundheitsamt – dies ist Routine und dient der Statistik.

📞 Notfall-Kontakte

Situation	Nummer/Weg	Wann?
🏠 Hausarzt	Praxisnummer	Tagsüblich, bei Verdacht, erste Anlaufstelle
☎️ Ärztlicher Bereitschaftsdienst	116 117	Außerhalb der Sprechzeiten, Wochenende
🚒 Notruf	112	Bewusstseinsveränderung, Atemnot, Blutdruckabfall, schwerer Allgemeinzustand
📄 Gesundheitsamt	Lokal zuständig	Nach Meldung durch den Arzt

🔄 Verlaufs-Typen: Was statistisch erwartet

Hantavirus-Infektionen verlaufen in Deutschland **in den allermeisten Fällen mild**. Die Statistik gibt Entwarnung – und zeigt gleichzeitig, warum ärztliche Abklärung wichtig ist [^2^][^12^]:

Verlauf	Anteil	Beschreibung
🟢 Asymptomatisch / Mild	~70-85%	Grippeähnliche Symptome, ggf. kurzer Arztbesuch, oft nicht einmal diagnostiziert

Verlauf	Anteil	Beschreibung
 Moderat	~15-25%	Kurzzeit-Krankenhausaufenthalt (ca. 48% Hospitalisierungsrate bei gemeldeten Fällen [¹⁷])
 Schwer	~5-10%	Intensivstation, ggf. Dialyse (<10% der PUUV-Fälle [¹⁵])

Prognose – Zahlen zum Beruhigen

Indikator	Wert
Letalität in Deutschland (PUUV)	<0,1% [¹⁸]
Letalität in Deutschland (DOBV-Kurkino)	0,3-0,9% [¹⁸]
Todesfälle seit 2001 (Meldepflicht)	Nur wenige Fälle bundesweit [¹⁹]
Vollständige Genesung	Die Regel, meist nach 2-6 Wochen [²⁰]
Langzeitfolgen (chronische Niereninsuffizienz)	Selten [²¹]

 **Fazit:** Hantavirus ist ernst zu nehmen, aber in Deutschland mit den vorkommenden Virustypen (PUUV, DOBV-Kurkino) in **>99% der Fälle nicht lebensbedrohlich**. Vollständige Genesung ist die Norm.

Die 5 Phasen im Überblick

Für Interessierte: Der klassische HFRS-Verlauf durchläuft 5 Phasen. In Deutschland sind diese jedoch oft nur angedeutet [³][⁸]:

Phase	Dauer	Kennzeichen
1. Fieberphase	3-7 Tage	Plötzliches hohes Fieber, Kopf-/Rückenschmerzen, Übelkeit
2. Hypotensive Phase	Stunden bis 2 Tage	Blutdruckabfall (selten schwer in DE)
3. Oligurische Phase	3-7 Tage	Wenig Urin, Nierenwert-Anstieg (ca. 5% benötigen Dialyse [²²])
4. Diuretische Phase	Tage bis Wochen	Nierenfunktion kehrt zurück, vermehrte Urinausscheidung
5. Rekonvaleszenz	Wochen bis Monate	Allmähliche Erholung, Müdigkeit kann anhalten

Quellenverzeichnis

Nr.	Quelle	URL
[¹]	RKI-Ratgeber Hantavirus-Erkrankung	https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Hantaviren.html
[²]	PMC/NIH –	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7123101/

Nr.	Quelle	URL
	Human hantavirus infections review	
[^3^]	ParaHealth – Hantavirus Ratgeber	https://parahealth.de/blogs/blog/hantavirus-ratgeber-symptome-diagnose-therapie
[^4^]	ADAC – Hantavirus Symptome	https://www.adac.de/gesundheit/krankheiten/hantavirus/
[^5^]	StatPearls – Hemorrhagic Fever Renal Syndrome	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560660/
[^6^]	NetDoktor – Hantavirus Symptome	https://www.netdoktor.de/krankheiten/hantavirus/symptome/
[^7^]	Eurosurveillance – RKI-Daten 2001-2017	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6693291/
[^8^]	CDC EID – Hantaviruses: A Global Disease Problem	https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/3/2/97-0202_article
[^9^]	Eurosurveillance – RKI Surveillance-Daten 2001-2017	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6693291/
[^10^]	Institut für Medizinische Mikrobiologie Greifswald	https://www.imd-greifswald.de/de/fuer-arztpraxen/aktuelles/labinfos/hantavirus-infektionen-eine-unterschaetzte-erkrankung
[^11^]	ADAC – Hantavirus	https://www.adac.de/gesundheit/krankheiten/hantavirus/
[^12^]	Gesund.bund.de – Hantavirus-Erkrankungen	https://gesund.bund.de/hantavirus-erkrankungen
[^13^]	RKI-Ratgeber – Molekulardiagnostik	https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Hantaviren.html
[^14^]	Hantavirus 2026 (hanta.today)	https://hanta.today/treatment

Nr.	Quelle	URL
[^15 ^]	RKI-Ratgeber – Dialyse- Indikation	https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Hantaviren.html
[^16 ^]	BR24 – Hantavirus- Meldepflicht	https://www.br.de/nachrichten/wissen/hantavirus-infektion-vermeiden-darauf-muss-man-achten,RLkQOpL
[^17 ^]	Dissertation Mertens, Uni Greifswald – BW 2007	https://epub.ub.uni-greifswald.de/files/688/diss_Mertens_Marc.pdf
[^18 ^]	Pharmazeutische Zeitung – RKI- Letalität	https://www.pharmazeutische-zeitung.de/die-welt-der-hantaviren-165120/
[^19 ^]	n-tv – Todesfälle Deutschland	https://www.n-tv.de/wissen/So-oft-kommt-das-Hantavirus-in-Deutschland-vor-id30786427.html
[^20 ^]	MSD Manual – Hanta- Virusinfektion	https://www.msdmanuals.com/de/profi/infektionskrankheiten/arboviren-arenaviren-und-filoviren/hanta-virusinfektion
[^21 ^]	NetDoktor – Langzeitfolgen	https://www.netdoktor.de/krankheiten/hantavirus/langzeitfolgen/
[^22 ^]	PMC/NIH – Global Perspective Hantavirus	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2863364/

Tipps für visuelle Elemente

Um dieses Dokument als Infografik oder PDF-Ratgeber noch ansprechender zu gestalten, empfehlen sich folgende visuelle Ergänzungen:

Verlaufs-Diagramm (Zeitstrahl)

- **Horizontale Zeitleiste** von Tag 1 bis Woche 6
- **Farbkodierung der 5 Phasen:**
 -  Rot = Fieberphase (Tag 1-7)
 -  Orange = Hypotensive Phase (kurz)
 -  Gelb = Oligurische Phase (Tag 5-12)
 -  Hellgrün = Diuretische Phase
 -  Grün = Rekonvaleszenz
- **Symbole** für Hauptsymptome über der Zeitleiste platzieren

Ampel-System (Notfall-Kriterien)

-  **Grün:** Grippeähnliche Symptome → Hausarzt bei Anhalten
-  **Gelb:** Fieber + Kreuzschmerzen → Innerhalb 24h zum Arzt
-  **Rot:** Blut im Urin, kein Urin, Bewusstseinsveränderung → SOFORT 112

Symptom-Tracker als druckbare Vorlage

- **A4-Querformat** für einfaches Ausfüllen
- **Wochenkalender-Layout** mit täglichen Feldern
- **Ampel-Checkboxen** für Urinfarbe (grün/gelb/rot)
- **Visuelle Schmerzskala** (Smiley-Gesichter 1-10)

Icon-Vorschläge für jede Sektion

Sektion	Vorgeschlagene Icons
Symptom-Übersicht	   
Rote Flags	  
Arzt-Gespräch	 
Tracker	 
Behandlung	  
Notfall-Kontakte	 
Verlaufs-Typen	 

Dieses Dokument wurde im Mai 2026 erstellt. Alle Angaben basieren auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und offiziellen Leitlinien des Robert Koch-Instituts (RKI), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).