

# Теория вероятностей. Лекция десятая

## Измеримые множества и отображения

Дмитрий Валерьевич Хлопин  
*glukanat@mail.ru*

Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского

13.11.2018

## Условное матожидание отн-но $\sigma$ -алгебры

Пусть имеются полная группа событий  $H_1, \dots, H_k, \dots$  ( $\Omega = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} H_i$ ) и порожденная ей  $\sigma$ -алгебра  $\mathcal{H} = \sigma(H_1, \dots, H_k, \dots)$ . Пусть  $q_i \triangleq \mathbb{P}(H_i) > 0$ .

Условным математическим ожиданием  $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{H})$  дискретной случайной величины  $\xi$  относительно  $\sigma$ -алгебры  $\mathcal{H} = \sigma(H_1, \dots, H_k, \dots)$  называют отображение  $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{H}) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , действующее по правилу:

$$\Omega \ni \omega \mapsto \mathbb{E}(\xi|\mathcal{H})(\omega) \triangleq \begin{cases} \sum_{i \in \mathbb{N}} x_i \mathbb{P}(\xi = x_i | H_1), & \text{если } \omega \in H_1; \\ \dots & \\ \sum_{i \in \mathbb{N}} x_i \mathbb{P}(\xi = x_i | H_k), & \text{если } \omega \in H_k; \\ \dots & \end{cases}$$

будем говорить, что условное матожидание существует, если, конечно, все выражения выше определены и конечны.

## Условное матожидание отн-но случайной величины

Рассмотрим некоторые дискретные случайные величины  $\xi, \eta$ ; случайная величина  $\eta$ , принимающая на каждом  $H_i$  некоторое свое значение, порождает  $\sigma$ -алгебру

$$\sigma(\eta) = \sigma\{\eta^{-1}(x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \sigma\{H_1, \dots, H_k, \dots\}.$$

Условное матожидание  $\xi$  относительно случайной величины  $\eta$  зададим формулой  $\mathbb{E}(\xi|\eta) \equiv \mathbb{E}(\xi|\sigma(\eta))$ , то есть как функцию из  $\Omega$  в  $\mathbb{R}$ . Иногда его вводят как функцию из области значений случайной величины  $\eta$  в  $\mathbb{R}$ , т.е. как регрессию.

### Характеристическое свойство условного матожидания

18<sup>0</sup> Для случайной величины  $\xi$  ( $\mathbb{E}\xi^2 < +\infty$ ) и случайной величины  $\eta$  среди всех таких  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , что  $\mathbb{E}(h^2(\eta)) < +\infty$ , невязка  $\mathbb{E}(\xi - h(\eta))^2$  достигает минимума при  $h_0(\eta) = \mathbb{E}(\xi|\eta)$ .

## Снова условное матожидание в табличке

По совместному распределению пишется регрессия

$(Y, X)$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$\dots$	$\mathbb{P}(Y = y_j)$	$\mathbb{E}(X Y)$
$y_1$	$p_{11}$	$p_{12}$	$p_{13}$	$\dots$	$q_1$	$h_0(y_1) \triangleq \frac{1}{q_1} \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_{1i}$
$y_2$	$p_{21}$	$p_{22}$	$p_{23}$	$\dots$	$q_2$	$h_0(y_2) \triangleq \frac{1}{q_2} \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_{2i}$
$y_3$	$p_{31}$	$p_{32}$	$p_{33}$	$\dots$	$q_3$	$h_0(y_3) \triangleq \frac{1}{q_3} \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_{3i}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

Подумать: можно ли было минимизировать что-то другое? Чем лучше, или хуже, использовать невязки  $\mathbb{E}|\xi - h(\eta)|$ ,  $\mathbb{E}|\xi - h(\eta)|^r$  ( $r > 1$ )?

Подумать: сумеете получить схожие формулы для минимизации

$\mathbb{E}|\xi - h(\eta)|$ ,  $\mathbb{E}|\xi - h(\eta)|^4$  или  $\mathbb{E}|\xi - h(\eta)|^{3/2}$ ?

## Стандартные свойства условного математического ожидания: [с-но]

Если не касаться вопросов существования (свойств 8<sup>0</sup>-13<sup>0</sup>)

$$0^0 \quad \mathbb{E}(1_A|\mathcal{H}) = \mathbb{P}(A|\mathcal{H}) \text{ для всех } A \in \mathcal{F}.$$

$$1^0 \quad \mathbb{E}(\xi|\mathcal{H}) \geq 0, \text{ если } \xi \geq 0 \text{ для всех } \omega \in \Omega.$$

$$2^0 \quad \mathbb{E}(\xi_1|\mathcal{H}) \geq \mathbb{E}(\xi_2|\mathcal{H}), \text{ если } \xi_1(\omega) \geq \xi_2(\omega) \text{ для всех } \omega \in \Omega.$$

$$3^0 \quad \mathbb{E}(c|\mathcal{H}) = c \text{ для вырожденной случайной величины } c \in \mathbb{R};$$

более того,  $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{H}) = \xi$  для  $\mathcal{H}$ -измеримой  $\xi$ ,

в частности, всегда  $\mathbb{E}(f(\xi)|\xi) = f(\xi)$ ,  $\mathbb{E}(\xi|\xi) = \xi$ .

$$4^0 \quad \mathbb{E}(c\xi|\mathcal{H}) = c\mathbb{E}(\xi|\mathcal{H}) \text{ для } c \in \mathbb{R},$$

более того,  $\mathbb{E}(\eta\xi|\mathcal{H}) = \eta\mathbb{E}(\xi|\mathcal{H})$ , если  $\eta$   $\mathcal{H}$ -измерима.

$$5^0 \quad \mathbb{E}(\xi_1|\mathcal{H}) + \mathbb{E}(\xi_2|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\xi_1 + \xi_2|\mathcal{H}).$$

$$6^0 \quad \eta_1\mathbb{E}(\xi_1|\mathcal{H}) + \eta_2\mathbb{E}(\xi_2|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\eta_1\xi_1 + \eta_2\xi_2|\mathcal{H}) \text{ для}$$

$\mathcal{H}$ -измеримых  $\eta_1, \eta_2$ .

$$7^0 \quad \mathbb{E}(\xi\eta|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{H})\mathbb{E}(\eta|\mathcal{H}), \text{ если } \xi 1_H, \eta 1_H \text{ независимы для}$$

всех  $H \in \mathcal{H}$ .

## “Условные” свойства условного матожидания [с-но]

Предполагая, что все нужные условные матожидания существуют...

14<sup>0</sup>  $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) = \xi$  тогда и только тогда, когда  $\xi$   $\mathcal{G}$ -измерима (т.е.  $\{\omega \in \Omega | \xi(\omega) = x\} \in \mathcal{G}$  для всех  $x$ ).

15<sup>0</sup>  $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) = \mathbb{E}\xi$ , если  $\xi$  независима относительно  $\mathcal{G}$ ;  
в частности,  $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) = \mathbb{E}\xi$  для  $\mathcal{G} = \{\Omega, \emptyset\}$ .

16<sup>0</sup>  $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G})|\mathcal{H})$  при  $\mathcal{H} \subset \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ ;  
в частности,  $\mathbb{E}(\xi|\eta) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\eta, \zeta)|\eta)$ ,

$$\mathbb{E}\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) = \mathbb{E}\xi,$$

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}\mathbb{P}(A|\mathcal{G}) \text{ для всех } A \in \mathcal{F}$$

(формула полной вероятности),

$$\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi|\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}))$$

(свойство Дуба).

$$[\text{С-но; 0,5 баллов}] \mathbb{E}(\xi\mathbb{E}(\eta|\mathcal{G})) = \mathbb{E}(\eta\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G})).$$

## Условная дисперсия и не только

Пусть  $\xi, \eta$  — дискретные случайные величины, и  $\xi$  интегрируема с квадратом (существует  $\mathbb{E}\xi^2$ ).

Введем **условную дисперсию**  $\mathbb{D}(\xi|\eta) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  правилом:

$$\mathbb{D}(\xi|\eta) \triangleq \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi|\eta))^2|\eta) = \mathbb{E}(\xi^2|\eta) - (\mathbb{E}(\xi|\eta))^2.$$

Считаем:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\mathbb{D}(\xi|\eta)) &= \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}(\xi|\eta))^2 \\ &= \mathbb{E}((\xi - E\xi) - \mathbb{E}(\xi - (E\xi|\eta)))^2 \\ &= \mathbb{D}\xi - 2\mathbb{E}(\xi - E\xi)\mathbb{E}(\xi - E(\xi|\eta)) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\eta) - \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\eta)))^2 \\ &= \mathbb{D}\xi - \mathbb{D}\mathbb{E}(\xi|\eta).\end{aligned}$$

## Условная дисперсия в качестве “теоремы Пифагора”

17<sup>0</sup> Для интегрируемой с квадратом дискретной случайной величины  $\xi$

$$\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}(\mathbb{D}(\xi|\eta)) + \mathbb{D}(\mathbb{E}(\xi|\eta));$$

в частности,  $\mathbb{D}\xi = \mathbb{D}(\mathbb{E}(\xi|\eta))$ ,  $\mathbb{E}(\mathbb{D}(\xi|\eta)) = 0$ , в точности если  $\sigma(\xi) \subset \sigma(\eta)$ , то есть  $\xi = \mathbb{E}(\xi|\eta) = h(\eta)$  для какой-то  $h$ ; более того,  $\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}(\mathbb{D}(\xi|\eta))$ ,  $\mathbb{D}(\mathbb{E}(\xi|\eta)) = 0$  для независимых  $\xi, \eta$ .

Подумать: теперь несложно доказать, что для любых интегрируемых с квадратом случайных величин  $\eta_1, \eta_2, \xi$  выполнено

$$\mathbb{D}(\mathbb{E}(\xi|\eta_1, \eta_2)) = \mathbb{D}(\mathbb{E}(\xi|\eta_1)) + \mathbb{D}(\mathbb{E}(\xi|\eta_2)) \leq \mathbb{D}\xi$$

для независимых  $\eta_1, \eta_2$ ; но ведь независимых величин можно взять больше, чем две...

Вступайте в ряды Фурье!



## Что разобрали:

- распределение случайных величин
- медиана и математическое ожидание
- независимость случайных величин
- производящие функции как матожидание
- дисперсия, ковариация и корреляция
- векторные случайные величины и их распределения
- энтропия и условная энтропия
- условное математическое ожидание

Мы научились находить зависимость одной случайной величины с помощью другой случайной величины:

- 1) линейную (как и любую наперед заданную двухпараметрическую) — надо рассчитать соответствующие дисперсии и ковариацию, для чего достаточно знать матожидания;
- 2) произвольного вида — надо рассчитать условное матожидание одной случайной величины относительно другой, для чего достаточно знать их совместное распределение.

# Ограничения, от которых мы будем избавляться

Для подсчета  $\mathbb{E}(X|Y)$ :

1. использовалось суммирование по значениям  $X$ , то есть предполагалось, что значений  $y$   $X$  не более чем счетное число;
2. предполагалось, что вероятность каждого значения  $Y$  не равна нулю, то есть значений  $y$   $Y$  тоже не более чем счетное число.

О том, что делать в общем случае — вся оставшаяся часть семестра.

Первый шаг здесь — ввести  $\sigma$ -алгебру над  $\Omega = \mathbb{R}$ . С этого и начнем...

- борелевские множества и мера Лебега
- случайные величины и измеримые отображения
- функции распределения
- абсолютно случайные величины и не только
- математическое ожидание как интеграл
- совместные функции распределения
- условное математическое ожидание как интеграл

## Геометрическая вероятность. Вопросы

**Пример 1.** Алгебра ли  $\mathcal{F} = \{[a, b] \subset [0, 1]\}$ ?

Нет, надо рассмотреть всевозможные конечные объединения всевозможных промежутков из  $[0, 1]$ .

Подумать: как задать на  $\alpha(\mathcal{F})$  длину.

**Пример 2.** Алгебра ли множество  $\Pi$  всех прямоугольников на  $[0, 1]^2$ ?

Нет, не годятся даже всевозможные конечные объединения прямоугольников  $\alpha(\Pi)$ . Проще взять  $\alpha(\mathcal{F}) \otimes \alpha(\mathcal{F})$ .

Подумать: имеется ли в  $\alpha(\mathcal{F}) \otimes \alpha(\mathcal{F})$  какой-нибудь треугольник?

Подумать: как задать на  $\alpha(\mathcal{F}) \otimes \alpha(\mathcal{F})$  площадь.

## Геометрическая вероятность. Решения

**Пример 3. Борелевские множества на открытом вправо промежутке.** Рассмотрим открытый вправо промежуток  $I \subset \mathbb{R}$  и полукольцо  $\mathcal{I}$  всех открытых вправо полуинтервалов  $[a, b) \subset I$ . Ее можно продолжить до  $\sigma$ -алгебры  $\sigma(\mathcal{I})$ ,  $\sigma$ -алгебры борелевских множеств. А как выглядят  $\sigma(\mathbb{R}), \mathcal{R}(\mathbb{R})$ ?

Подумать. А что будет, если начать со всех открытых влево промежутков, отрезков, интервалов?

Подумать. А как вероятность определить на таких множествах?

**Пример 4. Борелевские множества на плоскости.** Рассмотрим два открытых вправо промежутка  $I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$  и множества  $\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2$  всех открытых вправо полуинтервалов в  $I_1, I_2$ . Элементы  $\sigma(\mathcal{I}_1) \otimes \sigma(\mathcal{I}_2)$  называют борелевскими множествами на  $I_1 \times I_2$ .

Подумать: воспользовавшись этим примером, покажите, почему  $\sigma$ -алгебра удобнее, как измеримая структура, чем алгебра.

## Два определения борелевских множеств

**Определение 1.1.** [очень умное, пользоваться им мы почти не будем]  
Для топологического пространства  $(\Omega, \tau)$ , где  $\tau$  - совокупность всех открытых подмножеств множества  $\Omega$ , под  $\sigma$ -алгеброй борелевских множеств понимается  $\sigma(\tau)$ ,

$$\mathcal{B}_\Omega \triangleq \sigma(\tau).$$

**Определение 1.2.** [рабочее]

Минимальную  $\sigma$ -алгебру, содержащую все  $n$ -мерные параллелепипеды  $\{[a, b] \times \dots \times [c, d] \subset \mathbb{R}^n\}$ , называют борелевской  $\sigma$ -алгеброй над  $\mathbb{R}^n$ , а ее элементы — борелевскими множествами множества  $\mathbb{R}^n$ ,

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n} \triangleq \sigma\{[a, b] \times \dots \times [c, d] \subset \mathbb{R}^n\}.$$

Подумать: покажите, почему эти определения эквивалентны для  $\mathbb{R}^n$ .

Подумать: покажите, что эти определения совпадают с определениями предыдущего слайда для  $I = I_1 = I_2 = \mathbb{R}$ .

## Мера Лебега и не только

Борелевской мерой каждого параллелепипеда  $[a, b] \times \dots \times [c, d]$  назовем

$$\lambda([a, b] \times \dots \times [c, d]) = (b - a) \cdot \dots \cdot (d - c).$$

Эта функция счетно-аддитивна на полукольце всех параллелепипедов. По теореме Каратеодори мы можем ее продолжить на все элементы из  $\mathcal{B} \stackrel{\Delta}{=} \sigma(\tau)$ , то есть на все борелевские множества.

**Определение 2.** Так доопределенную меру  $\lambda$  называют **мерой Лебега**.

## Геометрическая вероятность. Итог

Эксперимент удовлетворяет геометрическому определению вероятности, если все его исходы можно изобразить в виде некоторого борелевского множества  $\Omega$ , причем  $0 < \lambda(\Omega) < +\infty$ , а вероятность любого его борелевского подмножества зависит только от лебеговской меры (длины, площади, объема, ...  $n$ -мерного объема) этого подмножества и задается по формуле

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\lambda(A)}{\lambda(\Omega)}, \forall A \in \mathcal{B}.$$

## Лебеговские множества. Пополнение меры

Итак, имея меру на всех борелевских подмножествах, мы можем свести геометрическую вероятность к общей схеме. Полученную нами меру (как и всякую другую меру) можно попробовать распространить и дальше. Рассмотрим алгебру нулевых (пренебрежимых) множеств:

$$\mathcal{N} = \{N \mid \exists A \in \mathcal{B}, N \subset A, \lambda(A) = 0\},$$

а с ней —  $\sigma$ -кольцо лебеговских множеств  $\sigma(\mathcal{B} \cup \mathcal{N})$ .

**Замечание.** Так пополненное  $\sigma$ -кольцо уже учитывает исходную меру  $\lambda$ , в отличие от конструкции Каратеодори.

Теперь продолжим меру на все лебеговские множества правилом

$$\lambda(N) = 0 \Rightarrow \lambda|_{2^N} \equiv 0 \quad \forall N \in \mathcal{B}.$$

**Замечание.** Такую операцию пополнения можно делать с любой мерой.

**Определение 3.** [на вырост] Меру  $\mu$  со свойством  $\mu(N) = 0 \Rightarrow \mu|_{2^N} \equiv 0$  для всех  $N \in \mathcal{F}$  называют **полной**.



## Случайные величины. Определения

Итак, задано некоторое вероятностное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ .

**Определение 4.1.** Случайной (скалярной) величиной  $\xi$  называется такая функция  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , что для любого борелевского множества  $B \in \mathcal{B}$  выполнено

$$\xi^{-1}(B) = \{\omega \mid \xi(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

**Определение 4.2.** Случайной (скалярной) величиной  $\xi$  называется такая функция  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , что для всех  $a, b \in \mathbb{R}$  ( $a < b$ ) выполнено

$$\xi^{-1}((a, b]) = \{\omega \mid a < \xi(\omega) \leq b\} \in \mathcal{F}.$$

**Определение 4.3.** Случайной (скалярной) величиной  $\xi$  называется такая функция  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , что для всех  $b \in \mathbb{R}$  выполнено

$$\xi^{-1}((-\infty, b]) = \{\omega \mid \xi(\omega) \leq b\} \in \mathcal{F}.$$

# Случайные величины. Эквивалентность

**Теорема 1.** Определения 4.1-4.3 эквивалентны.

Доказательство.

Очевидно, что из 4.1 следует 4.2, а из 4.2 следует 4.3. Покажем, что из 4.3 следует 4.1.

Рассмотрим класс

$$\{B \subset \mathbb{R} \mid \xi^{-1}(B) \in \mathcal{B}\},$$

он замкнут относительно не более чем счетного применения теоретико-множественных операций. Следовательно, это  $\sigma$ -алгебра. Он заведомо содержит все  $(-\infty, b]$ . Следовательно, он содержит минимальную  $\sigma$ -алгебру, их содержащую, то есть  $\mathcal{B}$ .

## О минимальности

Подумать. Следующие определения эквивалентны:

- $\xi$  — случайная величина;
- $\sigma\{\{\omega \mid \xi(\omega) \in B\} \mid B \in \mathcal{B}\} \subset \mathcal{B}$ ;
- $\sigma\{\{\omega \mid \xi(\omega) < x\} \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{B}$ ;
- $\sigma\{\{\omega \mid \xi(\omega) \leq x\} \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{B}$ ;
- $\sigma\{\{\omega \mid \xi(\omega) \geq x\} \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{B}$ ;
- $\sigma\{\{\omega \mid \xi(\omega) > x\} \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{B}$ ;
- $\sigma\{\{\omega \mid y < \xi(\omega) < x\} \mid x, y \in \mathbb{R}, y < x\} \subset \mathcal{B}$ ;
- $\sigma\{\{\omega \mid y \leq \xi(\omega) \leq x\} \mid x, y \in \mathbb{R}, y < x\} \subset \mathcal{B}$ .

Однако в этот список нельзя добавить

- $\sigma\{\{\omega \mid \xi(\omega) = x\} \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{B}$ .

Сейчас мы дали много эквивалентных друг другу определений  $\sigma(\xi)$ .

Для определенности примем:

$$\sigma(\xi) \triangleq \sigma\{\{\omega \mid \xi(\omega) \in B\} \mid B \in \mathcal{B}\}.$$

## Что получили в рамках избавления от ограничений

- борелевские множества и мера Лебега
- случайные величины и измеримые отображения
- функции распределения
- абсолютно случайные величины и не только
- математическое ожидание как интеграл
- совместные функции распределения
- условное математическое ожидание как интеграл

Мы нашли подходящую  $\sigma$ -алгебру на  $\mathbb{R}$ , теперь мы умеем работать хотя бы с геометрической вероятностью. Мы дали определение случайной величине без каких-либо требований на мощность ее значений и нашли какой  $\sigma$ -алгебре она соответствует. Теперь надо научиться работать с такими объектами...