

Chapter. 3

Single-variate Linear Regression without Bias Term

| Theory Assignment

FAST CAMPUS
ONLINE

강사. 신경식

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-01

Dataset이 다음과 같이 단 하나의 data sample로만 이루어졌다고 하자.

$$\mathcal{D} = \{(x^{(1)}, y^{(1)})\} = \{(1, 2)\}$$

위의 dataset은 $y = 2x$ 에서부터 만들어졌기 때문에, model을 $\hat{y} = \theta x$ 로 설정할 때 다음 문제들에 답하시오.

1) θ 가 1, 1.5, 2일 때의 square error를 이용한 loss를 각각 구하고, θ 가 2에 가까워질때 loss의 변화를 비교하시오.

(square error는 y 와 \hat{y} 를 이용하여 $(y - \hat{y})^2$ 로 구한다.)

2) 임의의 θ 에 대한 loss를 algebraic equation으로 표현하고 그래프를 그리시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-02

Dataset이 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$\mathcal{D} = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), (x^{(3)}, y^{(3)})\} = \{(1,2), (2,4), (3,6)\}$$

위의 dataset에 대해 다음의 물음에 답하시오.

- 1) model을 $\hat{y} = x$ 로 설정한다면, 각 data sample들에 대한 square loss를 구하고 서로 비교하시오.
- 2) square error loss를 임의의 data point $(x^{(i)}, y^{(i)})$ 에 대한 algebraic equation으로 표현하고,
 $(x^{(i)}, y^{(i)})$ 에 대한 square error loss를 최소로 만드는 θ 를 구하시오.
 단, θ 는 변수로 사용하여 model은 $\hat{y} = \theta x$ 로 설정하시오.
- 3) 2)에서 구한 algebraic equation이 θ 에 대한 몇차인지 구하고, convexity를 말하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-03

문제에서의 상황이 Question.3-02와 동일할 때, 다음의 물음에 답하시오.

- 1) Question.3-02의 1) 상황에서 1)의 결과를 이용하여 MSE cost를 구하시오.
- 2) MSE cost를 algebraic equation으로 표현하고, MSE cost를 최소로 만드는 θ 를 구하시오.
- 3) 2)에서 구한 algebraic equation이 θ 에 대한 몇차인지 구하고, convexity를 말하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-04

다음과 같이 하나의 data sample만 가지고 있는 Dataset이 주어졌다.

$$\mathcal{D} = \{(1,2)\}$$

이때 다음 질문들에 답하시오. 단 prediction model은 $\hat{y} = \theta x$ 를 사용한다.

- 1) Square error를 loss로 사용할 때 loss에 대한 식을 구하고, $\frac{\partial \mathcal{L}(\theta)}{\partial \theta}$ 의 식을 구하시오.

그리고 gradient descent method를 이용하여 θ 를 update시키는 식을 구하시오.

- 2) initial θ 를 1로, learning rate을 0.1로 설정했을 때 3 iteration 동안 update되는 θ 들을 구하시오.

그리고 target θ 에 가까워지는지 확인하시오.

- 3) loss의 식을 graph로 표현하고 2)에서 구한 θ 가 update되는 위치들을 이 graph 위에 나타내시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-05

다음과 같이 하나의 data sample만 가지고 있는 Dataset이 주어졌다.

$$\mathcal{D} = \{(1,2)\}$$

이때 다음 질문들에 답하시오.

단 Question.3-04와 마찬가지로 prediction model은 $\hat{y} = \theta x$ 를 사용하고, initial θ 는 1로 설정한다.

- 1) learning rate이 0.8일 때, 3 iteration 동안 update되는 θ 들을 구하시오.
- 2) learning rate이 1.1일 때, 3 iteration 동안 update되는 θ 들을 구하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-06

다음과 같이 Dataset이 주어졌다.

$$\mathcal{D} = \{(1,2), (3,6), (4,8)\}$$

이때 다음 질문들에 답하시오.

단 Question.3-04, Question.3-05와 마찬가지로 prediction model은 $\hat{y} = \theta x$ 를 사용하고, initial θ 는 1로 설정 한다.

- 1) learning rate이 0.1일 때, 각각 θ 의 loss에 대한 update equation을 구하시오.
- 2) 1)에 구한 update equation을 이용하여 3번의 iteration에 대해 각각 θ 의 변화를 구하고, Question.3-05 3)의 관점에서 data sample에 따른 학습의 불안정성을 설명하시오.
- 3) learning rate이 0.01일 때, 각각 θ 의 loss에 대한 update equation을 구하고,
3번의 iteration에 대해 각각 θ 의 변화를 구하시오. 추가로 2)에서의 학습의 불안정성이 해결되는지 설명하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-07

다음과 같이 Dataset이 주어졌다.

$$\mathcal{D} = \{(1,2), (3,6), (4,8)\}$$

이때 다음 질문들에 답하시오.

단 Question.3-04, Question.3-05와 마찬가지로 prediction model은 $\hat{y} = \theta x$ 를 사용하고, initial θ 는 1로 설정 한다.

- 1) 각 3개의 data point들의 loss를 이용하여 cost J를 구하고, $\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta}$ 를 구하시오.
- 2) $\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta}$ 와 gradient descent method를 이용한 θ 의 update equation을 구하고,
 $\alpha = 0.1$ 일때 4 iterations에 대한 θ 의 변화를 구하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-08

Question.3-08의 질문들은 Question.3-06과 Question.3-07을 바탕으로 해결하시오.

1) $\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta}$ 와 $\frac{\partial \mathcal{L}^{(1)}(\theta)}{\partial \theta}$, $\frac{\partial \mathcal{L}^{(2)}(\theta)}{\partial \theta}$, $\frac{\partial \mathcal{L}^{(3)}(\theta)}{\partial \theta}$ 의 관계를 설명하고, 이들을 이용한 gradient descent methods

$$\theta := \theta - \alpha \frac{\partial \mathcal{L}^{(i)}(\theta)}{\partial \theta} \qquad \theta := \theta - \alpha \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta}$$

의 관계를 설명하시오.

2) Question.3-06에서 (4,8)에 대한 loss를 이용하여 θ 를 학습시키면 학습이 되지 않았다.

하지만 Question.3-07에서는 cost를 이용하여 θ 를 학습시킬 때 (4,8)이 사용되었는데 올바르게 학습이 되었다.

두 과정의 차이점을 설명하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-09

Linear regression을 위한 dataset이 다음과 같이 주어졌다.

$$D = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), \dots, (x^{(n)}, y^{(n)})\}$$

이때, dataset은 $y = ax$ 에서부터 만들어졌다.

따라서 linear regression을 통해 predictor를 학습시킬때, model은 $\hat{y} = \theta x$, loss는 square error를 사용할 수 있다.

θ 를 update하기 위해 하나의 data sample만 이용할때, 1번의 iteration에 대해 θ 가 dataset을 잘 표현하는

θ 로 update되는 과정을 설명하시오.

단, forward/backward propagation을 설명하기 위해 각 연산은 basic building node들을 이용하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-10

Linear regression을 위한 dataset이 다음과 같이 주어졌다.

$$D = \{(1,3), (3,9), (2,6), (-1, -3)\}$$

learning rate을 0.01로, initial θ 는 1로 설정하고, Question.3-09와 같은 방법으로 학습을 진행할 때 다음 질문에 답하시오.

1) 1 epoch 동안 각 data sample들에 대해 loss와 θ 가 update되는 절댓값을 구하시오.

그리고 loss의 감소 graph의 fluctuation이 생기는 이유를 설명하시오.

2) 1)의 결과를 통하여 $x^{(i)}$ 의 크기가 γ 배 되었을 때, loss와 θ 가 update되는 양은 몇 배가 되는지 구하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-11

Linear regression을 통해 predictor를 학습시킬 때, iteration이 지날 때마다 loss의 감소량과 θ 가 update되는 양이 줄어드는 이유를 설명하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-12

대부분의 dataset에는 noise가 섞여있다. $y = 2x$ 에서 이상적으로 만들어진 Dataset이 다음과 같을 때

$$D = \{(1,2), (2,4), (3,6)\}$$

noise에 의해 실제로 수집한 dataset이 다음과 같이 왜곡되었다고 가정하자.

$$D = \{(1,0.5), (2,5), (3,5)\}$$

θ 가 2이었을때, 즉 predictor가 target function일때 각 data sample에 의해 θ 가 update되는 값들을 구하고, noise가 학습에 미치는 영향을 분석하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-13

Linear regression을 위한 dataset이 다음과 같이 주어졌다.

$$D = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), \dots, (x^{(n)}, y^{(n)})\}$$

이때, dataset은 $y = ax$ 에서부터 만들어졌다.

따라서 linear regression을 통해 predictor를 학습시킬때,

model은 $\hat{y} = \theta x$, loss는 square error, cost는 MSE를 사용할 수 있다.

θ 를 update하기 위해 2개의 data sample를 이용할때, 1번의 iteration에 대해 θ 가 dataset을 잘 표현하는

θ 로 update되는 과정을 설명하시오.

단, forward/backward propagation을 설명하기 위해 각 연산은 basic building node들을 이용하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-14

Linear regression을 위한 dataset이 다음과 같이 주어졌고, 이 dataset을 이용하여 predictor를 학습시키려고 한다.

$$D = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), \dots, (x^{(n)}, y^{(n)})\}$$

이때 loss를 사용하여 θ 를 update시키면 $(x^{(i)}, y^{(i)})$ 의 크기에 따라 θ 를 θ^* 에서 멀어지게 하는 $(x^{(i)}, y^{(i)})$ 가 존재할 수 있다.

cost를 사용하게되면 이 문제에 대한 위험성을 낮출 수 있는데, 그 이유를 설명하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-15

Linear regression을 위한 dataset이 다음과 같이 주어졌다.

$$D = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), \dots, (x^{(n)}, y^{(n)})\}$$

Question.3-13와 같은 방법으로 학습을 진행할 때, n개의 data sample을 이용하여 θ 를 update한다면 loss의 감소에서 fluctuation은 어떻게 변하는지 설명하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-16

Linear regression을 위한 dataset이 다음과 같이 주어졌다.

$$D = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), \dots, (x^{(n)}, y^{(n)})\}$$

이때, dataset은 $y = ax$ 에서부터 만들어졌다.

따라서 linear regression을 통해 predictor를 학습시킬때,

model은 $\hat{y} = \theta x$, loss는 square error, cost는 MSE를 사용할 수 있다.

θ 를 update하기 위해 n개의 data sample를 이용할때, 1번의 iteration에 대해 θ 가 dataset을 잘 표현하는

θ 로 update되는 과정을 Vector notation을 이용하여 설명하시오.

단, forward/backward propagation을 설명하기 위해 각 연산은 basic building node들을 이용하시오.

Chapter.3 Single-variate Linear Regression without Bias Term

Question.3-17

Question.3-18에서는 Jacobian들의 matrix multiplication을 이용하여 $y = \theta x$ 를 학습시키는 과정을 증명하였다.

그리고 이 과정에서 $\frac{\partial \vec{z}_2}{\partial \vec{z}_1}, \frac{\partial \vec{\mathcal{L}}}{\partial \vec{z}_2}$ 는 모두 diagonal matrix인 것을 확인할 수 있었다.

이 관점에서 다음의 질문들에 답하시오.

- 1) $n \times n$ diagonal matrix A, B의 matrix multiplication은 각 diagonal entry들을 원소로 가지는 vector들의 Hadamard product으로 표현할 수 있음을 보이시오.
- 2) Question.3-16의 과정을 1)의 내용을 이용하여 Hadamard product으로 표현하시오.