



Bonviva[®]
ácido ibandrónico

Eficacia

de la inyección mensual
de ibandronato sobre el riesgo

de fractura vertebral en mujeres¹

Presentaciones

Bonviva®

ácido ibandronico



Cómoda posología UNA VEZ AL MES²



Después de levantarse por la mañana, los pacientes deben tomar una tableta de **Bonviva®** 150 mg con un **vaso de agua y el estómago vacío**.



Después de tomar **Bonviva®**, los pacientes deben permanecer **sentados o de pie, y en ayunas por 1 hora**.



Su paciente debe tomar **Bonviva®** en la **misma fecha cada mes**, pero si olvidó hacerlo, tiene una ventana de hasta de tres semanas para tomar su dosis mensual.



Una jeringa precargada cada 3 meses

Fácil de administrar



Inyección de **15-30 segundos de duración**, a través de una jeringa precargada.



La administración I.V. **elimina la necesidad de ayuno pre y postdosis** requerida por un bifosfonato oral.



No requiere un **monitoreo renal específico**.



Referencia:

1. Ito M, Tobinai M, Yoshida S, Hashimoto J, Nakamura T. Effect of monthly intravenous ibandronate injections on vertebral or non-vertebral fracture risk in Japanese patients with high-risk osteoporosis in the MOVER study. *J Bone Miner Metab.* 2017 Jan;35(1):58-64.
2. BONVIVA® Summary of product characteristics.