

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 15/01/2013 – ore 9

Esercizio 1

Risulta:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{10^5} = 1 - \frac{189}{625} = \frac{436}{625} = 0,6976,$$

$$P(B) = \frac{6 \cdot 5!}{10^5} = \frac{9}{1250} = 0,0072, \quad P(C) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \binom{5}{2}}{10^5} = \frac{63}{1250} = 0,0504$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(A \cap B \cap C) = 0, \quad P(A \cap C) = P(C) = \frac{63}{1250} = 0,0504.$$

Pertanto

$$P(A \cap B) = 0 \neq P(A) \cdot P(B) = 0,6976 \cdot 0,0072 = 0,0050,$$

$$P(A \cap C) = 0,0504 \neq P(A) \cdot P(C) = 0,6976 \cdot 0,0504 = 0,0352,$$

$$P(B \cap C) = 0 \neq P(B) \cdot P(C) = 0,0072 \cdot 0,0504 = 0,0004,$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0 \neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,6976 \cdot 0,0072 \cdot 0,0504 = 0,0003,$$

e quindi gli eventi A, B e C non sono indipendenti.

Esercizio 2

(i) Risulta

$$P(X = 2) = \frac{\binom{5}{3} + \binom{6}{3} + \binom{8}{3}}{\binom{19}{3}} = \frac{86}{969} = 0,0887,$$

$$P(X = 1) = \frac{5 \cdot 6 \cdot 8}{\binom{19}{3}} = \frac{80}{323} = 0,2477,$$

$$P(X = -1) = 1 - \left(\frac{86}{969} + \frac{80}{323} \right) = \frac{643}{969} = 0,6636.$$

(ii) Si ha che

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < -1, \\ 643/969 = 0,6636 & -1 \leq x < 1, \\ (643/969) + (80/323) = 883/969 = 0,9112 & 1 \leq x < 2, \\ 1 & x \geq 2. \end{cases}$$

(iii)

$$E(X) = -\frac{643}{969} + \frac{80}{323} + 2 \cdot \frac{86}{969} = -\frac{77}{323} = -0,2384,$$

$$E(X^2) = \frac{643}{969} + \frac{80}{323} + 4 \cdot \frac{86}{969} = \frac{409}{323} = 1,2663,$$

$$Var(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{409}{323} - \left(\frac{77}{323} \right)^2 = 1,2094.$$

(iv)

$$E(Y) = -\frac{643}{969} + \frac{80}{323} + \frac{1}{2} \cdot \frac{86}{969} = -\frac{120}{323} = -0,3715.$$

Esercizio 3

(i) La variabile X_i ha distribuzione di Bernoulli con parametro

$$p = P(X_i = 1) = \frac{50}{99} = 0,5051.$$

Si ha quindi

$$E(X_i) = p = \frac{50}{99}, \quad Var(X_i) = p(1-p) = \frac{50}{99} \left(1 - \frac{50}{99}\right) = \frac{2450}{9801} = 0,2499.$$

(ii) Risulta

$$E(X) = \sum_{i=1}^{50} E(X_i) = 50 \cdot \frac{50}{99} = \frac{2500}{99} = 25,2525.$$

Inoltre, essendo

$$E(X_i X_j) = P(X_i = 1)P(X_j = 1 | X_i = 1) = \frac{50}{99} \cdot \frac{49}{97} = 0,2551,$$

si ha che

$$Cov(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j) = \frac{50}{99} \cdot \frac{49}{97} - \left(\frac{50}{99}\right)^2 = \frac{50}{950697},$$

e quindi

$$Var(X) = \sum_{i=1}^{50} Var(X_i) + 2 \sum_{i < j} Cov(X_i, X_j) = 50 \cdot \frac{2450}{9801} + 2 \binom{50}{2} \cdot \frac{50}{950697} = 12,6276.$$

(iii) Per la disuguaglianza di Markov si ha che

$$P(X \geq 50) \leq E(X)/50 = \frac{1}{50} \cdot \frac{2500}{99} = \frac{50}{99} = 0,5051.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 29/01/2013 – ore 9

Esercizio 1 (i) Posto $H = \{\text{in 2 nodi adiacenti della rete (e solo in quelli) si genera } \mathbf{1}\}$, la probabilità richiesta è:

$$P(H) = P(A_1 \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}) + P(\overline{A_1} \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap A_4) + P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap A_3 \cap A_4) + P(A_1 \cap \overline{A_2} \cap A_3 \cap \overline{A_4}).$$

Tenendo presente che gli eventi A_i sono indipendenti, e che $P(A_k) = k/4$, si ha

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}) = P(A_1)P(A_2)P(\overline{A_3})P(\overline{A_4}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot 0 = 0,$$

$$P(\overline{A_1} \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap A_4) = P(\overline{A_1})P(A_2)P(\overline{A_3})P(A_4) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{3}{32},$$

$$P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap A_3 \cap A_4) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3)P(A_4) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{9}{32},$$

$$P(A_1 \cap \overline{A_2} \cap A_3 \cap \overline{A_4}) = P(A_1)P(\overline{A_2})P(A_3)P(\overline{A_4}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 0 = 0.$$

Pertanto si ha

$$P(H) = \frac{3}{32} + \frac{9}{32} = \frac{3}{8}.$$

(ii) Risulta:

$$P(A_1|H) = 0, \quad P(A_2|H) = \frac{3/32}{3/8} = \frac{1}{4}, \quad P(A_3|H) = \frac{9/32}{3/8} = \frac{3}{4}, \quad P(A_4|H) = \frac{3/8}{3/8} = 1.$$

Esercizio 2 (i) La densità di X è data da

$$f(x) = \frac{d}{dx}F(x) = \begin{cases} p, & 0 < x < 1 \\ 1 - p, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(ii) Il valore medio di X è:

$$E(X) = \int_0^1 px \, dx + \int_1^2 (1-p)x \, dx = p \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + (1-p) \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{p}{2} + (1-p) \frac{3}{2} = \frac{3}{2} - p.$$

Inoltre

$$E(X^2) = \int_0^1 px^2 \, dx + \int_1^2 (1-p)x^2 \, dx = p \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + (1-p) \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{p}{3} + (1-p) \frac{7}{3} = \frac{7}{3} - 2p,$$

e quindi la varianza è

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{7}{3} - 2p - \left(\frac{3}{2} - p \right)^2 = \frac{1}{12} + p - p^2.$$

(iii) Il valore medio $E(X) = \frac{3}{2} - p$ è decrescente, e quindi è massimo per $p = 0$ e minimo per $p = 1$. Poiché

$$\frac{d}{dp} Var(X) = \frac{d}{dp} \left(\frac{1}{12} + p - p^2 \right) = 1 - 2p,$$

la varianza è massima per $p = 1/2$, ed è minima per $p = 0$ e $p = 1$.

Esercizio 3 (i) Notiamo che

	X	Y	P
ccc	0	0	3/16
cct	1	1	1/16
ctc	1	2	3/16
ctt	2	1	1/16
tcc	1	1	3/16
tct	2	2	1/16
ttc	2	1	3/16
ttt	3	0	1/16

$x \backslash y$	0	1	2	$p_X(x)$
0	3/16	0	0	3/16
1	0	4/16	3/16	7/16
2	0	4/16	1/16	5/16
3	1/16	0	0	1/16
$p_Y(y)$	1/4	1/2	1/4	1

(ii) Ad esempio risulta $p(0,0) = 3/16 \neq p_X(0)p_Y(0) = (3/16)(1/4)$, quindi X e Y non sono indipendenti.

(iii) Si ha

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{7 + 10 + 3}{16} = \frac{20}{16} = \frac{5}{4}, & E(Y) &= \frac{8 + 8}{16} = 1, \\ E(X^2) &= \frac{7 + 20 + 9}{16} = \frac{36}{16} = \frac{9}{4}, & E(Y^2) &= \frac{8 + 16}{16} = \frac{24}{16} = \frac{3}{2}, \\ Var(X) &= \frac{9}{4} - \frac{25}{16} = \frac{11}{16}, & Var(Y) &= \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(iv) Essendo

$$E(X \cdot Y) = \frac{4 + 6 + 8 + 4}{16} = \frac{11}{8},$$

il coefficiente di correlazione è

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) Var(Y)}} = \frac{E(X \cdot Y) - E(X) E(Y)}{\sqrt{Var(X) Var(Y)}} = \frac{1/8}{\sqrt{11/32}} = \frac{1}{\sqrt{22}} \approx 0,2132$$

quindi X e Y sono positivamente correlate.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 19/2/2013

Esercizio 1 (i) Risulta:

$$P(A) = \binom{3}{1} \left(\frac{2}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 3 \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{9}{25} = \frac{54}{125} = 0,432$$

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^3 = 1 - \frac{64}{125} = \frac{61}{125} = 0,488$$

$$P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap \overline{B}) = \frac{54}{125} - \binom{3}{1} \left(\frac{2}{5}\right) \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{54}{125} - \frac{24}{125} = \frac{30}{125} = \frac{6}{25} = 0,24$$

e quindi $P(A \cap B) \neq P(A)P(B) = 0,2108$ da cui segue che A e B non sono indipendenti.

(ii) In generale, la relazione $P(B \cup C) = P(B) + P(C)$ è soddisfatta se e solo se $P(B \cap C) = 0$. Poichè risulta

$$P(B \cap C) = \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1}{125} = 0,008$$

allora si ha $P(B \cup C) \neq P(B) + P(C)$ in quanto B e C non sono eventi incompatibili.

(iii) Si ha

$$P(C) = 2\left(\frac{2}{5}\right)^3 + \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{17}{125} = 0,136$$

$$P(C|B) = \frac{P(B \cap C)}{P(B)} = \frac{1/125}{61/125} = \frac{1}{61} = 0,016$$

e quindi $P(C) \neq P(C|B)$, da cui segue che B e C non sono indipendenti.

Esercizio 2 (i) Si ha

$$p(2) = P(\mathbf{00}\dots) + P(\mathbf{11}\dots) = \frac{\binom{2}{0} \binom{n-2}{2}}{\binom{n}{2}} + \frac{\binom{2}{2} \binom{n-2}{0}}{\binom{n}{2}} = \frac{(n-2)(n-3) + 2}{n(n-1)}$$

$$p(3) = P(\mathbf{100}\dots) + P(\mathbf{011}\dots) = \frac{\binom{1}{1} \binom{2}{0} \binom{n-3}{1}}{\binom{n}{2}} + \frac{\binom{1}{0} \binom{2}{2} \binom{n-3}{0}}{\binom{n}{2}} = \frac{2(n-3) + 2}{n(n-1)}$$

$$p(4) = P(\mathbf{0100}\dots) = \frac{\binom{1}{0} \binom{1}{1} \binom{2}{0} \binom{n-4}{1}}{\binom{n}{2}} = \frac{2(n-4)}{n(n-1)}$$

$$p(5) = P(\mathbf{10100}\dots) = \frac{\binom{1}{1} \binom{1}{0} \binom{1}{1} \binom{2}{0} \binom{n-5}{0}}{\binom{n}{2}} = \frac{2}{n(n-1)}$$

$$p(6) = P(\mathbf{010100}\dots) = \frac{\binom{1}{0}\binom{1}{1}\binom{1}{0}\binom{1}{1}\binom{2}{0}\binom{n-6}{0}}{\binom{n}{2}} = \frac{2}{n(n-1)}$$

pertanto

$$\sum_{k=2}^6 p(k) = \frac{(n-2)(n-3) + 2 + 2(n-3) + 2 + 2(n-4) + 2 + 2}{n^2 - n} = \frac{n^2 - n}{n^2 - n} = 1.$$

(ii) Si ricava quindi

$$E(X) = \sum_{k=2}^6 k p(k) = \frac{2(n-2)(n-3) + 4 + 6(n-3) + 6 + 8(n-4) + 10 + 12}{n^2 - n} = 2\left(1 + \frac{3}{n}\right)$$

da cui segue

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E(X) = 2$$

Esercizio 3 (i) Per $z > 2$ risulta

$$P(X > z | X > 2) = \frac{P(X > z)}{P(X > 2)} = \frac{1 - F(z)}{1 - F(2)} = \frac{1 - F(z)}{4/5}$$

quindi $P(X > z | X > 2) = 0,25$ per $1 - F(z) = 1/5$, ossia $F(z) = 4/5$, da cui $z = 5$.

(ii) Notiamo che

$$P(X > 3) = 1 - F(3) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

mentre

$$P(X > 5 | X > 2) = \frac{P(X > 5)}{P(X > 2)} = \frac{1 - F(5)}{1 - F(2)} = \frac{1/5}{4/5} = \frac{1}{4}$$

quindi $P(X > 5 | X > 2) \neq P(X > 3)$, pertanto X non soddisfa la proprietà di assenza di memoria.

(iii) Notiamo che $S = X_1 + X_2$, con X_1, X_2 variabili i.i.d. uniformi in $(1, 6)$, ossia aventi densità di probabilità

$$f(x) = \frac{d}{dx}F(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 1 < x < 6 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Per $i = 1, 2$ risulta $E(X_i) = 3,5$ e $Var(X_i) = 25/12 = 2,08\bar{3}$; si ottiene pertanto

$$E(S) = E(X_1) + E(X_2) = 7, \quad Var(S) = Var(X_1) + Var(X_2) = \frac{50}{12} = 4,1\bar{6}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 29/4/2013 – ore 12

Esercizio 1 Considerati gli eventi $E = \{\text{il valore giunto nel nodo } B \text{ è } \mathbf{0}\}$, $F = \{\text{il valore giunto nel nodo } B \text{ è } \mathbf{1}\}$ e $C_i = \{\text{il bit generato in } A \text{ arriva al nodo } N_i\}$, ($i = 1, 2, 3$), si ha

$$\begin{aligned} P(E) &= P(C_2 \mid \text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{0})P(\text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{0}) \\ &\quad + P(C_3 \mid \text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{1})P(\text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{1}) \\ &= \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{18}, \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} P(F) &= P(C_2 \mid \text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{1})P(\text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{1}) \\ &\quad + P(C_1 \mid \text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{0})P(\text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{0}) \\ &= \frac{3}{9} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Quindi

(i)

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) = \frac{7}{18} + \frac{1}{4} = \frac{23}{36},$$

(ii)

$$\begin{aligned} &P(\text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{1} \mid E) \\ &= \frac{P(E \mid \text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{1}) \cdot P(\text{nel nodo } A \text{ è stato generato } \mathbf{1})}{P(E)} \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} \right) / \frac{7}{18} = \frac{4}{7}. \end{aligned}$$

Esercizio 2 Sia Y_i la variabile aleatoria che descrive l'esito del lancio del dado i -esimo, per $i = 1, 2$. Si ha pertanto $X = \max(Y_1, Y_2)$, dove Y_1 ed Y_2 sono indipendenti ed identicamente distribuite con distribuzione uniforme discreta in $\{1, \dots, 6\}$.

(i) Per $k = 1, \dots, 6$ si ha

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \sum_{j=1}^{k-1} P(Y_1 = k, Y_2 = j) + \sum_{j=1}^{k-1} P(Y_1 = j, Y_2 = k) + P(Y_1 = k, Y_2 = k) \\ &= 2 \sum_{j=1}^{k-1} P(Y_1 = k)P(Y_2 = j) + P(Y_1 = k, Y_2 = k) = 2 \sum_{j=1}^{k-1} \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{2k-1}{36}. \end{aligned}$$

(ii) Risulta quindi

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1, \\ 1/36 & 1 \leq x < 2, \\ 4/36 & 2 \leq x < 3, \\ 9/36 & 3 \leq x < 4, \\ 16/36 & 4 \leq x < 5, \\ 25/36 & 5 \leq x < 6, \\ 1 & x \geq 6. \end{cases}$$

(iii) Si ha inoltre

$$P(X = k | C) = \begin{cases} 0 & k = 1, 2, \\ \frac{3/36}{1/6} = \frac{1}{2} & k = 3, \\ \frac{1/36}{1/6} = \frac{1}{6} & k = 4, \\ \frac{1/36}{1/6} = \frac{1}{6} & k = 5, \\ \frac{1/36}{1/6} = \frac{1}{6} & k = 6. \end{cases}$$

(iv) I valori medi richiesti sono:

$$E(X) = \sum_{k=1}^6 k \cdot P(X = k) = \sum_{k=1}^6 k \cdot \frac{2k-1}{36} = \frac{161}{36} = 4,4722,$$

$$E(X | C) = 3 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 4.$$

Esercizio 3 Essendo X uniforme in $(-1, 1)$, si ha che $E(X) = 0$, $Var(X) = 1/3$ e la funzione di distribuzione è

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < -1, \\ (x+1)/2 & -1 \leq x < 1, \\ 1 & x \geq 1. \end{cases}$$

Essendo Y esponenziale di valore atteso $E(Y) = 2$, si ha che $Var(Y) = 4$ e

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0, \\ 1 - e^{-y/2} & y \geq 0. \end{cases}$$

Risulta quindi

(i)

$$P(X \geq 0, Y \leq 2) = P(X \geq 0) \cdot P(Y \leq 2) = [1 - F_X(0)] \cdot F_Y(2) = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}) = 0,316.$$

(ii)

$$E(XY) = E(X) \cdot E(Y) = 0,$$

(iii)

$$Var(2X + Y) = 4Var(X) + Var(Y) = \frac{4}{3} + 4 = \frac{16}{3} = 5,333.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 19/6/2013 – ore 9

Esercizio 1 Considerati gli eventi $S = \{\text{il messaggio è uno SPAM}\}$ ed $E = \{\text{il sistema valuta come SPAM il messaggio ricevuto}\}$, risulta $P(S) = 0,7$, $P(\bar{S}) = 0,3$, $P(E|S) = 0,9$, $P(\bar{E}|S) = 0,1$, $P(\bar{E}|\bar{S}) = 0,8$ e $P(E|\bar{S}) = 0,2$. Pertanto

(i)

$$P(E) = P(E|S)P(S) + P(E|\bar{S})P(\bar{S}) = 0,9 \cdot 0,7 + 0,2 \cdot 0,3 = 0,69.$$

(ii)

$$P(S|E) = \frac{P(E|S)P(S)}{P(E)} = \frac{0,63}{0,69} = 0,913.$$

Esercizio 2 (i) Essendo

$$\int_{-2}^1 c|x|dx = \frac{5c}{2},$$

deve essere $c = 2/5$.

(ii) Risulta

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -2, \\ \int_{-2}^x \frac{2}{5}(-y)dy = \frac{4-x^2}{5} & -2 \leq x < 0, \\ \int_{-2}^0 \frac{2}{5}(-y)dy + \int_0^x \frac{2}{5}ydy = \frac{4+x^2}{5} & 0 \leq x < 1, \\ 1 & x \geq 1. \end{cases}$$

(iii) Si ha che

$$E(X) = \int_{-2}^0 \frac{2}{5}(-x^2)dx + \int_0^1 \frac{2}{5}x^2dx = -\frac{14}{15}.$$

(iv)

$$P(X < 0 | X \geq -1) = \frac{P(-1 \leq X < 0)}{P(X \geq -1)} = \frac{F_X(0) - F_X(-1)}{1 - F_X(-1)} = \frac{\frac{4}{5} - \frac{3}{5}}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{1}{2}.$$

Esercizio 3 (i) Distribuzioni congiunta e marginali sono date da:

$x \backslash y$	0	1	$p_X(x)$
0	θ	$p - \theta$	p
1	$1 - p - \theta$	θ	$1 - p$
$p_Y(y)$	$1 - p$	p	1

(ii) Risulta

$$P(X \geq Y) = p(0, 0) + p(1, 0) + p(1, 1) = \theta + 1 - p,$$

che assume valore massimo per $p = \theta$.

(iii) Essendo $E(X \cdot Y) = \theta$, $E(X) = 1 - p$, $E(Y) = p$, $Var(X) = Var(Y) = p(1 - p)$, risulta

$$\rho(X, Y) = \frac{E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}} = \frac{\theta - p(1 - p)}{p(1 - p)},$$

quindi

$$\rho(X, Y) = \frac{1}{2} \iff \frac{\theta - p(1 - p)}{p(1 - p)} = \frac{1}{2} \iff \theta = \frac{3p(1 - p)}{2}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 12/7/2013

Esercizio 1 Sia $U_B = \{\text{l'urna scelta contiene una biglia bianca}\}$ e sia $B = \{\text{la biglia estratta è bianca}\}$.

(i) Dalla formula delle alternative segue:

$$P(B) = P(B|U_B) P(U_B) + P(B|\overline{U_B}) P(\overline{U_B}) = 1p + \frac{1}{2}(1-p) = \frac{1}{2}(1+p).$$

(ii) Dalla formula di Bayes segue:

$$P(U_B|B) = \frac{P(B|U_B) P(U_B)}{P(B)} = \frac{1p}{\frac{1}{2}(1+p)} = \frac{2p}{1+p}.$$

(iii) Risulta $P(U_B|B) = 1/2$ per

$$\frac{2p}{1+p} = \frac{1}{2}, \quad \text{ossia } p = \frac{1}{3}.$$

Risulta $P(U_B|B) = 1/3$ per

$$\frac{2p}{1+p} = \frac{1}{3}, \quad \text{ossia } p = \frac{1}{5}.$$

Esercizio 2 (i) La funzione

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{c} \log(x+1), & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

è continua in $x = 1$ se $F(1^-) = 1$, ossia se $c = \log 2 = 0,6931$; in tal caso $F(x)$ è la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria continua X .

(ii) La densità di probabilità di X è, per $c = \log 2$,

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \begin{cases} \frac{1}{c(x+1)}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(iii) Per $k = 1, 2, \dots$ si ha, per $c = \log 2$,

$$E[(X+1)^k] = \frac{1}{c} \int_0^1 (x+1)^{k-1} dx = \frac{(x+1)^k}{ck} \Big|_0^1 = \frac{2^k - 1}{ck}.$$

(iv) Ricordando che $Var(X) = Var(X+1)$ si ha, per $c = \log 2$,

$$Var(X) = Var(X+1) = E[(X+1)^2] - [E(X+1)]^2 = \frac{3}{2c} - \frac{1}{c^2} = \frac{3c-2}{2c^2}.$$

Esercizio 3 (i) Essendo $X = B_1$ **or** B_2 e $Y = B_2$ **and** B_3 , si ha:

$B_1 B_2 B_3$	X	Y	P
000	0	0	$(1-p)^3$
001	0	0	$p(1-p)^2$
010	1	0	$p(1-p)^2$
011	1	1	$p^2(1-p)$
100	1	0	$p(1-p)^2$
101	1	0	$p^2(1-p)$
110	1	0	$p^2(1-p)$
111	1	1	p^3

pertanto la distribuzione di probabilità congiunta di (X, Y) è

$x \backslash y$	0	1	$p_X(x)$
0	$(1-p)^2$	0	$(1-p)^2$
1	$2p(1-p)$	p^2	$1 - (1-p)^2$
$p_Y(y)$	$1 - p^2$	p^2	1

(ii) Richiedendo che risulti $p(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$ per $x, y = 0, 1$ si trae che le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti per $p = 0$ e per $p = 1$.

(iii) Risulta

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = p^2 - [1 - (1-p)^2] \cdot p^2 = p^2(1-p)^2,$$

$$Var(X) = (1-p)^2[1 - (1-p)^2], \quad Var(Y) = p^2(1-p^2),$$

e pertanto

$$R_1(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{Var(X)} = \frac{p^2}{1 - (1-p)^2}, \quad R_2(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{Var(Y)} = 1.$$

Poiché risulta

$$\frac{d}{dp} R_1(X, Y) = \frac{2p^2}{[1 - (1-p)^2]^2} \geq 0, \quad \frac{d}{dp} R_2(X, Y) = 0,$$

segue che $R_1(X, Y)$ è crescente per $p \in [0, 1]$, e pertanto raggiunge il massimo per $p = 1$, mentre $R_2(X, Y)$ è costante per $p \in [0, 1]$.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 13/9/2013

Esercizio 1 Si considerino gli eventi $U = \{\text{la sorgente d'informazione genera } \mathbf{1}\}$ ed $R = \{\text{il decodificatore registra } \mathbf{1}\}$.

(i) Dalla formula di Bayes segue:

$$P(U|R) = \frac{P(R|U) P(U)}{P(R|U) P(U) + P(R|\bar{U}) P(\bar{U})} = \frac{0,8 \cdot 0,15}{0,8 \cdot 0,15 + 0,2 \cdot 0,85} = \frac{0,12}{0,12 + 0,17} = 0,4138.$$

(ii) Posto $A = \{\text{in tre invii indipendenti il segnale generato è sempre lo stesso}\}$, si ha che

$$P(A) = P(\mathbf{111}) + P(\mathbf{000}) = (0,85)^3 + (0,15)^3 = 0,6175.$$

Esercizio 2 (i) Risulta

$$F(q) = \frac{1}{4} \iff q = 1.$$

(ii) Si ha che

$$P(X > 1) = 1 - F(1) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4},$$

$$P(X \geq 2) = 1 - F(2^-) = 1 - \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P(1 < X < 2 | X > 1) = \frac{P(1 < X < 2)}{P(X > 1)} = \frac{F(2^-) - F(1)}{1 - F(1)} = \frac{\frac{2}{4} - \frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

(iii)

$$E(X) = \int_0^2 \left(1 - \frac{x}{4}\right) dx = \left[x - \frac{x^2}{8}\right]_0^2 = 2 - \frac{4}{8} = \frac{3}{2}.$$

Esercizio 3 (i) Essendo

gioco	moneta	dado	X	Y	P
\mathcal{G}	testa	numero pari	1	1	1/4
\mathcal{G}	testa	numero dispari	-1	-1	1/4
\mathcal{H}	croce	numero pari	-1	1	1/4
\mathcal{H}	croce	numero dispari	1	-1	1/4

la distribuzione di probabilità congiunta di (X, Y) è data da

$x \backslash y$	-1	1	$p_X(x)$
-1	1/4	1/4	1/2
1	1/4	1/4	1/2
$p_Y(y)$	1/2	1/2	1

Inoltre, risultando $p(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$ per $x, y = -1, 1$, le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti.

- (ii) Si ricava facilmente che $E(X) = E(Y) = 0$, $Var(X) = E(X^2) = Var(Y) = E(Y^2) = 1$.
(iii) Risulta

$$P(Z = z | X = x) = \frac{P(Z = z, X = x)}{P(X = x)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, \quad \forall x, z,$$

quindi le variabili Z e X sono indipendenti. Analogamente

$$P(Z = z | Y = y) = \frac{P(Z = z, Y = y)}{P(Y = y)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, \quad \forall y, z,$$

pertanto anche le variabili Z ed Y sono indipendenti. Inoltre

$$P(Z = 1 | X = 1, Y = 1) = \frac{P(Z = 1, X = 1, Y = 1)}{P(X = 1, Y = 1)} = \frac{1/4}{1/4} = 1,$$

e quindi la variabile Z ed il vettore (X, Y) non sono indipendenti, essendo $P(Z = 1) = 1/2$.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 9/1/2014 – ore 9

Esercizio 1 Consideriamo gli eventi $T_k = \{k \text{ dei dadi lanciati sono truccati}\}$ ($k = 0, 1, 2$) e $V = \{\text{si realizza una vincita, ossia la somma dei 2 dadi è } 7\}$.

(i) Risulta

$$P(V|T_0) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad P(V|T_1) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad P(V|T_2) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6},$$

con riferimento alle seguenti sequenze nei 3 casi:

se vale $T_0 : (1, 6); (2, 5); (3, 4); (4, 3); (5, 2); (6, 1)$,

se vale $T_1 : (1, 6); (2, 5); (3, 4); (4, 3); (5, 2); (5', 2)$,

se vale $T_2 : (2, 5); (2, 5'); (3, 4); (4, 3); (5, 2); (5', 2)$.

(ii) Per la formula delle alternative si ha

$$P(V) = P(V|T_0)P(T_0) + P(V|T_1)P(T_1) + P(V|T_2)P(T_2) = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{6} + \frac{4}{6} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{6},$$

essendo

$$P(T_k) = \frac{\binom{2}{k} \binom{2}{2-k}}{\binom{4}{2}}, \quad k = 0, 1, 2.$$

(iii) Si ha infine (notiamo che T_1 e V sono indipendenti):

$$P(T_1|V) = \frac{P(V|T_1)P(T_1)}{P(V)} = P(T_1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Esercizio 2 Ponendo $E_j = \{\text{nel modulo } j\text{-esimo è presente un errore}\}$, $j = 1, 2$, risulta:

$$P(X = 0) = P(\overline{E}_1 \cap \overline{E}_2) = P(\overline{E}_1)P(\overline{E}_2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 1) = P(E_1 \cap \overline{E}_2) + P(\overline{E}_1 \cap E_2) = P(E_1)P(\overline{E}_2) + P(\overline{E}_1)P(E_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{12},$$

$$P(X = 2) = P(E_1 \cap E_2) = P(E_1)P(E_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}.$$

(i) Quindi

$$F(x) = 0 \text{ per } x < 0,$$

$$F(x) = 1/2 \text{ per } 0 \leq x < 1,$$

$$F(x) = 11/12 \text{ per } 1 \leq x < 2,$$

$$F(x) = 1 \text{ per } x \geq 2.$$

(ii) Si ha:

$$\mu = E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{5}{12} + 2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{7}{12} = 0,5833, \quad E(X^2) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{5}{12} + 4 \cdot \frac{1}{12} = \frac{3}{4},$$

$$\sigma^2 = Var(X) = E(X^2) - \mu^2 = \frac{3}{4} - \frac{49}{144} = \frac{59}{144} = 0,4097, \quad \sigma = \sqrt{0,4097} = 0,6401.$$

(iii) Pertanto:

$$P(|X - \mu| \leq \sigma) = P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = P(-0,0568 \leq X \leq 1,2234) = \frac{11}{12} = 0,9167.$$

Esercizio 3 Si ha

ω	$X(\omega)$	$Y(\omega)$	ω	$X(\omega)$	$Y(\omega)$
1 2 3 4	4	4	3 1 2 4	1	2
1 2 4 3	2	2	3 1 4 2	0	2
1 3 2 4	2	2	3 2 1 4	2	4
1 3 4 2	1	2	3 2 4 1	1	2
1 4 2 3	1	2	3 4 1 2	0	4
1 4 3 2	2	4	3 4 2 1	0	2
2 1 3 4	2	2	4 1 2 3	0	0
2 1 4 3	0	0	4 1 3 2	1	2
2 3 1 4	1	2	4 2 1 3	1	2
2 3 4 1	0	0	4 2 3 1	2	2
2 4 1 3	0	2	4 3 2 1	0	0
2 4 3 1	1	2	4 3 1 2	0	2

(i) Pertanto la densità discreta di (X, Y) è:

$x \backslash y$	0	2	4	$p_X(x)$
0	$\frac{4}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{9}{24}$
1	0	$\frac{8}{24}$	0	$\frac{8}{24}$
2	0	$\frac{4}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{6}{24}$
4	0	0	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
$p_Y(y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

(ii) Si ha $p(0, 0) = \frac{1}{6} \neq p_X(0)p_Y(0)$; quindi X e Y non sono indipendenti.

(iii) Si ricava facilmente:

$$E(X) = 1, \quad E(Y) = 2, \quad E(X \cdot Y) = \frac{8}{3},$$

e quindi

$$Cov(X, Y) = \frac{2}{3}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 9/1/2014 – ore 12

Esercizio 1

Considerato l'evento $A_k = \{\text{Il } k\text{-esimo studente chiamato estrae la commissione } \mathbf{A}\}$ ($k = 1, 2, 3$), risulta

(i)

$$\begin{aligned} P(A_3) &= P(A_3 | A_1 \cap A_2)P(A_2 | A_1)P(A_1) + P(A_3 | A_1 \cap \bar{A}_2)P(\bar{A}_2 | A_1)P(A_1) \\ &\quad + P(A_3 | \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(\bar{A}_1) + P(A_3 | \bar{A}_1 \cap A_2)P(A_2 | \bar{A}_1)P(\bar{A}_1) \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{10} + \frac{4}{8} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{10} + \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{10} + \frac{4}{8} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{10} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(ii)

$$P(A_1 \cup A_2 | \bar{A}_3) = \frac{P(A_1 \cap \bar{A}_3) + P(A_2 \cap \bar{A}_3) - P(A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3)}{P(\bar{A}_3)} = \frac{\frac{5}{18} + \frac{5}{18} - \frac{5}{36}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{18} = \frac{5}{6},$$

essendo

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap \bar{A}_3) &= P(A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) + P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) \\ &= P(\bar{A}_3 | A_2 \cap A_1)P(A_2 | A_1)P(A_1) + P(\bar{A}_3 | \bar{A}_2 \cap A_1)P(\bar{A}_2 | A_1)P(A_1) \\ &= \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{10} + \frac{4}{8} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{10} = \frac{5}{18}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A_2 \cap \bar{A}_3) &= P(A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) \\ &= P(\bar{A}_3 | A_2 \cap A_1)P(A_2 | A_1)P(A_1) + P(\bar{A}_3 | A_2 \cap \bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1)P(\bar{A}_1) \\ &= \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{10} + \frac{4}{8} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{10} = \frac{5}{18}, \end{aligned}$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) = P(\bar{A}_3 | A_2 \cap A_1)P(A_2 | A_1)P(A_1) = \frac{5}{36}.$$

Esercizio 2

(i) Si ha che

$$P(X = 0) = P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) = \left(1 - \frac{1}{6}\right) \left(1 - \frac{2}{6}\right) \left(1 - \frac{3}{6}\right) = \frac{5}{18},$$

$$P(X = 1) = P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) = \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{17}{36},$$

$$P(X = 2) = P(A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{9},$$

$$P(X = 3) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{1}{36}.$$

(ii) Risulta

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ \frac{5}{18} & 0 \leq x < 1, \\ \frac{27}{36} & 1 \leq x < 2, \\ \frac{35}{36} & 2 \leq x < 3, \\ 1 & x \geq 3. \end{cases}$$

(iii)

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{5}{18} = \frac{13}{18}.$$

(iv)

$$E(X) = 1 \cdot \frac{17}{36} + 2 \cdot \frac{2}{9} + 3 \cdot \frac{1}{36} = 1.$$

(v) Nell'ipotesi in cui ciascuna delle tre linee sia attiva con probabilità $1/6$, la variabile aleatoria X ha distribuzione binomiale, con $P(X = x) = \binom{3}{x}(1/6)^x(5/6)^{3-x}$ per $x = 0, 1, 2, 3$.

Esercizio 3

(i) Deve essere $p \geq 0$ e

$$p + \frac{p}{2} + \frac{p}{2} + \frac{p}{2} + 2p + 2p + 2p + p + \frac{p}{2} = 1,$$

da cui si deduce $p = 0,1$. Quindi per la distribuzione congiunta e le distribuzioni marginali si ottiene

$x \backslash y$	0	1	2	$p_X(x)$
0	0,1	0,05	0,05	0,2
1	0,05	0,2	0,2	0,45
2	0,2	0,1	0,05	0,35
$p_Y(y)$	0,35	0,35	0,3	1

(ii) Si ha $p(0, 0) = 0,1 \neq p_X(0)p_Y(0) = 0,07$, quindi X e Y non sono indipendenti;

(iii) Risulta

$$E(XY) = 0,2 + 2 \cdot 0,2 + 20,1 + 40,05 = 1,$$

$$E(X) = 0,45 + 0,7 = 1,15, \quad E(Y) = 0,35 + 0,6 = 0,95,$$

e pertanto

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 1 - 1,0925 = -0,0925.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 23/1/2014

Esercizio 1 Indichiamo con C_k l'evento che si realizza quando k computer sono funzionanti. Dalle ipotesi segue che C_k ha probabilità binomiale di parametri $n = 10$ e $p = 4/5$, e quindi

$$P(C_k) = \binom{10}{k} \left(\frac{4}{5}\right)^k \left(\frac{1}{5}\right)^{10-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 10.$$

(i) La probabilità che tutti gli operatori tranne uno possono accedere ad un computer funzionante vale pertanto

$$P(C_7) = \binom{10}{7} \left(\frac{4}{5}\right)^7 \left(\frac{1}{5}\right)^3 = 0,2013.$$

(ii) La probabilità che tutti gli operatori possono accedere ad un computer funzionante è

$$P(T) \equiv P(C_8 \cup C_9 \cup C_{10}) = \sum_{k=8}^{10} \binom{10}{k} \left(\frac{4}{5}\right)^k \left(\frac{1}{5}\right)^{10-k} = 0,6778.$$

(iii) Pertanto si ha

$$P(C_8 | T) = \frac{P(C_8)}{P(T)} = \frac{0,302}{0,6778} = 0,4455; \quad P(C_9 | T) = \frac{P(C_9)}{P(T)} = \frac{0,2684}{0,6778} = 0,396;$$

$$P(C_{10} | T) = \frac{P(C_{10})}{P(T)} = \frac{0,1074}{0,6778} = 0,1584.$$

Esercizio 2 (i) Per determinare la costante c calcoliamo l'integrale della densità di probabilità di X :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= c \int_0^2 |x-1| dx = c \left[\int_0^1 (-x+1) dx + \int_1^2 (x-1) dx \right] \\ &= c \left[\left(-\frac{x^2}{2} + x \right)_0^1 + \left(\frac{x^2}{2} - x \right)_1^2 \right] = c \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right] = c, \end{aligned}$$

pertanto $c = 1$.

(ii) Essendo $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, si ha $F(x) = 0$ per $x < 0$;

$$F(x) = \int_0^x (-t+1) dt = x - \frac{x^2}{2} \quad \text{per } 0 \leq x < 1;$$

$$F(x) = \int_0^1 (-t+1) dt + \int_1^x (t-1) dt = \frac{1}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} - x + 1 = \frac{x^2}{2} - x + 1 \quad \text{per } 1 \leq x < 2;$$

$F(x) = 1$ per $x \geq 2$.

(iii) Risulta

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x(-x+1) dx + \int_1^2 x(x-1) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right)_0^1 + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right)_1^2$$

$$= -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1.$$

(iv) Quindi

$$P(X > 1/2 | X \leq 3/2) = \frac{F(3/2) - F(1/2)}{F(3/2)} = 1 - \frac{3/8}{5/8} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

(v) Se Y è una variabile aleatoria normale avente lo stesso valore medio di X , ossia $E(Y) = 1$, e tale che $Var(Y) = 4$, si ha

$$\begin{aligned} P(Y > 1/2 | Y \leq 3/2) &= 1 - \frac{F_Y(1/2)}{F_Y(3/2)} = 1 - \frac{\Phi\left(\frac{1/2-1}{2}\right)}{\Phi\left(\frac{3/2-1}{2}\right)} = 1 - \frac{\Phi(-0,25)}{\Phi(0,25)} = 1 - \frac{1 - \Phi(0,25)}{\Phi(0,25)} \\ &= 1 - \frac{1 - 0,5987}{0,5987} = 1 - \frac{0,4013}{0,5987} = 0,3297, \end{aligned}$$

essendo

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(\frac{Y-1}{2} \leq \frac{y-1}{2}\right) = P\left(Z \leq \frac{y-1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{y-1}{2}\right),$$

con $Z = (Y - 1)/2$ variabile normale standard.

Esercizio 3 I valori di X e Y sono

bit selezionati	bit non sel.	X	Y
1 1 1	0 0	3	1
1 1 0	1 0	2	0
1 1 0	0 1	2	0
1 0 1	1 0	2	0
1 0 1	0 1	2	0
1 0 0	1 1	1	1
0 1 1	1 0	2	0
0 1 1	0 1	2	0
0 1 0	1 1	1	1
0 0 1	1 1	1	1

(i) Quindi la densità discreta di (X, Y) è

$$p(1, 1) = \frac{3}{10}, \quad p(2, 0) = \frac{3}{5}, \quad p(3, 1) = \frac{1}{10}.$$

(ii) X e Y non sono indipendenti, essendo

$$p(1, 0) = 0 \neq \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{5} = p_X(1) p_Y(0).$$

Inoltre risulta $Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = \frac{3}{5} - \frac{9}{5} \cdot \frac{2}{5} = -\frac{3}{25}$.

(iii) Le distribuzioni condizionate e le medie condizionate sono:

$$p_{X|Y}(2 | 0) = 1; \quad E(X | Y = 0) = 2;$$

$$p_{X|Y}(1 | 1) = \frac{3}{4}, \quad p_{X|Y}(3 | 1) = \frac{1}{4}; \quad E(X | Y = 1) = \frac{3}{2}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 13/2/2014

Esercizio 1 Sia $T_i = \{\text{esce testa al lancio } i\text{-esimo}\}$ ($i = 1, 2, 3$), con $P(T_1) = P(T_2) = 1/2$ e $P(T_3) = 1/3$.

(i) Si ha quindi, per l'indipendenza:

$$P(\bar{A}) = P(\bar{T}_1 \cap \bar{T}_2 \cap \bar{T}_3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6},$$

$$P(\bar{B}) = P(T_1 \cap T_2) + P(\bar{T}_1 \cap \bar{T}_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Pertanto, si ricava $P(\bar{A}) + P(\bar{B}) \leq 1$.

(ii) Gli eventi A e B non sono indipendenti in quanto risulta

$$P(A \cap B) = P(T_1 \cap T_2) + P(\bar{T}_1 \cap \bar{T}_2 \cap T_3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \neq P(A)P(B).$$

(iii) Si ha $P(B | A) \neq P(A \cup B)$ poiché

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/3}{5/6} = \frac{2}{5},$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = 1.$$

(iv) Risulta $P(A | B) \neq 1 - P(A | \bar{B})$, essendo

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3};$$

$$P(A | \bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(T_1 \cap \bar{T}_2) + P(\bar{T}_1 \cap T_2)}{P(\bar{B})} = \frac{1/2}{1/2} = 1.$$

Esercizio 2 Risulta

$$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{2} \binom{2}{0}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{10}, \quad P(X = 2) = \frac{\binom{3}{0} \binom{2}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{10},$$

$$P(X = -1) = 1 - P(X = 1) - P(X = 2) = \frac{3}{5}.$$

(i) Pertanto

$F(x) = 0$, per $x < -1$,

$F(x) = 3/5$, per $-1 \leq x < 1$,

$F(x) = 9/10$, per $1 \leq x < 2$,

$F(x) = 1$, per $x \geq 2$.

(ii) Si ha:

$$E(X) = -\frac{3}{5} + \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = -\frac{1}{10}, \quad E(X^2) = \frac{3}{5} + \frac{3}{10} + \frac{2}{5} = \frac{13}{10},$$

e pertanto

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{13}{10} - \frac{1}{100} = \frac{129}{100} = 1,29.$$

(iii) Risulta:

$$P(X > 1 | X \geq 0) = \frac{P(X > 1)}{P(X \geq 0)} = \frac{1 - F(1)}{1 - F(0^-)} = \frac{1/10}{2/5} = \frac{1}{4}.$$

(iv) Poiché Y ha distribuzione normale di media $E(Y) = -1/10$ e varianza $Var(Y) = 9$, si ha

$$\begin{aligned} P(Y > 1 | Y \geq 0) &= \frac{P(Y > 1)}{P(Y \geq 0)} = \frac{P(Z > 11/30)}{P(Z \geq 1/30)} = \frac{P(Z > 11/30)}{P(Z \geq 1/30)} = \frac{1 - \Phi(0,37)}{1 - \Phi(0,03)} \\ &= \frac{1 - 0,6443}{1 - 0,5120} = \frac{0,3557}{0,4880} = 0,7289. \end{aligned}$$

dove $Z = (Y + 1/10)/3$ ha distribuzione normale standard.

Esercizio 3 (i) Imponendo che sia $p(x, y) \geq 0$ e $\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p(x, y) = 1$, si ha

$$c + \frac{c}{2} + 2c + c = c \frac{9}{2} \quad \implies \quad c = \frac{2}{9}$$

pertanto la distribuzione congiunta di (X, Y) è

$x \setminus y$	1	2	$p_X(x)$
1	2/9	1/9	1/3
2	4/9	2/9	2/3
$p_Y(y)$	2/3	1/3	1

(ii) Si verifica facilmente che $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ per ogni $x, y = 1, 2$; pertanto X e Y sono indipendenti. X e Y non sono identicamente distribuite perché $p_X(w) \neq p_Y(w)$ per $w = 1, 2$.

(iii) Si ha:

$$E(X - Y) = E(X) - E(Y) = \frac{5}{3} - \frac{4}{3} = \frac{1}{3}, \quad Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4}{9},$$

essendo

$$E(X) = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}, \quad E(X^2) = \frac{1}{3} + \frac{8}{3} = 3, \quad Var(X) = 3 - \frac{25}{9} = \frac{2}{9},$$

$$E(Y) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}, \quad E(Y^2) = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2, \quad Var(Y) = 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}.$$

(iv) Risulta

$$P(X = 1 | X + Y = 3) = \frac{p(1, 2)}{p(1, 2) + p(2, 1)} = \frac{1/9}{5/9} = \frac{1}{5}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

(16/4/2014)

Esercizio 1 Sia $S = \{\text{il messaggio è spam}\}$, $E = \{\text{il messaggio è valutato come spam}\}$.

(i) $P(E) = P(E|S)P(S) + P(E|\bar{S})P(\bar{S}) = 0,8 \cdot 0,6 + 0,3 \cdot 0,4 = 0,6$.

(ii) $P(S|E) = P(E|S)P(S)/P(E) = (0,8 \cdot 0,6)/0,6 = 0,8$.

(iii) $P(S|\bar{E}) = P(\bar{E}|S)P(S)/P(\bar{E}) = (0,2 \cdot 0,6)/0,4 = 0,3$.

Esercizio 2 (i) Per determinare la costante c calcoliamo l'integrale della densità di probabilità di X :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = c \int_0^2 (x-1)^2 dx = c \left[\frac{(x-1)^3}{3} \right]_0^2 = c \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right] = c \cdot \frac{2}{3},$$

pertanto $c = 3/2$.

(ii) Essendo $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, si ha $F(x) = 0$ per $x < 0$;

$$F(x) = \frac{3}{2} \int_0^x (t-1)^2 dt = \frac{3}{2} \left[\frac{(t-1)^3}{3} \right]_0^x = \frac{(x-1)^3 + 1}{2} = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x}{2} \quad \text{per } 0 \leq x < 2;$$

$F(x) = 1$ per $x \geq 2$.

(iii) Risulta

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^2 x \frac{3(x-1)^2}{2} dx = \frac{3}{2} \int_0^2 (x^3 - 2x^2 + x) dx \\ &= \frac{3}{2} \left(\frac{x^4}{4} - 2\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right)_0^2 = \frac{3}{2} \left(4 - \frac{16}{3} + 2 \right) = 1. \end{aligned}$$

(iv) Quindi si ha

$$P(X \leq 3/2 | X > 1/2) = \frac{F(3/2) - F(1/2)}{1 - F(1/2)} = \frac{2/16}{9/16} = \frac{2}{9} = 0, \bar{2}.$$

(v) Se Y è una variabile aleatoria normale avente lo stesso valore medio di X , ossia $E(Y) = 1$, e tale che $Var(Y) = 4$, si ha

$$\begin{aligned} P(Y \leq 3/2 | Y > 1/2) &= \frac{F_Y(3/2) - F_Y(1/2)}{1 - F_Y(1/2)} = \frac{\Phi\left(\frac{3/2-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{1/2-1}{2}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{1/2-1}{2}\right)} = \frac{\Phi(0,25) - \Phi(-0,25)}{1 - \Phi(-0,25)} \\ &= \frac{0,5987 - (1 - 0,5987)}{1 - (1 - 0,5987)} = \frac{0,1974}{0,5987} = 0,3297 \end{aligned}$$

poiché, con $Z = (Y - 1)/2$ variabile aleatoria normale standard, risulta

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(\frac{Y-1}{2} \leq \frac{y-1}{2}\right) = P\left(Z \leq \frac{y-1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{y-1}{2}\right).$$

Esercizio 3 (i) Imponendo $p(x, y) \geq 0$ si ha $(1/2) - p \geq 0$ e $p \geq 0$; inoltre $\sum_{x,y} p(x, y) = 1$ per ogni p , da cui segue $0 \leq p \leq 1/2$.

(ii) Le densità marginali di X e di Y si ottengono dalla tabella:

$x \backslash y$	0	1	2	$p_X(x)$
0	$(1/2) - p$	$1/8$	0	$(5/8) - p$
1	$1/8$	p	$1/8$	$(1/4) + p$
2	0	$1/8$	0	$1/8$
$p_Y(y)$	$(5/8) - p$	$(1/4) + p$	$1/8$	1

(iii) X e Y non sono indipendenti, in quanto $p(2, 2) = 0 \neq p_X(2) p_Y(2) = 1/64$.

(iv) Risulta $E(X) = E(Y) = 1/2 + p$ e $E(X \cdot Y) = 1/2 + p$, da cui segue

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = 1/2 + p - (1/2 + p)^2 = \frac{1}{4} - p^2.$$

Poiché

$$\frac{d}{dp} Cov(X, Y) = \frac{d}{dp} \left(\frac{1}{4} - p^2 \right) = -2p,$$

la covarianza è decrescente per $0 \leq p \leq 1/2$. Quindi la covarianza è massima per $p = 0$, con $Cov(X, Y)|_{p=0} = 1/4$, ed è minima per $p = 1/2$, con $Cov(X, Y)|_{p=1/2} = 0$.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 23/6/2014 – ore 12

Esercizio 1 (i) Risulta $S = \{(x_1, x_2, x_3), x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, x_i \neq x_j, i \neq j\}$ e $|S| = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

(ii) Si ha che

$$P(A) = \frac{\binom{5}{3}}{60} = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{6}{60} = \frac{1}{10}, \quad P(C) = \frac{6}{60} = \frac{1}{10}.$$

Inoltre

$$P(A \cap B) = \frac{1}{60}, \quad P(A \cap C) = \frac{1}{60}, \quad P(B \cap C) = 0, \quad P(A \cap B \cap C) = 0.$$

Quindi

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A) \cdot P(B), \\ P(A \cap C) &= P(A) \cdot P(C), \\ P(B \cap C) &\neq P(B) \cdot P(C), \\ P(A \cap B \cap C) &\neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(C), \end{aligned}$$

e pertanto i tre eventi non sono indipendenti.

(iii) Essendo $P(A \cap B) = \frac{1}{60} \neq 0$ la relazione $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ non vale. Essendo $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) = P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - 1 + P(A \cap B)$, la relazione $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A}) + P(\overline{B})$ non è valida, in quanto $P(A \cap B) = \frac{1}{60} \neq 1$. Infine $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B) = \frac{1/60}{1/10} = \frac{1}{6} \neq P(B)$.

Esercizio 2 (i) Se X ha distribuzione esponenziale di media $\mu = 2$, risulta $\lambda = 1/2$ e pertanto

$$P(X > 1) = 1 - F_X(1) = 1 - (1 - e^{-\lambda}) = e^{-1/2}.$$

Inoltre, per la proprietà di assenza di memoria,

$$P(X > 2 | X > 1) = P(X > 1) = e^{-1/2}.$$

(ii) Se X ha distribuzione normale di media $\mu = 2$, e varianza $\sigma^2 = 4$, risulta

$$P(X > 1) = P\left(\frac{X - 2}{2} > \frac{1 - 2}{2}\right) = P(Z > -1/2) = 1 - \Phi(-1/2) = \Phi(1/2) = 0,6915,$$

e

$$P(X > 2 | X > 1) = \frac{P(X > 2)}{P(X > 1)} = \frac{P(Z > 0)}{\Phi(1/2)} = \frac{1 - \Phi(0)}{\Phi(1/2)} = \frac{0,5}{0,6915} = 0,723.$$

Esercizio 3 Si ha

ω	$X(\omega)$	$Y(\omega)$	$P(\{\omega\})$
ttt	3	0	1/12
ttc	2	1	2/12
tct	2	2	1/12
tcc	1	1	2/12
ctt	2	1	1/12
ctc	1	2	2/12
cct	1	1	1/12
ccc	0	0	2/12

e pertanto la densità discreta di (X, Y) è:

$x \backslash y$	0	1	2	$p_X(x)$
0	$\frac{2}{12}$	0	0	$\frac{2}{12}$
1	0	$\frac{3}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{5}{12}$
2	0	$\frac{3}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{4}{12}$
3	$\frac{1}{12}$	0	0	$\frac{1}{12}$
$p_Y(y)$	$\frac{3}{12}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{3}{12}$	1

(ii) Si ha $p(0, 1) = 0 \neq p_X(0)p_Y(1)$; quindi X e Y non sono indipendenti.

(iii) Si ricava facilmente:

$$E(X) = \frac{5 + 8 + 3}{12} = \frac{4}{3}, \quad E(Y) = \frac{6 + 6}{12} = 1, \quad E(X \cdot Y) = \frac{3 + 4 + 6 + 4}{12} = \frac{17}{12},$$

e quindi

$$Cov(X, Y) = \frac{17}{12} - \frac{4}{3} \cdot 1 = \frac{1}{12}.$$

(iv) Essendo

$$P(X = x | Y = 0) = \frac{p(x, 0)}{p_Y(0)},$$

risulta

$$P(X = 0 | Y = 0) = \frac{2/12}{3/12} = \frac{2}{3}, \quad P(X = 1 | Y = 0) = 0,$$

e

$$P(X = 2 | Y = 0) = 0, \quad P(X = 3 | Y = 0) = \frac{1/12}{3/12} = \frac{1}{3}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 9/7/2014

Esercizio 1 (i) Poichè gli eventi A_1 , A_2 e A_3 sono indipendenti, e risulta

$$P(A_1) = \frac{5}{8}, \quad P(A_2) = \frac{3}{4}, \quad P(A_3) = \frac{7}{8},$$

usando la formula di De Morgan si ha

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) = 1 - \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{8} = 1 - \frac{3}{256} = \frac{253}{256} = 0,9883.$$

(ii) Si ha

$$P(A_1|A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \frac{P(A_1)}{P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)} = \frac{5/8}{253/256} = \frac{160}{253} = 0,6324.$$

(iii) Si ha

$$\begin{aligned} P(\overline{A_3}|A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= 1 - P(A_3|A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - \frac{P(A_3)}{P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)} \\ &= 1 - \frac{7/8}{253/256} = 1 - \frac{224}{253} = 0,1146. \end{aligned}$$

(iii) $A_1 \cap A_2$ e $A_2 \cup A_3$ non sono eventi indipendenti, essendo

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{32} = 0,4687$$

$$P(A_2 \cup A_3) = P(A_2) + P(A_3) - P(A_2)P(A_3) = \frac{3}{4} + \frac{7}{8} - \frac{3}{4} \cdot \frac{7}{8} = \frac{31}{32} = 0,9687$$

$$P((A_1 \cap A_2) \cap (A_2 \cup A_3)) = P((A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap A_2 \cap A_3)) = P(A_1 \cap A_2) = 0,4687$$

Esercizio 2 (i) Si ha

ω	$X(\omega)$	ω	$X(\omega)$
0 0 0 0	4	1 0 0 0	3
0 0 0 1	3	1 0 0 1	2
0 0 1 0	2	1 0 1 0	1
0 0 1 1	2	1 0 1 1	2
0 1 0 0	2	1 1 0 0	2
0 1 0 1	1	1 1 0 1	2
0 1 1 0	2	1 1 1 0	3
0 1 1 1	3	1 1 1 1	4

e quindi $p(1) = \frac{1}{8}$, $p(2) = \frac{1}{2}$, $p(3) = \frac{1}{4}$, $p(4) = \frac{1}{8}$.

(ii) Pertanto,

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{19}{8} = 2,375$$

$$E(X^2) = 1 \cdot \frac{1}{8} + 4 \cdot \frac{1}{2} + 9 \cdot \frac{1}{4} + 16 \cdot \frac{1}{8} = \frac{51}{8} = 6,375$$

e quindi

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{51}{8} - \left(\frac{19}{8}\right)^2 = \frac{47}{64} = 0,7344.$$

(iii) Risulta $E(X) > H(X)$ poiché, ricordando che $\log_2 2^k = k$, si ha

$$H(X) = \sum_{x=1}^4 p(x) \log_2 \frac{1}{p(x)} = \frac{1}{8} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 = \frac{7}{4} = 1,75$$

Esercizio 3 (i) Poiché X e Y sono variabili aleatorie indipendenti si ha

$$P(X - X^2 > 0, Y - Y^2 > 0) = P(0 < X < 1) \cdot P(0 < Y < 1)$$

$$= P(0 - 1 < X - 1 < 1 - 1) \cdot P\left(\frac{0+1}{2} < \frac{Y+1}{2} < \frac{1+1}{2}\right)$$

$$= P(-1 < Z_1 < 0) \cdot P(0,5 < Z_2 < 1) = [\Phi(0) - \Phi(-1)][\Phi(1) - \Phi(0,5)]$$

$$= [\Phi(1) - \Phi(0)][\Phi(1) - \Phi(0,5)] = (0,8413 - 0,5)(0,8413 - 0,6915) = 0,3413 \cdot 0,1498 = 0,0511$$

essendo $Z_1 = X - 1$ e $Z_2 = \frac{Y+1}{2}$ variabili normali standard indipendenti.

(ii) Poiché $Z = X + Y$, si ha

$$E(Z) = E(X) + E(Y) = 1 - 1 = 0,$$

$$Var(Z) = Var(X) + Var(Y) = 1 + 4 = 5,$$

e

$$Cov(Z, X) = Cov(X + Y, X) = Var(X) + Cov(Y, X) = Var(X) = 1,$$

essendo X e Y indipendenti.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 4/9/2014

Esercizio 1 (i) La scelta a caso di una coppia di archi da un insieme di cardinalità 6 si può effettuare in $\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$ modi, quindi lo spazio campionario ha cardinalità 15.

(ii) Essendo $C_k = \{\text{almeno uno dei 2 archi scelti è connesso al nodo } N_k\}$, si ha

$$P(C_1) = 1 - \frac{\binom{5}{2}}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}, \quad P(C_2) = 1 - \frac{\binom{2}{2}}{15} = \frac{14}{15}, \quad P(C_3) = 1 - \frac{\binom{4}{2}}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5},$$
$$P(C_4) = 1 - \frac{\binom{4}{2}}{15} = \frac{9}{15}, \quad P(C_5) = 1 - \frac{\binom{3}{2}}{15} = \frac{12}{15}.$$

(iii) Si ha

$$P(C_1 \cap C_2) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} \neq P(C_1)P(C_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{14}{15},$$
$$P(C_1 \cap C_3) = \frac{2}{15} \neq P(C_1)P(C_3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5},$$

quindi non sussiste indipendenza.

(iv) Per grafi qualsiasi aventi n archi, indicando con g_k il grado del nodo N_k , si ha

$$P(C_k) = 1 - \frac{\binom{n-g_k}{2}}{\binom{n}{2}} = 1 - \frac{(n-g_k)(n-g_k-1)}{n(n-1)}.$$

Esercizio 2 (i) Poiché X ha densità di probabilità

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (x+1), & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

si ha

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = c \int_{-1}^1 (x+1) dx = c \left(\frac{x^2}{2} + x \right)_{-1}^1 = c \left(\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} - (-1) \right) = 2c,$$

e quindi $c = 1/2$.

(ii) La funzione di distribuzione è data da $F(x) = 0$ per $x < -1$;

$$F(x) = \frac{1}{2} \int_{-1}^x (t+1) dt = \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{2} + t \right)_{-1}^x = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{2} - (-1) \right) = \frac{(x+1)^2}{4}$$

per $-1 \leq x < 1$, e $F(x) = 1$ per $x \geq 1$.

(iii) Si ha

$$P(X > 0 | X \leq 1/2) = \frac{P(0 < X \leq 1/2)}{P(X \leq 1/2)} = \frac{F(1/2) - F(0)}{F(1/2)} = \frac{5}{9} = 0,5555.$$

(iv) Per $n = 1, 2, \dots$ i momenti sono:

$$E(X^n) = \int_{-1}^1 x^n \frac{(x+1)}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{x^{n+2}}{n+2} + \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - (-1)^{n+2}}{n+2} + \frac{1 - (-1)^{n+1}}{n+1} \right)$$

quindi $E(X^n) = \frac{1}{n+1}$ per n pari, e $E(X^n) = \frac{1}{n+2}$ per n dispari.

Esercizio 3 (i) I valori assunti da (X, Y) sono:

1° estr. \ 2° estr.	1	2	3	4	5
1	(1,2)	(1,1)	(1,2)	(1,1)	(1,2)
2	(1,1)	(2,0)	(2,1)	(2,0)	(2,1)
3	(1,2)	(2,1)	(3,2)	(3,1)	(3,2)
4	(1,1)	(2,0)	(3,1)	(4,0)	(4,1)
5	(1,2)	(2,1)	(3,2)	(4,1)	(5,2)

quindi la distribuzione congiunta è:

$x \backslash y$	0	1	2	$p_X(x)$
1	0	4/25	5/25	9/25
2	3/25	4/25	0	7/25
3	0	2/25	3/25	5/25
4	1/25	2/25	0	3/25
5	0	0	1/25	1/25
$p_Y(y)$	4/25	12/25	9/25	1

(ii) La densità di probabilità condizionata $p(x|2) = P(X = x|Y = 2) = \frac{p(x,2)}{p_Y(2)}$ è data da

$$p(1|2) = \frac{5}{9}, \quad p(3|2) = \frac{3}{9}, \quad p(5|2) = \frac{1}{9}, \quad p(x|2) = 0 \quad \text{altrimenti,}$$

quindi la media condizionata è

$$E(X|Y = 2) = 1 \cdot \frac{5}{9} + 3 \cdot \frac{3}{9} + 5 \cdot \frac{1}{9} = \frac{19}{9} = 2, \bar{1}.$$

(iii) Per calcolare il coefficiente di correlazione di (X, Y) notiamo che

$$E(X) = \frac{9 + 14 + 15 + 12 + 5}{25} = \frac{55}{25} = 2,2 \quad E(Y) = \frac{30}{25} = 1,2$$

$$E(X \cdot Y) = \frac{4 + 10 + 8 + 6 + 18 + 8 + 10}{25} = \frac{64}{25} = 2,56.$$

Pertanto si ha

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y) = 2,56 - 2,2 \cdot 1,2 = -0,08 < 0$$

da cui segue che X e Y sono negativamente correlate.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 14/11/2014

Esercizio 1 (i) Considerato l'evento $A = \{\text{il vettore contiene almeno uno zero}\}$, risulta

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(x_1 = 1, x_2 = 1, \dots, x_n = 1) \\ &= 1 - P(x_1 = 1)P(x_2 = 1 | x_1 = 1)P(x_3 = 1 | x_1 = 1, x_2 = 1) \cdots P(x_n = 1 | x_1 = 1, \dots, x_{n-1} = 1) \\ &= 1 - P(x_1 = 1)P(x_2 = 1 | x_1 = 1)P(x_3 = 1 | x_2 = 1) \cdots P(x_n = 1 | x_{n-1} = 1) \\ &= 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1}. \end{aligned}$$

(ii) Risulta

$$P(x_3 = 0 | A) = \frac{P(A | x_3 = 0)P(x_3 = 0)}{P(A)} = \frac{P(x_3 = 0)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1}},$$

essendo

$$P(x_2 = 0) = P(x_2 = 0 | x_1 = 0)P(x_1 = 0) + P(x_2 = 0 | x_1 = 1)P(x_1 = 1) = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2},$$

e pertanto

$$P(x_3 = 0) = P(x_3 = 0 | x_2 = 0)P(x_2 = 0) + P(x_3 = 0 | x_2 = 1)P(x_2 = 1) = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2}.$$

(iii) Si ha $P(A) = 2/3$ quando $1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} = 2/3$ ossia quando $\left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} = 2/3$. Ciò si realizza per $n = 2$.

Esercizio 2 (i) Si ha $p(x) = P(X = x) = P(|D_1 - D_2| = x) = P(D_1 - D_2 = \pm x)$. Pertanto,

$$p(0) = \frac{3}{18}, \quad p(1) = \frac{5}{18}, \quad p(2) = \frac{4}{18}, \quad p(3) = \frac{3}{18}, \quad p(4) = \frac{2}{18}, \quad p(5) = \frac{1}{18}.$$

(ii) Risulta quindi

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ \frac{3}{18} & 0 \leq x < 1, \\ \frac{8}{18} & 1 \leq x < 2, \\ \frac{12}{18} & 2 \leq x < 3, \\ \frac{15}{18} & 3 \leq x < 4, \\ \frac{17}{18} & 4 \leq x < 5, \\ 1 & x \geq 5. \end{cases}$$

(iii) Si ricava poi

$$E(X) = \sum_{x=0}^5 x p(x) = \frac{1}{18} (5 + 8 + 9 + 8 + 5) = \frac{16}{9} = 1,9\bar{4}.$$

(iv) Si ha

$$P(X \geq 2 | X \leq 4) = \frac{P(2 \leq X \leq 4)}{P(X \leq 4)} = \frac{\frac{4}{18} + \frac{3}{18} + \frac{2}{18}}{\frac{17}{18}} = \frac{9}{17} = 0,5294.$$

Esercizio 3 Se X_i ($i = 1, 2, \dots, 40$) è la variabile aleatoria che rappresenta il numero di manufatti prodotti dall'azienda tessile durante il giorno i -esimo, si ha

$$X = \sum_{i=1}^{40} X_i.$$

(i) Quindi

$$E(X) = \sum_{i=1}^{40} E(X_i) = \sum_{i=1}^{40} 2 = 80,$$

e, in virtù dell'ipotesi di indipendenza delle variabili X_i ,

$$Var(X) = \sum_{i=1}^{40} Var(X_i) = \sum_{i=1}^{40} 4 = 160.$$

(ii) In virtù del Teorema Centrale del Limite,

$$\begin{aligned} P(50 \leq X \leq 100) &\approx P\left(\frac{50 - 80}{\sqrt{160}} \leq Z \leq \frac{100 - 80}{\sqrt{160}}\right) = P(-2,37 \leq Z \leq 1,58) \\ &= \Phi(1,58) - \Phi(-2,37) = \Phi(1,58) - 1 + \Phi(2,37) = 0,9429 - 1 + 0,9911 = 0,934. \end{aligned}$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 8/1/2015 - ore 12

Esercizio 1 (i) Probabilità che il numero 1 sia tra i 2 estratti:

$$P(U) = \frac{1}{N+1} + \frac{N}{N+1} \cdot \frac{1}{N} = \frac{2}{N+1}; \quad \text{oppure: } P(U) = \frac{\binom{1}{1}\binom{N}{1}}{\binom{N+1}{2}} = \frac{2}{N+1}.$$

(ii) Probabilità che tra i 2 numeri estratti vi sia il numero N sapendo che tra i 2 estratti vi è il numero 1:

$$P(B|U) = \frac{P(B \cap U)}{P(U)} = \frac{2}{N},$$

essendo

$$P(B \cap U) = \frac{\binom{1}{1}\binom{N-2}{0}\binom{2}{1}}{\binom{N+1}{2}} = \frac{4}{(N+1)N}.$$

(iii) Per $A = \{\text{i 2 numeri estratti sono diversi}\}$ risulta

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{\binom{N-1}{0}\binom{2}{2}}{\binom{N+1}{2}} = 1 - \frac{2}{(N+1)N} = \frac{N^2 + N - 2}{(N+1)N} = \frac{(N-1)(N+2)}{(N+1)N}.$$

Per $B = \{\text{almeno uno dei 2 numeri estratti è } N\}$ si ha

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{\binom{N-1}{2}\binom{2}{0}}{\binom{N+1}{2}} = 1 - \frac{(N-1)(N-2)}{(N+1)N} = \frac{2(2N-1)}{(N+1)N}.$$

Per stabilire se gli eventi A e B sono indipendenti notiamo che:

$$P(A \cap B) = \frac{\binom{N-1}{1}\binom{2}{1}}{\binom{N+1}{2}} = \frac{4(N-1)}{(N+1)N},$$

da cui segue che $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ per $(N-1)(N+2)2(2N-1) = 4(N-1)(N+1)N$, ossia per $N=1$ e $N=2$.

(iv) Quando $N \rightarrow \infty$ si ha

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P(U) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{2}{N+1} = 0, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} P(B|U) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{2}{N} = 0,$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P(A \cap B) = 0 = \lim_{N \rightarrow \infty} P(A)P(B).$$

Esercizio 2 (i) La funzione di distribuzione: $F(x) = 0$ per $x < 0$; $F(x) = x^2/2$ per $0 \leq x < 1$; $F(x) = x/2$ per $1 \leq x < 2$; $F(x) = 1$ per $x \geq 2$.

(ii) $E(X) = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (x/2) dx = (x^3/3)_0^1 + (x^2/4)_1^2 = 13/12 = 1,08\bar{3}$.

(iii) $P(X \leq 3/2 | X > 1/2) = \frac{P(1/2 < X \leq 3/2)}{P(X > 1/2)} = \frac{F(3/2) - F(1/2)}{1 - F(1/2)} = \frac{3/4 - 1/8}{1 - 1/8} = \frac{5}{7} = 0,7143$.

Esercizio 3 (i) $p(x, y) \geq 0 \Rightarrow c \geq 0$,

$$1 = \sum_{x=0}^1 \sum_{y=0}^1 p(x, y) = \sum_{x=0}^1 \sum_{y=0}^1 c \left(\frac{1}{2}\right)^{|x-y-1|} = c \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 1\right) = \frac{9}{4}c \Rightarrow c = \frac{4}{9}.$$

(ii)

$$p_X(x) = \sum_{y=0}^1 p(x, y) = \frac{4}{9} \sum_{y=0}^1 \left(\frac{1}{2}\right)^{|x-y-1|} = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x = 0, \\ \frac{2}{3}, & x = 1. \end{cases}$$
$$p_Y(y) = \sum_{x=0}^1 p(x, y) = \frac{4}{9} \sum_{x=0}^1 \left(\frac{1}{2}\right)^{|x-y-1|} = \begin{cases} \frac{2}{3}, & y = 0, \\ \frac{1}{3}, & y = 1. \end{cases}$$

Quindi X e Y non sono identicamente distribuite, ma sono indipendenti in quanto

$$p(0, 0) = \frac{2}{9} = p_X(0)p_Y(0) = \frac{2}{9},$$

$$p(0, 1) = \frac{1}{9} = p_X(0)p_Y(1) = \frac{1}{9},$$

$$p(1, 0) = \frac{4}{9} = p_X(1)p_Y(0) = \frac{4}{9},$$

$$p(1, 1) = \frac{2}{9} = p_X(1)p_Y(1) = \frac{2}{9}.$$

(iii) Poiché X e Y sono indipendenti, si ha $\rho(X, Y) = 0$.

(iv) Per calcolare $E(X - Y)$ e $Var(X - Y)$ notiamo che

$$E(X) = \frac{2}{3}, \quad E(Y) = \frac{1}{3}, \quad Var(X) = Var(Y) = \frac{2}{9},$$

e quindi, ricordando che X e Y sono indipendenti:

$$E(X - Y) = E(X) - E(Y) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}, \quad Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) = \frac{4}{9}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 22/1/2015

Esercizio 1 (i) Sia F l'evento che si realizza quando la linea usata è funzionante, e H_j l'evento che si realizza quando si usa la linea L_j , e quindi $P(F|H_j) = j/4$. Inoltre, se il risultato del lancio del dado è k , allora si usa la linea L_j , dove $j = \lfloor k/3 + 1 \rfloor$, secondo il seguente schema:

$$k = 1 \Rightarrow j = \lfloor 1/3 + 1 \rfloor = 1; \quad k = 2 \Rightarrow j = \lfloor 2/3 + 1 \rfloor = 1;$$

$$k = 3 \Rightarrow j = \lfloor 3/3 + 1 \rfloor = 2; \quad k = 4 \Rightarrow j = \lfloor 4/3 + 1 \rfloor = 2;$$

$$k = 5 \Rightarrow j = \lfloor 5/3 + 1 \rfloor = 2; \quad k = 6 \Rightarrow j = \lfloor 6/3 + 1 \rfloor = 3,$$

e quindi

$$P(H_1) = \frac{1}{3}, \quad P(H_2) = \frac{1}{2}, \quad P(H_3) = \frac{1}{6}.$$

Si ha pertanto:

$$P(F) = \sum_{j=1}^3 P(F|H_j)P(H_j) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{11}{24} = 0,458\bar{3}.$$

(ii) Per la formula di Bayes si ha

$$P(H_j|F) = \frac{P(F|H_j)P(H_j)}{P(F)} = \begin{cases} \frac{2}{11}, & j = 0, \\ \frac{6}{11}, & j = 1, \\ \frac{3}{11}, & j = 2. \end{cases}$$

(iii) Quindi

$$\sum_{j=1}^3 P(H_j|F) = \frac{2}{11} + \frac{6}{11} + \frac{3}{11} = 1.$$

Esercizio 2 (i) $f(x) \geq 0 \Rightarrow c \geq 0$,

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = c \int_0^3 (x-1)^2 dx = c \left[\frac{(x-1)^3}{3} \right]_0^3 = c \frac{8+1}{3} = c3 \Rightarrow c = \frac{1}{3}.$$

Funzione di distribuzione: $F(x) = 0$ per $x < 0$; $F(x) = \frac{1}{3} \int_0^x (t-1)^2 dt = [\frac{1}{9}(t-1)^3]_0^x = \frac{1}{9}(x-1)^3 + \frac{1}{9}$ per $0 \leq x < 3$; $F(x) = 1$ per $x \geq 3$.

(ii) $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^3 x \frac{1}{3}(x-1)^2 dx = \frac{1}{3} [\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2]_0^3 = \frac{9}{4}$.

(iii) $P(X > \xi) = 8/9 \Leftrightarrow P(X \leq \xi) = 1/9 \Leftrightarrow F(\xi) = 1/9$

$\Leftrightarrow \frac{1}{9}(\xi-1)^3 + \frac{1}{9} = \frac{1}{9} \Leftrightarrow (\xi-1)^3 = 0 \Leftrightarrow \xi-1 = 0 \Leftrightarrow \xi = 1$.

Esercizio 3 (i) $p(x, y) \geq 0 \Rightarrow p \geq 0$; $1 = \sum_{i,j=0}^2 p(x, y) = 8p \Rightarrow p = \frac{1}{8}$. Quindi

$x \backslash y$	0	1	2	$p_X(x)$
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{7}{16}$
$p_Y(y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{7}{16}$	1

(ii) Segue che X e Y sono identicamente distribuite. Inoltre,

$$p(0, 0) = \frac{1}{8} \neq p_X(0)p_Y(0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16},$$

pertanto X e Y non sono indipendenti.

(iii) Si ha

$$E(X) = \sum_{x=0}^2 x p_X(x) = \frac{19}{16} = 1,1875 = E(Y)$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^2 x^2 p_X(x) = \frac{33}{16} = 2,0625 = E(Y^2)$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{33}{16} - \left(\frac{19}{16}\right)^2 = \frac{167}{256} = 0,6523 = Var(Y)$$

$$E(XY) = \sum_{x,y=0}^2 x y p(x, y) = \frac{13}{8} = 1,625$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{13}{8} - \frac{19}{16} \cdot \frac{19}{16} = \frac{55}{256} = 0,2148$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 2 \frac{19}{16} = \frac{19}{8} = 2,375$$

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y) = 2 \frac{167}{256} + 2 \frac{55}{256} = \frac{111}{64} = 1,7344.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 17/2/2015

Esercizio 1 Lo spazio campionario è costituito da $\binom{5}{3} = 10$ sequenze, ognuna avente probabilità $1/10$.

(i) Denotando con F_k l'evento che si realizza quando l'algoritmo si ferma al passo k -esimo, si ha:

$$F_1 = \emptyset, \quad F_2 = \{11001, 11010, 11100\},$$

$$F_3 = \{01101, 01110, 10101, 10110\}, \quad F_4 = \{00111, 01011, 10011\},$$

e quindi $P(F_1) = 0$, $P(F_2) = 3/10$, $P(F_3) = 4/10$, $P(F_4) = 3/10$.

(ii) Ponendo $B = \{\text{il bit successivo al secondo } \mathbf{1} \text{ è pari a } \mathbf{1}\}$, si ha

$$B = \{11100, 01110, 10110, 00111, 01011, 10011\}$$

e pertanto $P(B) = 6/10 = 3/5$.

(iii) Per calcolare $P(F_k|B)$ si fa uso della formula di Bayes:

$$P(F_k|B) = \frac{P(B|F_k)P(F_k)}{P(B)} \quad (1 \leq k \leq 4)$$

da cui segue:

$$P(F_1|B) = 0, \quad P(F_2|B) = \frac{P(B|F_2)P(F_2)}{P(B)} = \frac{(1/3)(3/10)}{6/10} = \frac{1}{6},$$

$$P(F_3|B) = \frac{P(B|F_3)P(F_3)}{P(B)} = \frac{(1/2)(4/10)}{6/10} = \frac{1}{3}, \quad P(F_4|B) = \frac{P(B|F_4)P(F_4)}{P(B)} = \frac{(1)(3/10)}{6/10} = \frac{1}{2}.$$

(iv) Si ha quindi:

$$P(F_1|B) + P(F_2|B) + P(F_3|B) + P(F_4|B) = 0 + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 1.$$

Esercizio 2 (i) Poiché X è una variabile aleatoria normale di media $\mu = -1$ e varianza $\sigma^2 = 4$, la variabile

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X + 1}{2}$$

è normale standard. Quindi risulta:

$$P(A) = P(X > -2) = P\left(\frac{X+1}{2} > \frac{-2+1}{2}\right) = P(Z > -0,5) = 1 - \Phi(-0,5) = \Phi(0,5) = 0,6915$$

$$P(B) = P(X < 2) = P\left(\frac{X+1}{2} < \frac{2+1}{2}\right) = P(Z < 1,5) = \Phi(1,5) = 0,9332$$

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(-2 < X < 2) = P(-0,5 < Z < 1,5) = \Phi(1,5) - \Phi(-0,5) \\ &= \Phi(1,5) - [1 - \Phi(0,5)] = 0,9332 - 1 + 0,6915 = 0,6247. \end{aligned}$$

Segue che

$$P(A) \cdot P(B) = 0,6915 \cdot 0,9332 = 0,6453 > 0,6247 = P(A \cap B),$$

ossia $P(A|B) < P(A)$; pertanto A e B sono correlati negativamente.

(ii) Posto $Y = 1 - 2X$, si ha

$$\begin{aligned} Cov(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = E[X(1 - 2X)] - E(X)E(1 - 2X) \\ &= E(X) - 2E(X^2) - E(X)[1 - 2E(X)] = -2[E(X^2) - \{E(X)\}^2] = -2\sigma^2 = -8. \end{aligned}$$

Esercizio 3 (i) Risulta

ω	X	Y	ω	X	Y
<i>ccc</i>	0	3	<i>tcc</i>	1	2
<i>cct</i>	1	2	<i>tct</i>	2	1
<i>ctc</i>	1	1	<i>ttc</i>	2	2
<i>ctt</i>	2	2	<i>ttt</i>	3	3

Quindi la distribuzione congiunta di (X, Y) e le distribuzioni marginali di X e Y sono

$x \backslash y$	1	2	3	$p_X(x)$
0	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
3	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
$p_Y(y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

(ii) Il coefficiente di correlazione di (X, Y) è nullo poiché

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 3 - (1,5)(2) = 0,$$

essendo

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = 1,5 \quad E(Y) = 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} = 2$$

$$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{2}{8} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{2}{8} + 3 \cdot 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{24}{8} = 3.$$

(iii) X e Y non sono indipendenti, essendo

$$p(0, 1) = 0 \neq p_X(0) \cdot p_Y(1) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4}.$$

(iv) Si ha

$$P(X = Y) = \sum_{x=1}^3 p(x, x) = \frac{1}{2},$$

$$P(X \leq 2, Y > 1) = \sum_{x=1}^2 \sum_{y=2}^3 p(x, y) = \frac{5}{8}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 16/4/2015

Esercizio 1 (i) Lo spazio campionario S è costituito dalle sequenze di n bit casuali, con $n \geq 4$. Poiché $A = \{\text{almeno 1 dei primi 3 bit assume valore } 1\}$ e $B = \{\text{il primo e l'ultimo bit assumono stesso valore}\}$, si vede facilmente che $A \cup B \neq S$, e quindi A e B non sono eventi necessari. Infatti, $A \cup B$ non contiene le sequenze del tipo $(0, 0, 0, b_4, b_5, \dots, b_{n-1}, 1)$.

(ii) Notiamo che \bar{A} si realizza quando i primi 3 bit hanno valore 0; quindi si ha

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 0,875.$$

L'evento B contiene le sequenze del tipo $(0, b_2, b_3, \dots, b_{n-1}, 0)$ e $(1, b_2, b_3, \dots, b_{n-1}, 1)$, e pertanto

$$P(B) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Inoltre,

$$P(A \cap B) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{4} + \frac{3}{16} = \frac{7}{16} = 0,4375$$

poiché $A \cap B$ contiene le sequenze del tipo $(1, b_2, b_3, \dots, b_{n-1}, 1)$ ed anche quelle del tipo $(0, 0, 1, b_4, b_5, \dots, b_{n-1}, 0)$, $(0, 1, 0, b_4, b_5, \dots, b_{n-1}, 0)$ e $(0, 1, 1, b_4, b_5, \dots, b_{n-1}, 0)$. Si ricava che gli eventi A e B sono indipendenti, essendo $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

(iii) Notiamo che

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{7}{8} + \frac{1}{2} - \frac{7}{16} = \frac{15}{16}.$$

Inoltre, per l'indipendenza di A e B , si ha

$$P(\bar{B} | A) = P(\bar{B}) = \frac{1}{2}.$$

Ne segue che la relazione $P(A \cup B) - P(\bar{B} | A) < 1/2$ è vera.

(iv) Per la legge di De Morgan e per l'indipendenza di A e B si ha

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) + P(\bar{A} | B) = 1 - P(A \cup B) + P(\bar{A}) = 1 - \frac{15}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16}$$

quindi la relazione $P(\bar{A} \cap \bar{B}) + P(\bar{A} | B) < 1/2$ è vera.

Esercizio 2 (i) Derivando la funzione di distribuzione si ha la densità di probabilità di X :

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(ii) Si ha

$$\mu = E(X) = \int_0^{1/2} x dx + \int_1^2 \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^{1/2} + \frac{x^2}{4} \Big|_1^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{2} \right) = \frac{7}{8},$$

$$E(X^2) = \int_0^{1/2} x^2 dx + \int_1^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^{1/2} + \frac{x^3}{6} \Big|_1^2 = \frac{1}{24} + \frac{7}{6} = \frac{29}{24},$$

$$\sigma^2 = Var(X) = E(X^2) - \mu^2 = \frac{29}{24} - \frac{49}{64} = \frac{85}{192} = 0,4427.$$

(iii) Per ricavare il valore di h tale che $P(|X - \mu| < h) = 5/8$ notiamo che

$$P(|X - \mu| < h) = P\left(\frac{7}{8} - h < X < \frac{7}{8} + h\right) = F\left(\frac{7}{8} + h\right) - F\left(\frac{7}{8} - h\right) = \frac{7}{16} + \frac{h}{2} - \frac{7}{8} + h,$$

quindi

$$\frac{7}{16} + \frac{h}{2} - \frac{7}{8} + h = \frac{5}{8} \quad \Rightarrow \quad \frac{3}{2}h = \frac{17}{16} \quad \Rightarrow \quad h = \frac{17}{24} = 0,7083.$$

Esercizio 3 (i) Risulta

ω	X	Y	ω	X	Y	ω	X	Y	ω	X	Y
0000	4	0	0100	3	0	1000	2	0	1100	1	1
0001	1	0	0101	2	1	1001	1	1	1101	2	1
0010	2	0	0110	1	1	1010	2	1	1110	1	1
0011	1	1	0111	2	1	1011	3	1	1111	4	1

Quindi la distribuzione congiunta di (X, Y) e le distribuzioni marginali di X e Y sono

$x \backslash y$	0	1	$p_X(x)$
1	1/16	5/16	3/8
2	2/16	4/16	3/8
3	1/16	1/16	1/8
4	1/16	1/16	1/8
$p_Y(y)$	5/16	11/16	1

(i) Risulta $p(1, 0) = 1/16 \neq p_X(1) \cdot p_Y(0) = (3/8) \cdot (5/16) = 15/128$, quindi X e Y non sono indipendenti. Si ha che X e Y sono negativamente correlate, essendo

$$E(X) = \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} + \frac{4}{8} = 2, \quad E(Y) = \frac{11}{16}, \quad E(XY) = \frac{5}{16} + \frac{8}{16} + \frac{3}{16} + \frac{4}{16} = \frac{20}{16} = \frac{5}{4},$$

e quindi $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{5}{4} - 2 \cdot \frac{11}{16} = -\frac{1}{8} < 0$.

(ii) Si trae infine

$$P(X = Y) = p(1, 1) = \frac{5}{16}, \quad P(X \geq 2, Y \geq 1) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8},$$

$$P(X \geq 2, Y \geq 1 | X \neq Y) = \frac{6/16}{11/16} = \frac{6}{11}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 25/6/2015

Esercizio 1 (i) Poniamo, per $k = 1, 2, 3$,

$A_k = \{\text{si verifica un errore di tipo A nel trasmettere il bit } k\text{-esimo}\},$

$B_k = \{\text{si verifica un errore di tipo B nel trasmettere il bit } k\text{-esimo}\},$

$E_k = \{\text{si verifica un errore di tipo qualsiasi nel trasmettere il bit } k\text{-esimo}\}.$

Risulta: $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = 0,2$. Inoltre: $P(B_1) = P(B_2) = 0,1$ e $P(B_3) = 0,2$.

Inoltre $E_k = A_k \cup B_k$. Quindi, trasmettendo la sequenza binaria **001**, la probabilità che si verifichi un solo errore, di tipo A, è

$$P(I_A) = P(A_1 \overline{E_2} \overline{E_3}) + P(\overline{E_1} A_2 \overline{E_3}) + P(\overline{E_1} \overline{E_2} A_3) = 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,2 = 0,266$$

avendo usato l'indipendenza degli eventi. Analogamente, trasmettendo la sequenza binaria **001**, la probabilità che si verifichi un solo errore, di tipo B, è

$$P(I_B) = P(B_1 \overline{E_2} \overline{E_3}) + P(\overline{E_1} B_2 \overline{E_3}) + P(\overline{E_1} \overline{E_2} B_3) = 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,1 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,2 = 0,182$$

pertanto la probabilità che si verifichi un solo errore, di tipo qualsiasi, è dato dalla somma delle probabilità precedenti, trattandosi di eventi incompatibili, quindi:

$$P(I_A \cup I_B) = P(I_A) + P(I_B) = 0,266 + 0,182 = 0,448$$

(ii) Se nel trasmettere la sequenza **001** si è verificato un solo errore, di tipo qualsiasi, la probabilità che l'errore si sia verificato nella trasmissione del terzo bit si ottiene usando la formula di Bayes:

$$P(\overline{E_1} \overline{E_2} E_3 | I_A \cup I_B) = \frac{P(\overline{E_1} \overline{E_2} E_3)}{P(I_A \cup I_B)} = \frac{0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,4}{0,448} = \frac{0,196}{0,448} = 0,4375.$$

Esercizio 2 Se X è una variabile aleatoria avente valore medio e varianza

$$E(X) = 3,5 \quad Var(X) = 6,25$$

posto $Y = X - 1$, si ha

$$(i) \quad \mu = E(Y) = E(X - 1) = E(X) - 1 = 2,5$$

$$\sigma^2 = Var(Y) = Var(X - 1) = Var(X) = 6,25$$

e quindi $\sigma = \sqrt{6,25} = 2,5$.

(ii) Nel caso in cui Y ha distribuzione esponenziale, di parametro λ , poiché $\mu = E(Y) = 1/\lambda$, si ha $\lambda = 1/\mu = 1/2,5 = 0,4$. Pertanto risulta

$$P(|Y - \mu| < \sigma) = P(\mu - \sigma < Y < \mu + \sigma) = P(0 < Y < 5) = 1 - e^{-\lambda \cdot 5} = 1 - e^{-2} = 0,8647$$

e

$$P(Y > \sigma) = P(Y > 2,5) = e^{-\lambda \cdot 2,5} = e^{-1} = 0,3679$$

Se Y ha distribuzione normale, ponendo $Z = (Y - \mu)/\sigma$ (con Z normale standard) si ha

$$P(|Y - \mu| < \sigma) = P(\mu - \sigma < Y < \mu + \sigma) = P\left(\frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma} < Z < \frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma}\right) = P(-1 < Z < 1) \\ = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - [1 - \Phi(1)] = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0,8413 = 0,6826$$

Infine:

$$P(Y > \sigma) = P\left(\frac{Y - \mu}{\sigma} > \frac{\sigma - \mu}{\sigma}\right) = P(Z > 0) = 1 - \Phi(0) = 0,5$$

Esercizio 3

ω	$X(\omega)$	$Y(\omega)$	ω	$X(\omega)$	$Y(\omega)$
cccc	0	0	tccc	1	0
ccct	1	0	tcct	2	3
cctc	1	0	tctc	2	2
cctt	2	1	tctt	3	0
ctcc	1	0	ttcc	2	1
ctct	2	2	ttct	3	0
cttc	2	3	tttc	3	0
cttt	3	0	tttt	4	0

(i) Pertanto densità discreta congiunta di (X, Y) e densità marginali sono:

$x \backslash y$	0	1	2	3	$p_X(x)$
0	$\frac{1}{16}$	0	0	0	$\frac{1}{16}$
1	$\frac{4}{16}$	0	0	0	$\frac{4}{16}$
2	0	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{6}{16}$
3	$\frac{4}{16}$	0	0	0	$\frac{4}{16}$
4	$\frac{1}{16}$	0	0	0	$\frac{1}{16}$
$p_Y(y)$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

(ii) Si ha (notiamo che X è binomiale)

$$E(X) = 2, \quad E(Y) = \frac{1}{8} + \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}, \quad E(X \cdot Y) = \frac{2}{8} + \frac{4}{8} + \frac{6}{8} = \frac{3}{2},$$

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y) = \frac{3}{2} - 2 \cdot \frac{3}{4} = 0$$

e pertanto il coefficiente di correlazione di (X, Y) è nullo.

(iii) Si ricava facilmente che X e Y non sono indipendenti, essendo:

$$p(0, 0) = \frac{1}{16} \neq p_X(0)p_Y(0) = \frac{1}{16} \cdot \frac{5}{8}$$

(iv) Infine si ha

$$P(X \neq Y) = 1 - P(X = Y) = 1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}, \quad P(X \geq 2, Y < 2) = \frac{7}{16}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 14/7/2015

Esercizio 1 Indichiamo con A_k^i l'evento che si realizza quando dalla i -esima cartella si estraggono k file riservati, con $i = 1, 2$ e $k = 0, 1, 2$. Notiamo che risulta

$$P(A_k^i) = \frac{\binom{2}{k} \binom{6}{2-k}}{\binom{8}{2}} \Rightarrow P(A_0^i) = \frac{15}{28} \quad P(A_1^i) = \frac{12}{28} \quad P(A_2^i) = \frac{1}{28},$$

e che gli eventi A_k^1 e A_h^2 sono indipendenti.

(i) La probabilità che i 4 file estratti siano tutti pubblici (ossia nessuno sia riservato) è

$$P(A_0^1 \cap A_0^2) = P(A_0^1)P(A_0^2) = \left(\frac{15}{28}\right)^2 = 0,287.$$

(ii) La probabilità che almeno uno dei 4 file estratti sia riservato è

$$P(\overline{A_0^1 \cap A_0^2}) = 1 - P(A_0^1 \cap A_0^2) = 1 - 0,287 = 0,713.$$

(iii) La probabilità che tra i 4 file estratti vi sia un solo file riservato è

$$P(R) := P(A_0^1 \cap A_1^2) + P(A_1^1 \cap A_0^2) = P(A_0^1)P(A_1^2) + P(A_1^1)P(A_0^2) = 2 \frac{15}{28} \frac{12}{28} = \frac{45}{98} = 0,4592.$$

(iv) La probabilità che tra i 4 file estratti vi sia un solo file riservato, sapendo che almeno uno dei 4 file estratti è riservato, è

$$P(R | \overline{A_0^1 \cap A_0^2}) = \frac{P(R \cap (\overline{A_0^1 \cap A_0^2}))}{P(\overline{A_0^1 \cap A_0^2})} = \frac{P(R)}{P(A_0^1 \cap A_0^2)} = \frac{0,4592}{0,713} = 0,644.$$

Esercizio 2 Posto $p(k) = P(X = k)$, risulta

$$p(0) = \frac{4}{5} \frac{3}{4} = \frac{3}{5} = 0,6 \quad p(1) = \frac{1}{5} \frac{3}{4} + \frac{4}{5} \frac{1}{4} = \frac{7}{20} = 0,35 \quad p(2) = \frac{1}{5} \frac{1}{4} = \frac{1}{20} = 0,05.$$

(i) Quindi la funzione di distribuzione $F(x) = P(X \leq x)$ è:

- $F(x) = 0$ per $x < 0$,
- $F(x) = 0,6$ per $0 \leq x < 1$,
- $F(x) = 0,95$ per $1 \leq x < 2$,
- $F(x) = 1$ per $x \geq 2$.

(ii) Il valore medio μ e la deviazione standard σ di X sono

$$\mu = E(X) = \sum_{k=0}^2 k p(k) = \frac{9}{20} = 0,45 \quad E(X^2) = \sum_{k=0}^2 k^2 p(k) = \frac{11}{20} = 0,55$$

$$\sigma^2 = Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0,55 - (0,45)^2 = 0,3475 \quad \sigma = \sqrt{0,3475} = 0,5895$$

(iii) Si ha

$$\begin{aligned} P(|X - \mu| > \sigma) &= P(X < \mu - \sigma) + P(X > \mu + \sigma) = P(X < -0,1395) + P(X > 1,0395) \\ &= F(-0,1395) + 1 - F(1,0395) = 0 + 1 - 0,95 = 0,05. \end{aligned}$$

Esercizio 3 (i) Essendo $p(x, y) = c|x - y|$, per $x = 0, 1, 2$ e $y = 0, 1, 2$ si ha

$$\sum_{i,j=1}^2 p(x, y) = 8c = 1 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{8}.$$

Quindi

$x \backslash y$	0	1	2	$p_X(x)$
0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
$p_Y(y)$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	1

(ii) X e Y non sono indipendenti, essendo $p(0, 0) = 0 \neq p_X(0)p_Y(0) = (3/8)^2$.

(iii) Per calcolare il coefficiente di correlazione di (X, Y) notiamo che X e Y sono identicamente distribuite, con

$$E(X) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 = E(Y), \quad E(X^2) = \frac{1}{4} + \frac{3}{2} = \frac{7}{4}, \quad Var(X) = \frac{7}{4} - 1 = \frac{3}{4} = Var(Y)$$

$$E(X \cdot Y) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad Cov(X, Y) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = -\frac{2}{3}.$$

(iv) Si ha


$$E(X - Y) = E(X) - E(Y) = 0,$$

$$Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - 2Cov(X, Y) = 2\frac{3}{4} - 2\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 4/9/2015

Esercizio 1 (i) Dalla rete



si trae che i 5 possibili percorsi da n_1 a n_6 sono

$$\pi_1 = [n_1, n_2, n_4, n_6]; \quad P(\pi_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

$$\pi_2 = [n_1, n_2, n_5, n_4, n_6]; \quad P(\pi_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{8}$$

$$\pi_3 = [n_1, n_2, n_5, n_6]; \quad P(\pi_3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$\pi_4 = [n_1, n_3, n_5, n_4, n_6]; \quad P(\pi_4) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

$$\pi_5 = [n_1, n_3, n_5, n_6]; \quad P(\pi_5) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

(ii) Per $k = 1, \dots, 5$ si ha $P(N_k) = \sum_{i: N_k \in \pi_i} P(\pi_i)$, e quindi si ricava facilmente:

$$P(N_1) = 1, \quad P(N_2) = \frac{1}{2}, \quad P(N_3) = \frac{1}{2}, \quad P(N_4) = \frac{5}{8}, \quad P(N_5) = \frac{3}{4}, \quad (P(N_6) = 1).$$

(iii) Sapendo che il messaggio è passato per n_4 qual è la probabilità che sia passato per n_3 è

$$P(N_3|N_4) = \frac{P(N_3 \cap N_4)}{P(N_4)} = \frac{P(\pi_4)}{5/8} = \frac{1/4}{5/8} = \frac{2}{5} = 0,4$$

(iv) Gli eventi N_3 e N_4 non sono indipendenti, essendo $P(N_3|N_4) \neq P(N_3)$.

Esercizio 2 (i) Per la variabile aleatoria X risulta

$$f(x) = \begin{cases} x/100, & 0 \leq x < 10, \\ 1/10, & 10 \leq x < 15, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases} \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2/200, & 0 \leq x < 10, \\ x/10 - 1/2, & 10 \leq x < 15, \\ 1, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(ii) Il valore atteso di X è

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{10} \frac{x^2}{100} dx + \int_{10}^{15} \frac{x}{10} dx = \frac{x^3}{300} \Big|_0^{10} + \frac{x^2}{20} \Big|_{10}^{15} = \frac{10}{3} + \frac{25}{4} = \frac{115}{12} = 9,58\bar{3}.$$

(iii) Se il task non è stato completato nei primi 6 minuti, la probabilità che si completi nei successivi 6 minuti è

$$P(6 < X \leq 12 | X > 6) = \frac{P(6 < X \leq 12)}{P(X > 6)} = \frac{F(12) - F(6)}{1 - F(6)} = \frac{26}{41} = 0,6341$$

essendo $F(6) = 36/200 = 9/50$ e $F(12) = 7/10$.

Esercizio 3 Lanciando una moneta 4 volte, se X descrive il numero di volte che esce testa e Y descrive il numero di variazioni nei risultati riscontrati, si ha

ω	$X(\omega)$	$Y(\omega)$	ω	$X(\omega)$	$Y(\omega)$
cccc	0	0	tccc	1	1
ccct	1	1	tcct	2	2
cctc	1	2	tctc	2	3
cctt	2	1	tctt	3	2
ctcc	1	2	ttcc	2	1
ctct	2	3	ttct	3	2
cttc	2	2	tttc	3	1
cttt	3	1	tttt	4	0

(i) Quindi la distribuzione congiunta di (X, Y) e le distribuzioni marginali sono

$x \backslash y$	0	1	2	3	$p_X(x)$
0	$\frac{1}{16}$	0	0	0	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	0	$\frac{4}{16}$
2	0	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{6}{16}$
3	0	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	0	$\frac{4}{16}$
4	$\frac{1}{16}$	0	0	0	$\frac{1}{16}$
$p_Y(y)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

(ii) Risulta, ad esempio, $p(0, 0) \neq p_X(0)p_Y(0)$ e pertanto X e Y non sono indipendenti.

(iii) La covarianza di (X, Y) è

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y) = 3 - 2 \cdot \frac{3}{2} = 0$$

essendo $E(X) = 2$, $E(Y) = \frac{3}{2}$, $E(X \cdot Y) = \frac{1}{16}(2 + 4 + 4 + 8 + 12 + 6 + 12) = 3$.

Infine, si ha $P(Y > 1 | X > 1, Y > 0) = \frac{P(X > 1, Y > 1)}{P(X > 1, Y > 0)} = \frac{6/16}{10/16} = 3/5$.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 6/11/2015

Esercizio 1 Da un'urna contenente 90 biglie se ne estraggono due senza reinserimento.

(i) Posto $A = \{\text{la biglia numero 90 non è tra le due estratte}\}$, si ha

$$P(A) = \frac{\binom{1}{0} \binom{89}{2}}{\binom{90}{2}} = \frac{89 \cdot 88/2}{90 \cdot 89/2} = \frac{44}{45} = 0,9\bar{7}.$$

(ii) Sia $B = \{\text{la biglia numero 1 è tra le due estratte}\}$; allora risulta

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\binom{1}{1} \binom{1}{0} \binom{88}{1} / \binom{90}{2}}{\binom{1}{1} \binom{89}{1} / \binom{90}{2}} = \frac{88}{89} = 0,9888.$$

(iii) Se le estrazioni sono con reinserimento si ha

$$P(A) = P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2) = \left(\frac{89}{90}\right)^2 = 0,9779$$

essendo $A_i = \{\text{nella } i\text{-esima estrazione non esce la biglia numero 90}\}$, $i = 1, 2$, con A_1 e A_2 eventi indipendenti. Inoltre, in tal caso risulta

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2 \frac{1}{90} \frac{88}{90}}{2 \frac{1}{90} \frac{89}{90}} = \frac{88}{89} = 0,9888.$$

Esercizio 2 Notiamo che

$$P(X > 3 | X > 2) = \frac{P(\{X > 3\} \cap \{X > 2\})}{P(X > 2)} = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)}.$$

(i) Se X ha distribuzione esponenziale e $Var(X) = 1$, allora ricordando che $E(X) = 1/\lambda$, si ha $\lambda = 1$ e quindi $F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-x}$, $x \geq 0$, da cui segue

$$P(X > 3 | X > 2) = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)} = \frac{e^{-3}}{e^{-2}} = e^{-1} = 0,3679.$$

Si perviene a tale risultato anche usando la proprietà di assenza di memoria:

$$P(X > 3 | X > 2) = P(X > 3 - 2) = P(X > 1) = e^{-1} = 0,3679.$$

(ii) Se X ha distribuzione normale, con $E(X) = 1$ e $Var(X) = 1$, allora $Z = X - 1$ ha distribuzione normale standard; pertanto $P(X > x) = P(Z > x - 1) = 1 - \Phi(x - 1)$ e quindi

$$P(X > 3 | X > 2) = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)} = \frac{1 - \Phi(2)}{1 - \Phi(1)} = \frac{1 - \Phi(2)}{1 - \Phi(1)} = \frac{1 - 0,9772}{1 - 0,8413} = \frac{0,0228}{0,1587} = 0,1437.$$


(iii) Se X è uniformemente distribuita nell'intervallo $(0, b)$, e si ha $Var(X) = 1$, allora ricordando che $Var(X) = (b - a)^2/12 = b^2/12$, si ha $b^2 = 12$ ossia $b = 2\sqrt{3}$. Pertanto si ha $P(X \leq x) = \frac{x}{2\sqrt{3}}$, $0 \leq x \leq 2\sqrt{3}$, da cui segue

$$P(X > 3 | X > 2) = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)} = \frac{1 - \frac{3}{2\sqrt{3}}}{1 - \frac{2}{2\sqrt{3}}} = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{1 - 0,866}{1 - 0,577} = \frac{0,134}{0,423} = 0,317.$$

(iv) Se X ha distribuzione binomiale di parametri $n = 4$ e $p \in (0, 1)$, con $Var(X) = 1$, ricordando che $Var(X) = np(1-p)$ si ha $4p(1-p) = 1$, ossia $4p^2 - 4p + 1 = 0$, da cui segue $(2p - 1)^2 = 0$ e dunque $p = 1/2$. Se segue $P(X = x) = \binom{4}{x} \frac{1}{2^4}$ per $0 \leq x \leq 4$ e quindi

$$P(X > 3 | X > 2) = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)} = \frac{P(X = 4)}{P(X = 3) + P(X = 4)} = \frac{\binom{4}{4} \frac{1}{2^4}}{\binom{4}{3} \frac{1}{2^4} + \binom{4}{4} \frac{1}{2^4}} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

Esercizio 3 Si scelgono a caso 2 nodi del seguente grafo.



Consideriamo le variabili aleatorie $X = \alpha + \beta$ e $Y = |\alpha - \beta|$, con α e β i gradi dei nodi scelti.

odi	α	β	X	Y	odi	α	β	X	Y	odi	α	β	X	Y
$n_1 - n_2$	2	3	5	1	$n_2 - n_3$	3	3	6	0	$n_3 - n_5$	3	2	5	1
$n_1 - n_3$	2	3	5	1	$n_2 - n_4$	3	3	6	0	$n_3 - n_6$	3	3	6	0
$n_1 - n_4$	2	3	5	1	$n_2 - n_5$	3	2	5	1	$n_4 - n_5$	3	2	5	1
$n_1 - n_5$	2	2	4	0	$n_2 - n_6$	3	3	6	0	$n_4 - n_6$	3	3	6	0
$n_1 - n_6$	2	3	5	1	$n_3 - n_4$	3	3	6	0	$n_5 - n_6$	2	3	5	1

(i) La distribuzione congiunta di (X, Y) e le distribuzioni marginali sono:

$x \backslash y$	0	1	$p_X(x)$
4	$\frac{1}{15}$	0	$\frac{1}{15}$
5	0	$\frac{8}{15}$	$\frac{8}{15}$
6	$\frac{6}{15}$	0	$\frac{6}{15}$
$p_Y(y)$	$\frac{7}{15}$	$\frac{8}{15}$	1

(ii) X e Y non sono indipendenti, essendo $p(4, 1) = 0 \neq p_X(4)p_Y(1)$.

(iii) Il coefficiente di correlazione è $\rho(X, Y) = -\sqrt{5/14} = -0,5976$ essendo:

$$E(X) = 4 \cdot \frac{1}{15} + 5 \cdot \frac{8}{15} + 6 \cdot \frac{6}{15} = \frac{80}{15} = \frac{16}{3}, \quad E(Y) = \frac{8}{15}, \quad E(X \cdot Y) = 5 \cdot \frac{8}{15} = \frac{8}{3},$$

$$E(X^2) = 16 \cdot \frac{1}{15} + 25 \cdot \frac{8}{15} + 36 \cdot \frac{6}{15} = \frac{432}{15} = \frac{144}{5}, \quad E(Y^2) = \frac{8}{15},$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{144}{5} - \left(\frac{16}{3}\right)^2 = \frac{16}{45},$$

$$Var(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{8}{15} - \left(\frac{8}{15}\right)^2 = \frac{56}{225},$$

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y) = \frac{8}{3} - \frac{16}{3} \cdot \frac{8}{15} = -\frac{8}{45}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 7/1/2016

Esercizio 1 Consideriamo gli eventi $T_1 = \{\text{la centrale riceve richieste d'intervento dalla città di Salerno}\}$, $T_2 = \{\text{la centrale riceve richieste d'intervento dalla città di Avellino}\}$, $T_3 = \{\text{la centrale riceve richieste d'intervento dalla città di Atripalda}\}$ e $T_4 = \{\text{la centrale riceve richieste d'intervento dalla città di Mercato San Severino}\}$. Dai dati del problema risulta $P(T_1) = 0,8$, $P(T_2) = 0,5$, $P(T_3) = 0,05$ e $P(T_4) = 0,3$. Sia poi $E_k = \{\text{la richiesta d'intervento arriva esattamente da } k \text{ città}\}$ ($k = 1, 2, 3, 4$), ed $F = \{\text{la richiesta d'intervento arriva da non più di due città}\}$.

(i)

$$\begin{aligned} P(E_1) &= P(T_1 \cap \bar{T}_2 \cap \bar{T}_3 \cap \bar{T}_4) + P(\bar{T}_1 \cap T_2 \cap \bar{T}_3 \cap \bar{T}_4) + P(\bar{T}_1 \cap \bar{T}_2 \cap T_3 \cap \bar{T}_4) \\ &+ P(\bar{T}_1 \cap \bar{T}_2 \cap \bar{T}_3 \cap T_4) = 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 0,95 + 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 0,95 \\ &+ 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 0,05 + 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,5 \cdot 0,95 = 0,3645. \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned} P(F) &= 1 - P(E_3) - P(E_4) = 1 - P(T_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap \bar{T}_4) - P(T_1 \cap T_2 \cap \bar{T}_3 \cap T_4) \\ &- P(T_1 \cap \bar{T}_2 \cap T_3 \cap T_4) - P(\bar{T}_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap T_4) - P(T_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap T_4) \\ &= 1 - [0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,05 \cdot 0,7 + 0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,95 \cdot 0,3 + 0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,05 \cdot 0,3 \\ &+ 0,2 \cdot 0,5 \cdot 0,05 \cdot 0,3 + 0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,05 \cdot 0,3] = 0,8585. \end{aligned}$$

(iii)

$$P(T_4 | E_1) = \frac{P(T_4 \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{P(\bar{T}_1 \cap \bar{T}_2 \cap \bar{T}_3 \cap T_4)}{P(E_1)} = \frac{0,2 \cdot 0,5 \cdot 0,95 \cdot 0,3}{0,3645} = 0,0781.$$

Esercizio 2 Lo spazio campionario S è formato dalle sequenze binarie di lunghezza 7 con esattamente 4 cifre uguali ad uno. Risulta pertanto $|S| = \binom{7}{4} = 35$.

(i) La distribuzione di probabilità di X è data da

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= \frac{\binom{6}{3}}{35} = \frac{20}{35}, & P(X = 2) &= \frac{\binom{5}{3}}{35} = \frac{10}{35} \\ P(X = 3) &= \frac{\binom{4}{3}}{35} = \frac{4}{35}, & P(X = 4) &= \frac{1}{35}. \end{aligned}$$

(ii) La funzione di distribuzione di X è

$$\begin{aligned} F(x) &= 0 \text{ per } x < 1, \\ F(x) &= 20/35 \text{ per } 1 \leq x < 2, \\ F(x) &= 30/35 \text{ per } 2 \leq x < 3, \\ F(x) &= 34/35 \text{ per } 3 \leq x < 4, \\ F(x) &= 1 \text{ per } x \geq 4. \end{aligned}$$

(iii)

$$E(X) = 1 \cdot \frac{20}{35} + 2 \cdot \frac{10}{35} + 3 \cdot \frac{4}{35} + 4 \cdot \frac{1}{35} = \frac{56}{35} = 1,6$$

$$E(X^2) = 1 \cdot \frac{20}{35} + 4 \cdot \frac{10}{35} + 9 \cdot \frac{4}{35} + 16 \cdot \frac{1}{35} = \frac{112}{35} = 3,2$$

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 112/35 - (56/35)^2 = \frac{16}{25} = 0,64.$$

(iv)

$$E(Y) = 1 \cdot \frac{20}{35} + \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{35} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{35} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{35} = \frac{319}{420} = 0,7595.$$

Esercizio 3 (i) Dovendo essere $p(x, y) \geq 0 \forall x, y$, e $\sum_{x=0}^1 \sum_{y=0}^2 p(x, y) = 1$ si deduce la condizione $p = 1/4$. Si ottiene quindi

$x \backslash y$	0	1	2	$p_X(x)$
0	1/8	1/4	1/8	1/2
1	0	1/8	3/8	1/2
$p_X(x)$	1/8	3/8	1/2	1

(ii) Si ha $p(0, 0) = 1/8 \neq p_X(0) \cdot p_Y(0) = 1/16$, quindi X e Y non sono mai indipendenti.

(iii) La covarianza è data da

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = 3/16,$$

essendo

$$E(X \cdot Y) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{7}{8},$$

$$E(X) = \frac{4}{8}, \quad E(Y) = \frac{3}{8} + \frac{8}{8} = \frac{11}{8}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 27/1/2016

Esercizio 1 Un vettore booleano di lunghezza 6 contiene 3 bit pari a **1** e 3 bit pari a **0**, distribuiti a caso, quindi lo spazio campionario ha cardinalità $|S| = \binom{6}{3} = (6 \cdot 5 \cdot 4) / (3 \cdot 2) = 20$. Un algoritmo esamina i bit del vettore uno per volta, e si ferma in corrispondenza del secondo bit pari a **1**. Sia $A_k = \{\text{l'algoritmo si ferma al passo } k\text{-esimo}\}$, con $2 \leq k \leq 5$.

(i) Risulta:

$$P(A_2) = \frac{\binom{2}{2}\binom{4}{1}}{\binom{6}{3}} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}, \quad P(A_3) = \frac{\binom{2}{1}\binom{1}{1}\binom{3}{1}}{\binom{6}{3}} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10},$$
$$P(A_4) = \frac{\binom{3}{1}\binom{1}{1}\binom{2}{1}}{\binom{6}{3}} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}, \quad P(A_5) = \frac{\binom{4}{1}\binom{1}{1}\binom{1}{1}}{\binom{6}{3}} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}.$$

Sia $B = \{\text{il bit successivo al secondo } \mathbf{1} \text{ è pari a } \mathbf{0}\}$.

(ii) Si ricava:

$$P(B|A_2) = \frac{3}{4}, \quad P(B|A_3) = \frac{2}{3}, \quad P(B|A_4) = \frac{1}{2}, \quad P(B|A_5) = 0.$$

(iii) Pertanto, per la formula delle alternative, la probabilità che il bit successivo al secondo **1** sia pari a **0** è

$$P(B) = \sum_{k=2}^5 P(B|A_k)P(A_k) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} + 0 \cdot \frac{1}{5} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$$

Esercizio 2 Sia X una variabile aleatoria continua avente funzione di distribuzione

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}(3-x), & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

(i) La densità di probabilità di X è

$$f(x) = \frac{d}{dx}F(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x\left(1 - \frac{x}{2}\right), & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(ii) Il valore atteso di X è:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^2 x \frac{3}{2}x \left(1 - \frac{x}{2}\right) dx = \left[\frac{x^3}{2} - \frac{3}{16}x^4 \right]_0^2 = \frac{8}{2} - 3 = 1.$$

(iii) Si ha

$$P(X > 1 | X > 1/2) = \frac{P(\{X > 1\} \cap \{X > 1/2\})}{P(X > 1/2)} = \frac{P(X > 1)}{P(X > 1/2)} = \frac{1 - F(1)}{1 - F(1/2)},$$

quindi

$$P(X > 1 | X > 1/2) = \frac{1 - F(1)}{1 - F(1/2)} = \frac{1 - 1/2}{1 - 5/32} = \frac{16}{27} = 0,5926.$$

(iv) Analogamente, se Z è una variabile aleatoria normale standard, si ha

$$P(Z > 1 | Z > 1/2) = \frac{1 - F_Z(1)}{1 - F_Z(1/2)} = \frac{1 - \Phi(1)}{1 - \Phi(1/2)} = \frac{1 - 0,8413}{1 - 0,6915} = \frac{0,1587}{0,3085} = 0,5144.$$

Esercizio 3 Risulta

ω	X	Y	ω	X	Y	ω	X	Y	ω	X	Y
0000	0	0	0100	1	0	1000	1	0	1100	2	1
0001	1	0	0101	2	1	1001	2	1	1101	3	3
0010	1	0	0110	2	0	1010	2	1	1110	3	2
0011	2	0	0111	3	1	1011	3	2	1111	4	4

(i) Quindi la distribuzione congiunta di (X, Y) e le distribuzioni marginali di X e Y sono

$x \backslash y$	0	1	2	3	4	$p_X(x)$
0	1/16	0	0	0	0	1/16
1	4/16	0	0	0	0	4/16
2	2/16	4/16	0	0	0	6/16
3	0	1/16	2/16	1/16	0	4/16
4	0	0	0	0	1/16	1/16
$p_Y(y)$	7/16	5/16	2/16	1/16	1/16	1

(ii) X e Y non sono indipendenti: ad esempio $p(0, 0) = 1/16 \neq p_X(0) \cdot p_Y(0) = (1/16)(7/16)$.

(iii) Si ha

$$P(X = Y) = \sum_{k=0}^4 p(k, k) = \frac{1}{16} + 0 + 0 + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16},$$

$$E[(X - Y)^2] = \sum_{k=0}^4 \sum_{h=0}^4 (k - h)^2 p(k, h) = \frac{3}{16} \cdot 0 + \frac{10}{16} \cdot 1 + \frac{3}{16} \cdot 4 = \frac{11}{8} = 1,375.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 10/2/2016

Esercizio 1 (i) Si ha $P(\bar{A}) = P(\{\text{nessun bit ha valore } \mathbf{1}\})$, e quindi

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad P(B) = P(\mathbf{00}) + P(\mathbf{11}) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2},$$

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) = \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad P(A \cap B) = P(B) - P(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

(ii) Risulta $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$ per ogni $n \geq 2$, quindi A e B non sono indipendenti.

(iii) Si ha

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1,$$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - \left[\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Esercizio 2 (i) Essendo X una variabile aleatoria continua avente densità

$$f(x) = \frac{1}{2} - cx \quad \text{per } 0 < x < 1$$

si ha $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ per

$$1 = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - cx\right) dx = \left[\frac{x}{2} - c\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - c\frac{1}{2}$$

ossia per $c = -1$, e in tal caso $f(x) \geq 0$ per ogni x reale.

(ii) Per la funzione di distribuzione $F(x) = P(X \leq x)$ si ha:

$F(x) = 0$ per $x < 0$;

$$F(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{2} + t\right) dt = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} \quad \text{per } 0 \leq x < 1;$$

$F(x) = 1$ per $x \geq 1$.

(iii)

$$E(X) = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x \left(\frac{1}{2} + x\right) dx = \left[\frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{7}{12} = 0,58\bar{3}.$$

(iv)

$$P\left(X > \frac{1}{4} \mid X \leq \frac{1}{2}\right) = \frac{P\left(\frac{1}{4} < X \leq \frac{1}{2}\right)}{P\left(X \leq \frac{1}{2}\right)} = \frac{F(1/2) - F(1/4)}{F(1/2)} = \frac{1/4 + 1/8 - 1/8 - 1/32}{1/4 + 1/8} = \frac{7}{12}.$$

Esercizio 3 (i) La funzione di probabilità congiunta $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$ si ricava notando che

$$\begin{aligned}
 P(X = 0, Y = 1) &= P(BBB) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{1}{20} \\
 P(X = 1, Y = 1) &= P(BBN) + P(BNB) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 3}{6 \cdot 5 \cdot 4} + \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{6}{20} \\
 P(X = 2, Y = 1) &= P(BNN) = \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{20} \\
 P(X = 1, Y = 2) &= P(NBB) = \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{20} \\
 P(X = 2, Y = 2) &= P(NBN) = \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{20} \\
 P(X = 2, Y = 3) &= P(NNB) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 3}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{20} \\
 P(X = 3, Y = 0) &= P(NNN) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{1}{20}
 \end{aligned}$$

$x \backslash y$	0	1	2	3	$p_X(x)$
0	0	1/20	0	0	1/20
1	0	6/20	3/20	0	9/20
2	0	3/20	3/20	3/20	9/20
3	1/20	0	0	0	1/20
$p_Y(y)$	1/20	10/20	6/20	3/20	1

(ii) Essendo

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{x=0}^3 x p_X(x) = \frac{9}{20} + \frac{18}{20} + \frac{3}{20} = \frac{3}{2} \\
 E(Y) &= \sum_{y=0}^3 y p_Y(y) = \frac{10}{20} + \frac{12}{20} + \frac{9}{20} = \frac{31}{20} \\
 E(X \cdot Y) &= \sum_{x=0}^3 \sum_{y=0}^3 x y p(x, y) = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} + \frac{6}{20} + \frac{12}{20} + \frac{18}{20} = \frac{48}{20}
 \end{aligned}$$

La covarianza di (X, Y) è

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = \frac{48}{20} - \frac{3}{2} \cdot \frac{31}{20} = \frac{3}{40} = 0,075 > 0$$

quindi X e Y sono positivamente correlate, e dunque non sono indipendenti.

(iii) Si ha $P(X = x | Y = 1) = p(x, 1)/p_Y(1) = 2 \cdot p(x, 1)$ per $x = 0, 1, 2, 3$ e pertanto
 $P(X = 0 | Y = 1) = 1/10$,
 $P(X = 1 | Y = 1) = 6/10$,
 $P(X = 2 | Y = 1) = 3/10$,
 $P(X = 3 | Y = 1) = 0$.

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 5/4/2016

Esercizio 1 Definiamo i seguenti eventi: $A = \{w_1 < w_2 < w_3\}$ e $B_k = \{w_1 = k\}$; risulta:

(i)

$$P(A) = \frac{\binom{5}{3}}{5^3} = \frac{10}{125} = \frac{2}{25} = 0,08$$

(ii)

$$P(B_1 | A) = \frac{P(B_1 \cap A)}{P(A)} = \frac{\binom{1}{1} \binom{4}{2} / 5^3}{\binom{5}{3} / 5^3} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$P(B_2 | A) = \frac{P(B_2 \cap A)}{P(A)} = \frac{\binom{1}{1} \binom{3}{2} \binom{1}{0} / 5^3}{\binom{5}{3} / 5^3} = \frac{3}{10} = 0,3$$

$$P(B_3 | A) = \frac{P(B_3 \cap A)}{P(A)} = \frac{\binom{2}{0} \binom{1}{1} \binom{2}{2} / 5^3}{\binom{5}{3} / 5^3} = \frac{1}{10} = 0,1$$

(iii)

$$\sum_{i=1}^3 P(B_i | A) = \frac{6 + 3 + 1}{10} = 1.$$

Esercizio 2 (i) Si ha

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{per } x \geq 0$$

e $f(x) = 0$ altrimenti.

(ii) Risulta

$$E[V(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} V(x) f(x) dx = \int_0^1 (x+1) \frac{1}{(x+1)^2} dx = \ln(x+1) \Big|_0^1 = \ln 2 = 0,6931.$$

(iii) Poiché per $x \geq 0$ risulta

$$P(X > x) = 1 - F(x) = 1 - \frac{x}{x+1} = \frac{1}{x+1},$$

$$P(X > 2x | X > x) = \frac{P(X > 2x)}{P(X > x)} = \frac{1/(2x+1)}{1/(x+1)} = \frac{x+1}{2x+1},$$

si ha

$$P(X > 2x | X > x) \geq P(X > x) \iff \frac{x+1}{2x+1} \geq \frac{1}{x+1} \iff x^2 + 2x + 1 \geq 2x + 1$$

e quindi la condizione è soddisfatta per ogni $x \geq 0$.

Esercizio 3

ω	X	Y	ω	X	Y
0 0 0 0	0	1	1 0 0 0	1	0
0 0 0 1	1	0	1 0 0 1	2	1
0 0 1 0	1	0	1 0 1 0	2	0
0 0 1 1	2	0	1 0 1 1	3	0
0 1 0 0	1	0	1 1 0 0	2	0
0 1 0 1	2	0	1 1 0 1	3	0
0 1 1 0	2	1	1 1 1 0	3	0
0 1 1 1	3	0	1 1 1 1	4	1

(i) Quindi

$x \backslash y$	0	1	$p_x(x)$
0	0	1/16	1/16
1	4/16	0	4/16
2	4/16	2/16	6/16
3	4/16	0	4/16
4	0	1/16	1/16
$p_Y(y)$	3/4	1/4	1

(ii) Essendo

$$p(0,0) = 0 \neq p_X(0)p_Y(0) = \frac{1}{16} \cdot \frac{3}{4},$$

si ha che X e Y non sono indipendenti.

(iii) X ha distribuzione binomiale, quindi

$$E(X) = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2.$$

Inoltre

$$E(Y) = \frac{1}{4}, \quad E(XY) = 2 \cdot 1 \cdot \frac{2}{16} + 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{2}.$$

Pertanto

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{4} = 0,$$

da cui segue che il coefficiente di correlazione di (X, Y) è nullo.

(iv) Si ha

$$P(X + Y \leq 1 | X + Y \leq 3) = \frac{P(X + Y \leq 1)}{P(X + Y \leq 3)} = \frac{\frac{1}{16} + \frac{4}{16}}{\frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{4}{16} + \frac{2}{16} + \frac{4}{16}} = \frac{1}{3}.$$

Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
RISOLUZIONE DEGLI ESERCIZI

Fisciano, 27/6/2016

Esercizio 1 Consideriamo i seguenti eventi: $B_i = \{\text{viene scelta la moneta } M_i\}$, $i = 1, 2$, e $A = \{\text{nei tre lanci della moneta si realizza 2 volte testa ed 1 volta croce}\}$; poiché $P(B_1) = P(B_2) = 1/2$, risulta:

(i)

$$P(B_1 | A) = \frac{P(A | B_1)P(B_1)}{P(A | B_1)P(B_1) + P(A | B_2)P(B_2)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \left[\binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{2} \right]}{\frac{1}{2} \cdot \left[\binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{2} + \binom{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^2 \frac{3}{5} \right]} = \frac{125}{221};$$

(ii)

$$P(B_2 | A) = \frac{P(A | B_2)P(B_2)}{P(A | B_1)P(B_1) + P(A | B_2)P(B_2)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \left[\binom{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^2 \frac{3}{5} \right]}{\frac{1}{2} \cdot \left[\binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{2} + \binom{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^2 \frac{3}{5} \right]} = \frac{96}{221}.$$

Esercizio 2 (i) La distribuzione di probabilità di X è data da

$$P(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 3) = \frac{1}{8}, \quad P(X = -2) = \frac{1}{8}.$$

(ii) La funzione di distribuzione di X è

$$F(x) = 0 \text{ per } x < -2,$$

$$F(x) = 1/8 \text{ per } -2 \leq x < 1,$$

$$F(x) = 5/8 \text{ per } 1 \leq x < 2,$$

$$F(x) = 7/8 \text{ per } 2 \leq x < 3,$$

$$F(x) = 1 \text{ per } x \geq 3.$$

(iii) Si ha:

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{8} - 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{9}{8}$$

$$E(X^2) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{1}{8} + 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{25}{8}$$

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 25/8 - (9/8)^2 = \frac{119}{64},$$

e quindi

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = \frac{\sqrt{119}}{8},$$

Esercizio 2 (i) La distribuzione congiunta è data da:

$$P(X = x, Y = y) = \frac{\binom{4}{x} \binom{5}{y} \binom{3}{3-x-y}}{\binom{12}{3}}, \quad 0 \leq x + y \leq 3$$

Quindi

$x \backslash y$	0	1	2	3	$p_x(x)$
0	1/220	15/220	30/220	10/220	56/220
1	12/220	60/220	40/220	0	112/220
2	18/220	30/220	0	0	48/220
3	4/220	0	0	0	4/220
$p_Y(y)$	35/220	105/220	70/220	10/220	1

$$P(X = x) = \frac{\binom{4}{x} \binom{8}{3-x}}{\binom{12}{3}}, \quad 0 \leq x \leq 3$$

$$P(Y = y) = \frac{\binom{5}{y} \binom{7}{3-y}}{\binom{12}{3}}, \quad 0 \leq y \leq 3$$

(ii) La covarianza è data da

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = -15/44,$$

essendo

$$E(X \cdot Y) = \frac{60}{220} + \frac{80}{220} + \frac{60}{220} = \frac{200}{220},$$

$$E(X) = \frac{112 + 96 + 12}{220} = 1, \quad E(Y) = \frac{105 + 140 + 30}{220} = \frac{275}{220}.$$

Inoltre,

$$E(X^2) = \frac{112 + 36 + 192}{220} = \frac{340}{220}, \quad E(Y^2) = \frac{105 + 280 + 90}{220} = \frac{95}{44}.$$

e quindi

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{6}{11}, \quad \text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{105}{176}.$$

Pertanto

$$\rho(X, Y) = -\frac{15/44}{\sqrt{6/11 \cdot 105/176}} = -\sqrt{\frac{5}{14}} = -0,598.$$

(iii)

$$P(X < 2 | X + Y \leq 2) = \frac{P(X < 2, X + Y \leq 2)}{P(X + Y \leq 2)}$$

$$= \frac{p_{X,Y}(0,0) + p_{X,Y}(1,0) + p_{X,Y}(0,1) + p_{X,Y}(0,2) + p_{X,Y}(1,1)}{p_{X,Y}(0,0) + p_{X,Y}(1,0) + p_{X,Y}(0,1) + p_{X,Y}(0,2) + p_{X,Y}(1,1) + p_{X,Y}(2,0)} = \frac{59}{68} = 0,867.$$

$$P(X + Y \leq 2 | X \leq 2) = \frac{P(X \leq 2, X + Y \leq 2)}{P(X \leq 2)}$$

$$= \frac{p_{X,Y}(0,0) + p_{X,Y}(1,0) + p_{X,Y}(0,1) + p_{X,Y}(0,2) + p_{X,Y}(1,1) + p_{X,Y}(2,0)}{p_X(0) + p_X(1) + p_X(2)} = \frac{17}{27} = 0,629.$$