


班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____ 周次: 2

一、选择题 (每题 8 分, 共计 48 分, 未写必要过程每题扣 2 分)

1、一弹簧振子, 当把它水平放置时, 它可以作简谐振动。若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上, 试判断下面哪种情况是正确的: ()

- A. 竖直放置可作简谐振动, 放在光滑斜面上不能作简谐振动
- B. 竖直放置不能作简谐振动, 放在光滑斜面上可作简谐振动
- C. 两种情况都可作简谐振动
- D. 两种情况都不能作简谐振动




2、两个同振动方向、同频率、振幅均为 A 的简谐运动合成后, 振幅仍为 $\sqrt{2}A$, 则这两个简谐运动的相位差为 ()

- A. 60° ; B. 90° ;
- C. 120° ; D. 180° ;

3、图中所画的是两个谐振动的振动曲线, 若这两个谐振动是可叠加的, 则合成的余弦振动的初相为 ()

- A. $\pi/2$; B. $\pi/3$;
- C. π ; D. 0 ;



4、自然界中的简谐振动由于受外界条件的影响很难实现, 随着时间的增加振幅在不断减弱, 要想实现等幅振动, 需要施加一个周期性的作用力, 即为受迫振动, 下列关于受迫振动说法正确的是 ()

- A. 当物体发生共振时的, 此时物体发生的是无阻尼振动;
- B. 当物体做受迫振动达到稳定状态时, 振幅和初相位与初始条件有关;
- C. 当物体做受迫振动达到稳定状态时, 振幅和初相位与初始条件无关;
- D. 当物体发生共振时的, 此时共振的频率就是自由振动的频率;

5、当同方向的两个频率相差不大的简谐振动叠加后, 合振动的幅值将随时间作周期性变化, 这种现象称之为“拍”; 两简谐振动 $x_1 = 5\cos(166\pi t + \pi/3)$ 和 $x_2 = 5\cos(164\pi t + \pi/3)$ 同时作用于一个物体上, 合成运动的拍频和周期是 ()

- A. 1Hz, 2s; B. 2Hz, 1s;
- C. 1Hz, 1s; D. 2Hz, 2s;

6、两个同方向的简谐振动 $x_1 = 0.4\cos(100t + \frac{3}{5}\pi)$ 和 $x_2 = 0.6\cos(100t + \varphi)$, 若令两振动合成的振幅为最小, 则 φ 的取值为 ()

- A. $7\pi/5$; B. $\pi/3$;
C. π ; D. $8\pi/5$;

二、填空题 (每空 8 分, 共计 40 分, 未写必要过程每题扣 2 分)

7、两个同方向同频率的简谐振动, 其振动表达式分别为:

$$x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos(5t + \frac{1}{2}\pi) \quad x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi - 5t)$$

它们的合振动的振幅为_____m, 初相为_____rad。

8、两个同方向的简谐振动, 周期相同, 振幅分别为 $A_1 = 0.05m$ 和 $A_2 = 0.07m$, 它们合成为一个振幅为 $A = 0.09m$ 的简谐振动。则这两个分振动的相位差 _____rad。

9、一质点同时参与了两个同方向的简谐振动, 它们的振动方程分别为

$$x_1 = 0.05\cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi) \quad x_2 = 0.05\cos(\omega t + \frac{9}{12}\pi)$$

其合成运动的运动方程为 $x =$ _____。

10、两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 20 cm , 与第一个简谐振动的相位差为 $\phi - \phi_1 = \pi/6$ 。若第一个简谐振动的振幅 $10\sqrt{3}\text{ cm}$, 则第二个简谐振动的振幅为_____cm, 第一、二两个简谐振动的相位差 $\phi_1 - \phi_2$ 为 _____rad。

三、计算题 (共计 12 分, 含必要解题过程)

11、如图为简谐振动 x_1 和 x_2 的振动曲线, 求: x_1 和 x_2 的简谐振动表达式, 两简谐振动同时作用于同一个物体时, 合振动表达式为:

