

CM202 - Cálculo Diferencial e Integral II

28 de Novembro de 2018 - Prova 3

Gabarito

1. 15 Calcule a integral tripla $\iiint_E e^{z/y} dV$, onde E é a região dada por $0 \leq y \leq 1$, $y \leq x \leq 1$ e $0 \leq z \leq xy$.

Solution:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_y^1 \int_0^{xy} e^{z/y} dz dx dy &= \int_0^1 \int_y^1 y e^{z/y} \Big|_{z=0}^{xy} dx dy \\&= \int_0^1 \int_y^1 y(e^x - 1) dx dy \\&= \int_0^1 y(e - e^y - 1 + y) dy \\&= \frac{1}{2}e - \left(y e^y \Big|_0^1 - e^y \Big|_0^1 \right) - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \\&= \frac{e}{2} - \frac{7}{6}.\end{aligned}$$

2. 20 Calcule $\iiint_E z dV$, onde E é a região acima do cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e abaixo da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

Solution: Pode ser resolvido de duas maneiras:

Coordenadas cilíndricas

Em coordenadas cilíndricas $z = r$ e $r^2 + z^2 = 2$. A intersecção é $r = 1$. Então, a região é dada por $0 \leq \theta \leq 2\pi$ e $0 \leq r \leq 1$ e $r \leq z \leq \sqrt{2 - r^2}$. Logo,

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_r^{\sqrt{2-r^2}} z r dz dr d\theta &= \pi \int_0^1 r(2 - r^2 - r^2) dr \\&= 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

Coordenadas esféricas

Em coordenadas esféricas, a limitação do cone é $\varphi = \pi/4$, logo temos $0 \leq \varphi \leq \pi/4$. A limitação da esfera é $\rho = \sqrt{2}$, logo temos $0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$, e $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Logo,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{2}} \rho \cos \varphi \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta &= 2\pi \int_0^{\pi/4} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}/2} u du \frac{\sqrt{2}^4}{4} \\ &= 2\pi \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

3. 20 Calcule $\iiint_E x e^{x^2+y^2+z^2} dV$ onde E é a região dentro da esfera $x^2+y^2+z^2 = 1$ no primeiro octante.

Solution: Temos, trivialmente, $0 \leq \rho \leq 1$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$ e $0 \leq \varphi \leq \pi/2$. Daí,

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \rho \cos \theta \sin \varphi \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi &= \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta \int_0^{\pi/2} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 e^{\rho^2} d\rho \\ &= 1 \times \frac{\pi}{4} \int_0^1 u e^u \frac{du}{2} = \frac{\pi}{8} \left[u e^u \Big|_0^1 - e^u \Big|_0^1 \right] = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

4. 15 Resolva a equação diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{1+x^4}{y x^2 + y^4 x^2}$.

Solution: Separando:

$$(y + y^4) dy = \frac{1+x^4}{x^2} dx = \left(\frac{1}{x^2} + x^2 \right) dx$$

Logo,

$$\frac{y^2}{2} + \frac{y^5}{5} = -\frac{1}{x} + \frac{x^3}{3} + C.$$

5. 15 Resolva o problema de valor inicial $xy' \ln x + y = (\ln x)^2$, $x > e$, $y(e) = \frac{4}{3}$.

Solution: Primeiro, divimos por $x \ln x$, fazendo

$$y' + \frac{1}{x \ln x} y = \frac{\ln x}{x}.$$

Agora, usamos o fator integrante

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{1}{x \ln x} dx\right) = \exp\left(\int \frac{1}{u} du\right) = \exp(\ln u) = u = \ln x.$$

Assim, obtemos $(\mu y)' = \mu q$, i.e.,

$$(y \ln x)' = \frac{(\ln x)^2}{x}$$

de modo que

$$y \ln x = \int \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \int u^2 du = \frac{1}{3} u^3 + C = \frac{1}{3} (\ln x)^3 + C$$

isto é,

$$y(x) = \frac{1}{3} (\ln x)^2 + \frac{C}{\ln x}.$$

Pela condição $y(e) = \frac{4}{3}$, temos

$$\frac{4}{3} = \frac{1}{3} + C,$$

ou seja $C = 1$. Solução:

$$y(x) = \frac{1}{3} (\ln x)^2 + \frac{1}{\ln x}.$$

6. 15 Resolva o problema de valor de contorno $y'' + 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$.

Solution: A equação auxiliar é $r^2 + 2r + 2 = 0$, que tem raízes $r = -1 \pm i$. Sendo assim, a solução tem a forma

$$y(x) = e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x)$$

Temos

$$y'(x) = -e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + e^{-x}(-c_1 \sin x + c_2 \cos x)$$

Usando as condições de contorno, temos

$$\begin{array}{llll} y(0) = 2 & \Rightarrow & c_1 = 2 \\ y'(0) = 1 & \Rightarrow & -c_1 + c_2 = 1 & \Rightarrow & c_2 = 3 \end{array}$$

Solução

$$y(x) = e^{-x}(2 \cos x + 3 \sin x).$$