Il 10eLotto ogni 5 minuti: valore atteso esatto, rischio e verifica statistica delle estrazioni

Gabriele Campanello[1] e Claude[2,*]

[1] *Università degli Studi di Milano, I-20122 Milano, Italia*
[2] *Anthropic, San Francisco, California, USA*

(3 ottobre 2026)

Il 10eLotto ogni 5 minuti è un gioco a quota fissa in cui si scelgono da 1 a 10 numeri su 90 e se ne estraggono 20, con tre opzioni a pagamento (Numero Oro, Doppio Oro, Extra). Ricaviamo la distribuzione esatta della vincita per tutte le 60 giocate possibili combinando la distribuzione ipergeometrica dei punti, la simmetria dell'ordine di estrazione e l'estrazione Extra condizionata. Nessuna giocata supera un ritorno al giocatore del 71.1% (6 numeri con Doppio Oro ed Extra); il gioco base restituisce tra il 62.5% e il 66.7%. Le opzioni alzano il ritorno perché il loro rendimento marginale, fino all'80%, supera quello del gioco base, ma moltiplicano la spesa e quindi la perdita per unità di tempo. Nelle giocate con molti numeri fino al 37% del valore atteso proviene da eventi con probabilità inferiore a 10^{-3}, che il giocatore non osserva quasi mai. Simulazioni Monte Carlo confermano il calcolo esatto e quantificano la durata di un budget. Su 768 estrazioni reali i test di uniformità, corretti per l'estrazione senza reimmissione, e di indipendenza non rivelano scostamenti dal caso: i numeri "ritardatari" escono con frequenza 2/9 come tutti gli altri.

I. INTRODUZIONE

I giochi numerici a quota fissa sono un banco di prova naturale per il calcolo delle probabilità: le regole sono pubbliche, lo spazio degli eventi è finito e ogni grandezza di interesse si calcola in forma chiusa [1, 2]. Il 10eLotto con estrazioni ogni cinque minuti aggiunge alla struttura dei giochi di tipo keno due elementi che ne complicano l'analisi: premi che dipendono dall'*ordine* di estrazione (Numero Oro e Doppio Oro) e una seconda estrazione, l'Extra, sui numeri non usciti nella prima. Con 288 estrazioni al giorno, inoltre, la frequenza di gioco diventa rilevante quanto il margine del banco.

Due domande motivano questo lavoro. La prima: quanto restituisce ciascuna giocata, e a quale rischio? La tabella dei premi è stampata sul retro della schedina [3], ma il ritorno atteso non è dichiarato giocata per giocata. La seconda: le estrazioni reali sono compatibili con un sorteggio uniforme e privo di memoria? La convinzione che un numero "in ritardo" debba uscire, la fallacia del giocatore, è ben documentata [4–6].

II. MODELLO

Il giocatore sceglie $n \in \{1, \dots, 10\}$ numeri tra $N = 90$; ne vengono estratti $D = 20$ senza reimmissione e il premio dipende dal numero k di numeri indovinati (*punti*). Alla giocata base, che costa una posta, si possono aggiungere tre opzioni, ciascuna al costo di una posta. Con il *Numero Oro*, se il primo estratto è tra i numeri giocati si applica una colonna di premi più alta. Il *Doppio Oro*, che presuppone il Numero Oro e porta la spesa a tre poste, estende il meccanismo ai primi due estratti: se sono entrambi giocati vale una terza colonna, se lo è uno solo quella del Numero Oro. Tra le tre colonne si incassa solo il premio massimo. Con l'*Extra* si estraggono $D_X = 15$ ulteriori numeri tra i 70 non usciti, e il premio corrispondente, letto su una quarta colonna, si *somma* al precedente. Ne risultano $10 \times 6 = 60$ giocate, di costo $c \in \{1, 2, 3, 4\}$ poste. Usiamo i premi netti per 1 € riportati sulla schedina [3] e riprodotti nell'Appendice A; poiché scalano linearmente con la posta, tutti i risultati sono per posta unitaria.

Tre ingredienti determinano la vincita. Il numero di punti è ipergeometrico [1],

$$P(k) = \binom{D}{k}\binom{N-D}{n-k}\Big/\binom{N}{n}. \tag{1}$$

L'ordine di estrazione dei 20 numeri è una permutazione casuale uniforme, quindi, dati k punti,

$$P(1^{\text{o}}\text{ giocato}\,|\,k) = \frac{k}{D}, \quad P(\text{primi due giocati}\,|\,k) = \frac{k(k-1)}{D(D-1)}. \tag{2}$$

Infine gli $n-k$ numeri giocati e non usciti sono tra i 70 rimasti, da cui si estraggono i 15 dell'Extra: i punti Extra j sono a loro volta ipergeometrici,

$$P(j\,|\,k) = \binom{n-k}{j}\binom{N-D-n+k}{D_X-j}\Big/\binom{N-D}{D_X}, \tag{3}$$

e, dato k, indipendenti dallo stato s dei numeri Oro. Detti $a_s(n,k)$ il premio della parte principale (il massimo tra le colonne attivate da s) e $x(n,j)$ il premio Extra, la vincita V ha distribuzione

$$P(V=v) = \sum_{k,s,j} P(k)\,P(s\,|\,k)\,P(j\,|\,k)\,\delta_{v,\,a_s(n,k)+x(n,j)}. \tag{4}$$

Da essa seguono il valore atteso $W = \mathbb{E}[V]$, la deviazione standard σ e ogni probabilità di coda. Il ritorno al giocatore è RTP $= W/c$; il margine del banco è $1 -$ RTP.

III. VALORE ATTESO

La Fig. 1(a) e la Tab. I riportano l'RTP delle 60 giocate. Tutti i valori sono compresi tra il 62.49% e il 71.10%: nessuna giocata ha valore atteso positivo, e la migliore perde in

* Modello di intelligenza artificiale.




Figura 1. (a) Ritorno al giocatore (RTP) delle 60 giocate in funzione dei numeri giocati n: il colore distingue gioco base, Numero Oro e Doppio Oro, il tratteggio indica l'aggiunta dell'Extra. (b) RTP marginale di ciascuna componente: vincita attesa aggiunta per ogni euro speso sull'opzione. Le linee tratteggiate segnano 2/3.

Tabella I. RTP esatto (in %) di tutte le giocate, da Eq. (4). In grassetto il massimo e il minimo.

Opzioni	costo	$n = 1$	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Base	1	66.67	66.42	66.31	66.25	65.24	**62.49**	66.48	65.45	66.04	63.37
Numero Oro	2	66.67	68.34	67.78	67.42	67.81	66.43	66.98	66.21	66.42	65.58
Doppio Oro	3	66.67	70.01	69.24	68.90	69.50	69.45	69.89	69.85	70.42	70.30
Base + Extra	2	66.67	68.23	65.93	67.23	67.63	69.27	67.28	69.25	66.44	65.71
Numero Oro + Extra	3	66.67	68.91	67.03	67.68	68.55	69.64	67.34	68.49	66.56	66.40
Doppio Oro + Extra	4	66.67	70.02	68.31	68.72	69.63	**71.10**	69.44	70.65	69.53	69.74

media 28.9 centesimi per euro. Il massimo si ha con 6 numeri, Doppio Oro ed Extra; il minimo con 6 numeri in gioco base.

Per $n = 1$ tutte le opzioni rendono esattamente 2/3. Il gioco base paga 3 con probabilità 20/90; con il Numero Oro si incassa 63 se il numero giocato è il primo estratto (probabilità 1/90) e 3 se è uno degli altri 19, cioè 4/3 su una spesa di 2; l'Extra paga 4 con probabilità 15/90. La tabella dei premi è dunque costruita attorno a un ritorno di riferimento di due terzi, da cui le giocate con $n \geq 2$ si discostano di qualche punto.

Rendimento marginale. La Fig. 1(b) spiega perché le opzioni alzano l'RTP: mostra la vincita attesa aggiunta da ogni euro speso su un'opzione. Il gioco base rende tra il 62.5% e il 66.7%; l'euro del Numero Oro tra il 66.7% e il 70.4%; quello dell'Extra tra il 65.5% e il 76.1%, con un andamento irregolare che riflette la struttura a gradini dei premi. L'euro del Doppio Oro è il più generoso e cresce con n fino al 79.8% per $n = 10$: per l'Eq. (2) la probabilità che i primi due estratti siano entrambi giocati cresce come $k(k-1)$ e premia chi gioca molti numeri. L'RTP di una giocata composta è la media dei rendimenti marginali delle sue componenti pesata con i costi. Ne segue che nemmeno aumentando a piacere la posta dell'Extra rispetto a quella base si supererebbe il suo rendimento marginale, al più 76.1%.

Origine del valore atteso. A parità di RTP due giocate possono distribuire il valore atteso in modo molto diverso. La Fig. 2 scompone la vincita attesa del gioco base nei contributi $P(k)\,a(n,k)$. Per $n \leq 4$ essa viene da eventi frequenti. Al crescere di n una quota crescente è concentrata in eventi con probabilità inferiore a 10^{-3}: il 24% per $n = 7$ e il 37.5% per $n = 10$. Chi gioca 10 numeri per qualche centinaio di estrazioni sperimenta quindi, tipicamente, un ritorno ben inferiore al 63.4% nominale: la parte mancante è "depositata" in premi che non vedrà.

IV. RISCHIO

La probabilità di "vincere qualcosa" è un indicatore fuorviante, perché molti premi sono inferiori alla spesa: con 10




Figura 2. Contributo di ciascun numero di punti k alla vincita attesa del gioco base.




Figura 3. Rischio. (a) Probabilità che la vincita copra almeno il costo della giocata. (b) Volatilità σ/c. In (a) e (b) linee continue: senza Extra; tratteggiate: con Extra. (c) Funzione di sopravvivenza della vincita, in multipli della spesa, per cinque giocate.

numeri, Doppio Oro ed Extra si incassa qualcosa nel 44% dei casi, ma solo nel 18% si recupera il costo. La Fig. 3(a) riporta quindi la probabilità di rientro $P(V \geq c)$: è quasi sempre tra il 5% e il 30%, con massimi per il gioco base a $n = 5$ (30.7%) e per $n = 1$ con Extra (38.9%). La volatilità σ/c [Fig. 3(b)] è dell'ordine dell'unità fino a $n = 5$ e cresce di due ordini di grandezza tra $n = 5$ e $n = 10$, per effetto dei premi da 10^6 volte la posta. La coda completa è in Fig. 3(c): vincere almeno 100 volte la spesa ha probabilità dell'ordine di 10^{-4}, vincerne 10^4 meno di 10^{-6}.

La Tab. II traduce le probabilità dei premi massimi in tempi di attesa. Il milione con 10 numeri ha probabilità 3.2×10^{-8}: giocando tutte le estrazioni l'attesa media è di 294 anni, con una spesa attesa di circa 31 milioni di euro.

V. SIMULAZIONI

Per verificare l'Eq. (4) simuliamo direttamente il sorteggio [7]: ogni estrazione è una permutazione casuale di $1, \ldots, 90$, i cui primi 20 elementi sono gli estratti nell'ordine e i successivi 15 l'Extra. Su 4×10^5 giocate per ciascuna di sei giocate che coprono tutte le opzioni, la vincita media dista da quella esatta meno di 1.3 errori standard e la probabilità di vincita coincide entro 10^{-3}. L'errore standard va calcolato con la σ teorica, perché quella campionaria non vede i premi più grandi. Per 10 numeri con Doppio Oro l'errore su 4×10^5 giocate è ancora 0.88 € su una vincita attesa di 2.11 €: stimare l'RTP di queste giocate dall'esperienza è di fatto impossibile.

Durata di un budget. Un giocatore parte con 100 € e gioca a ogni estrazione finché può [Fig. 4(a,b)]. Con un numero in gioco base il budget dura in mediana 292 estrazioni, circa un giorno di gioco continuo; con 10 numeri 165 estrazioni; con 6 numeri, Doppio Oro ed Extra, la giocata dall'RTP più alto, 58 estrazioni, meno di cinque ore, e dopo un giorno il 97.5% dei giocatori ha esaurito il budget. Il paradosso è solo apparente. La perdita attesa per estrazione è $c\,(1 - \text{RTP})$: 0.33 €, 0.37 € e 1.16 € nei tre casi, cioè 4.0, 4.4 e 13.9 € l'ora a ritmo continuo. Il margine percentuale conta, ma in un gioco che si ripete ogni cinque minuti la spesa per unità di tempo conta di più.

Legge dei grandi numeri. La Fig. 4(c) mostra la convergenza dell'RTP realizzato. Con un numero la mediana raggiunge il valore esatto in poche centinaia di giocate. Con 10 numeri è ancora attorno al 50% dopo 10^3 giocate e al 56% dopo 2×10^4, contro il 63.4% esatto: la media converge, ma la mediana, che descrive il giocatore tipico, lo fa solo quando i premi rari diventano frequenti sulla scala del campione. Dopo 1˙000 giocate è in attivo circa il 5% di chi gioca 10 numeri: chi ha centrato un premio alto. Poiché il valore atteso è lineare, suddividere la spesa in più schedine o in sistemi modifica la varianza, non l'RTP.

Tabella II. Premio massimo del gioco base: probabilità di indovinare tutti gli n numeri, attesa media giocando tutte le 288 estrazioni giornaliere e premio per 1 €.

n	1 su	attesa media	premio (€)
1	4.5	23 min	3
2	21	1.8 h	14
3	103	8.6 h	45
4	527	1.8 giorni	90
5	2˙835	9.8 giorni	140
6	16˙063	56 giorni	1˙000
7	96˙380	335 giorni	1˙600
8	615˙349	5.8 anni	10˙000
9	4˙204˙885	40 anni	100˙000
10	30˙963˙246	294 anni	1˙000˙000

VI. ESTRAZIONI REALI

Il campione comprende $T = 768$ estrazioni del 28 e 30 settembre e del 1º ottobre 2026 (252, 228 e 288), raccolte da un sito di statistiche [8] che pubblica i 20 numeri, i due numeri Oro e i 15 Extra. Ogni estrazione è stata validata (20 numeri distinti in $1, \ldots, 90$; numeri Oro distinti e compresi tra gli estratti; 15 Extra distinti e disgiunti dai 20): tutte superano i controlli, e per una manca l'Extra. Le prime due giornate sono incomplete, sicché il campione consiste di due bloc-




Figura 4. Simulazioni per tre giocate (posta 1 €, una giocata a ogni estrazione). (a) Budget iniziale di 100 €: dieci traiettorie per giocata (linee sottili) e mediana su 4·000 giocatori (linee spesse). (b) Frazione di giocatori che hanno esaurito il budget. (c) RTP realizzato: mediana e intervallo tra 10° e 90° percentile su 3·000 giocatori; linee punteggiate: RTP esatto.

chi di estrazioni consecutive, di 252 e 516 elementi; i test su estrazioni successive sono calcolati dentro i blocchi.

Uniformità. Se il sorteggio è uniforme ogni numero esce con probabilità $p = D/N = 2/9$ e il numero atteso di uscite è $E = Tp$. Il test χ^2 di Pearson non si applica però direttamente: i 20 numeri sono estratti senza reimmissione, quindi i conteggi O_i sono correlati negativamente, con $\mathrm{Var}(O_i) = Tp(1-p)$ e $\mathrm{Cov}(O_i, O_j) = -Tp(1-p)/(N-1)$. La somma $\sum_i (O_i - E)^2/E$ ha allora valore atteso $N - D = 70$ anziché $N - 1$, e la statistica da confrontare con una χ^2 a 89 gradi di libertà è [9, 10]

$$X^2 = \frac{N-1}{N-D} \sum_{i=1}^{N} \frac{(O_i - E)^2}{E}. \tag{5}$$

La simulazione conferma la correzione: sotto l'ipotesi nulla X^2 ha media 88.97 e varianza 176, contro 89 e 178 della χ^2_{89} [Fig. 5(b)].

Per i dati reali $X^2 = 82.2$ ($p = 0.68$). Senza correzione si otterrebbe 64.6 e si concluderebbe a torto che i dati sono "troppo uniformi". Quattro numeri cadono fuori dalla banda $\pm 2\sigma$, quanti ne prevede il caso ($90 \times 0.0455 = 4.1$) [Fig. 5(a)]. Il primo e il secondo estratto, cioè i numeri Oro, sono uniformi su 90 valori: $\chi^2_{89} = 94.7$ ($p = 0.32$) e 71.5 ($p = 0.91$). Per l'Extra vale la stessa correzione con D_X al posto di D: $X^2 = 85.4$, $p = 0.59$. La somma dei 20 estratti ha media 906.5 e deviazione standard 101.3, contro 910 e 103.0 attesi (test t, $p = 0.33$); il numero di pari tra i 20 è compatibile con l'ipergeometrica ($\chi^2_{10} = 10.4$, $p = 0.41$).

Indipendenza e ritardatari. Se le estrazioni sono indipendenti, i numeri in comune tra due estrazioni consecutive sono ipergeometrici con media $D^2/N = 4.44$: sulle 766 coppie disponibili la media è 4.45 ($\chi^2_8 = 8.9$, $p = 0.35$). Il test più diretto della fallacia del giocatore riguarda i *ritardi*. In assenza di memoria il ritardo g di un numero segue la legge geometrica $P(g) = p(1-p)^g$, di media 3.5, e la probabilità che un numero esca alla prossima estrazione non dipende dal suo ritardo attuale. La distribuzione osservata segue la legge geometrica su quattro ordini di grandezza, con media 3.46 [Fig. 6(a)]. Condizionando al ritardo [Fig. 6(b)], su circa 68·000 coppie (numero, estrazione) la frequenza di uscita è compatibile con $2/9 = 22.2\%$ in tutte le classi, dal 22.1% dei numeri appena usciti al 21.3% (446 casi) di quelli in ritardo di 20 o più estrazioni; trattando le classi come indipendenti, $\chi^2_7 = 3.6$ ($p = 0.83$). Un numero in ritardo non è "maturo": esce con la stessa probabilità degli altri.

Strategie di scelta. Confrontiamo infine quattro modi di scegliere 10 numeri prima di ogni estrazione: numeri fissi; i 10 più frequenti nelle ultime 50 estrazioni; i 10 con il ritardo più alto; 10 numeri casuali. Tutte danno tra 2.22 e 2.24 punti medi, con incertezza ±0.09, contro i $20/9 = 2.22$ teorici [Fig. 6(c)]: sono indistinguibili tra loro e dalla teoria. I saldi di Fig. 6(d) differiscono solo per fluttuazione, in particolare per un premio da 150 € incassato dalla strategia casuale. Tutte realizzano un RTP tra il 37% e il 60%, inferiore al 63.4% esatto: è l'effetto della Sez. III, per cui oltre un terzo del valore atteso della giocata a 10 numeri risiede in eventi che in 718 estrazioni non si verificano.

VII. CONCLUSIONI

Abbiamo calcolato in forma esatta la distribuzione della vincita di tutte le 60 giocate del 10eLotto ogni 5 minuti. Il ritorno al giocatore varia tra il 62.5% e il 71.1%: non esiste una giocata a valore atteso positivo né una combinazione di poste che la produca. Le opzioni migliorano il ritorno percentuale perché rendono al margine più del gioco base, ma triplicano o quadruplicano la spesa: la giocata con l'RTP più alto è anche quella che fa perdere di più per unità di tempo, circa 14 € l'ora a posta unitaria. Nelle giocate con molti numeri una frazione rilevante del valore atteso è confinata in eventi rarissimi, e il ritorno sperimentato resta sotto quello nominale.

Le 768 estrazioni analizzate sono compatibili con un sorteggio uniforme e privo di memoria in tutti i test eseguiti; ritardi e frequenze passate non hanno potere predittivo. La scelta dei numeri è dunque irrilevante: il valore atteso dipende solo da quanti numeri si giocano e con quali opzioni, e la perdita complessiva è il prodotto tra spesa totale e margine del ban-




Figura 5. Uniformità. (a) Uscite di ciascun numero in 768 estrazioni; linea: valore atteso $20T/90 \simeq 170.7$; banda grigia: $\pm 2\sigma$; in arancione i quattro numeri fuori banda. (b) Distribuzione nulla della statistica X^2 di Eq. (5) da 4˙000 campioni simulati, densità χ^2_{89} e valore osservato.




Figura 6. Indipendenza. (a) Distribuzione del ritardo, cioè del numero di estrazioni tra due uscite consecutive dello stesso numero (15˙180 ritardi), e legge geometrica di parametro 2/9. (b) Frequenza di uscita alla prossima estrazione in funzione del ritardo attuale, con intervalli al 95%. (c) Punti medi di quattro strategie di scelta di 10 numeri basate sulle estrazioni passate (718 estrazioni, intervalli al 95%); linea tratteggiata: valore teorico 20/9. (d) Saldo cumulato delle stesse strategie a 1 € per estrazione; linea tratteggiata: perdita attesa.

co. Il limite principale dell'analisi empirica è la dimensione del campione: tre giornate rivelano solo deviazioni grossolane. La raccolta dei dati è però automatizzata e cumulativa, e gli stessi test si possono ripetere su archivi di mesi.

RINGRAZIAMENTI

Il secondo autore è un modello linguistico di intelligenza artificiale, che ha contribuito al codice, all'analisi e alla stesura; il primo autore ha ideato lo studio e ne assume la responsabilità. Il lavoro ha finalità didattiche; il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza.

[1] W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, 3rd ed., Vol. 1 (Wiley, New York, 1968).
[2] R. A. Epstein, *The Theory of Gambling and Statistical Logic*, 2nd ed. (Academic Press, Burlington, 2009).
[3] Lottoitalia, 10eLotto: regolamento e tabella dei premi (retro della schedina di gioco), https://www.lotto-italia.it/10elotto, consultato nel settembre 2026.
[4] A. Tversky and D. Kahneman, Belief in the law of small numbers, Psychol. Bull. **76**, 105 (1971).
[5] C. T. Clotfelter and P. J. Cook, The "gambler's fallacy" in lottery play, Manage. Sci. **39**, 1521 (1993).
[6] D. Terrell, A test of the gambler's fallacy: Evidence from pari-mutuel games, J. Risk Uncertain. **8**, 309 (1994).
[7] N. Metropolis and S. Ulam, The Monte Carlo method, J. Am. Stat. Assoc. **44**, 335 (1949).
[8] Archivio delle estrazioni del 10eLotto ogni 5 minuti, https://10elotto5.com, consultato il 3 ottobre 2026.
[9] H. Joe, Tests of uniformity for sets of lotto numbers, Stat. Probab. Lett. **16**, 181 (1993).
[10] C. Genest, R. A. Lockhart, and M. A. Stephens, χ^2 and the lottery, J. R. Stat. Soc. D **51**, 243 (2002).

Appendice A: Tabella dei premi

La Tab. III riporta i premi usati in tutti i calcoli, trascritti dal retro della schedina [3]: sono importi netti in euro per 1 € di posta. Le quattro sezioni corrispondono alle quattro colonne della schedina. La colonna Numero Oro si applica quando il primo estratto è tra i numeri giocati (con il Doppio Oro, quando lo è uno solo dei primi due); la colonna Doppio Oro quando lo sono entrambi. In questi casi si incassa il massimo tra i premi delle colonne attivate e quello del gioco base. La sezione Extra si legge con i punti j realizzati sui 15 numeri Extra, e il premio si somma agli altri. Un trattino indica che la combinazione non paga.

Tabella III. Premi netti (in euro, per 1 € di posta) in funzione dei numeri giocati n e dei punti k, per le quattro colonne della schedina. Trattino: nessun premio.

punti	numeri giocati n									
k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10eLotto (gioco base)										
10										1˙000˙000
9									100˙000	20˙000
8								10˙000	2˙000	1˙000
7							1˙600	800	400	150
6						1˙000	400	200	40	15
5					140	100	40	20	10	5
4				90	15	10	4	–	–	–
3			45	10	4	2	–	–	–	–
2		14	2	1	1	–	–	–	–	–
1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2
Numero Oro										
10										2˙500˙000
9									250˙000	50˙000
8								30˙000	5˙000	2˙500
7							5˙000	2˙000	800	250
6						2˙500	750	450	80	25
5					300	200	75	45	25	20
4				300	30	20	10	10	10	5
3			130	40	20	10	7	5	5	3
2		70	25	15	14	10	7	3	3	3
1	63	25	15	10	10	10	10	8	5	10
Doppio Oro										
10										5˙000˙000
9									500˙000	100˙000
8								100˙000	20˙000	5˙000
7							15˙000	5˙000	2˙000	500
6						6˙000	1˙500	1˙000	200	70
5					1˙000	500	150	100	50	30
4				800	100	50	40	25	25	20
3			300	80	40	25	25	15	15	15
2		250	75	40	25	20	15	10	10	10
Extra										
10										2˙000˙000
9									250˙000	40˙000
8								20˙000	5˙000	2˙000
7							5˙000	2˙000	500	250
6						2˙000	750	450	75	35
5					300	200	75	45	20	20
4				225	30	20	15	10	10	6
3			100	25	10	7	5	3	–	–
2		16	4	2	2	1	–	–	–	–
1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
0	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1