

2020-2021 邵嗣烘 数学分析 (III) 期末考试 (回忆版)

2021.1.12 14:00-16:00

1.(20 分) (1) 叙述并证明 Riemann-Lebesgue 引理.

(2) 对 \mathbb{R} 上的绝对可积函数, Riemann-Lebesgue 引理是否还成立?

2.(10 分) 画出 \mathbb{R} 上函数 $G(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ 的图像.

3.(10 分) 是否存在 $f(x) \in C[0, 1]$, 使得

$$\int_0^1 x f(x) dx = 1, \int_0^1 x^n f(x) dx = 0, n = 0, 2, 3, 4, 5, \dots$$

4.(30 分) 设 $f(x), g(x)$ 是以 2π 为周期且在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积的函数, 集合 S 是所有以 2π 为周期、在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Riemann 定积分等于 1 的连续函数的集合. 定义卷积

$$(f * g)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(x-t)dt.$$

(1) 用 $f(x), g(x)$ 的 Fourier 系数表示出 $(f * g)(x)$ 的 Fourier 系数.

(2) 是否存在一列 $\{f_n(x)\} \subseteq S$, 使得 $\forall g(x)$ 是以 2π 为周期且在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积的函数, 都有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} ((f_n * g)(x))^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} (g(x))^2 dx$$

(3) 对于给定的以 2π 为周期且在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积的函数 $g(x)$, 求 $\sup_{f(x) \in S} \int_{-\pi}^{\pi} ((f * g)(x))^2 dx$.

5.(10 分) 设 $f(x) \in C[a, b], K(x, y) \in C([a, b] \times [a, b])$, 当实参数 λ 满足什么条件时, 积分方程

$$\phi(x) = f(x) + \lambda \int_a^b K(x, y)\phi(y)dy$$

存在唯一解?

6.(20 分) 计算:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x + 1} dx$

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} \ln \left| 2 \sin \frac{x}{2} \right| \cdot \ln \left| 2 \cos \frac{x}{2} \right| dx$