

概率论与数理统计

Guotao He

2025-04-29

目录

| | | |
|----------|-----------------|----------|
| 1 | 概率论的基本概念 | 3 |
| 1.1 | 随机试验 | 3 |
| 1.2 | 样本空间、随机事件 | 3 |
| 1.2.1 | 样本空间 | 3 |
| 1.2.2 | 随机事件 | 3 |
| 1.2.3 | 事件间的关系与事件的运算 | 3 |
| 1.3 | 频率与概率 | 4 |
| 1.3.1 | 频率 | 4 |
| 1.3.2 | 概率 | 4 |
| 1.4 | 等可能概型（古典概型） | 5 |
| 1.5 | 条件概率 | 5 |
| 1.5.1 | 条件概率 | 5 |
| 1.5.2 | 乘法定理 | 5 |
| 1.5.3 | 全概率公式和贝叶斯公式 | 5 |
| 1.6 | 独立性 | 6 |
| 2 | 随机变量及其分布 | 6 |
| 2.1 | 随机变量 | 6 |
| 2.2 | 离散型随机变量及其分布率 | 6 |
| 2.2.1 | (0-1) 分布 | 6 |
| 2.2.2 | 伯努利试验、二项分布 | 7 |
| 2.2.3 | 泊松分布 | 7 |
| 2.3 | 随机变量的分布函数 | 7 |
| 2.4 | 连续型随机变量及其概率密度 | 7 |
| 2.4.1 | 均匀分布 | 7 |
| 2.4.2 | 指数分布 | 8 |
| 2.4.3 | 正态分布 | 8 |
| 2.5 | 随机变量的函数的分布 | 8 |

| | | |
|----------|--------------------|-----------|
| 3 | 多维随机变量及其分布 | 9 |
| 3.1 | 二维随机变量 | 9 |
| 3.2 | 边缘分布 | 10 |
| 3.3 | 条件分布 | 11 |
| 3.4 | 相互独立的随机变量 | 11 |
| 4 | 随机变量的数字特征 | 11 |
| 4.1 | 数学期望 | 11 |
| 4.2 | 方差 | 12 |
| 4.3 | 常见分布的期望和方差 | 13 |
| 4.4 | 协方差及相关系数 | 13 |
| 4.5 | 矩、协方差矩阵 | 14 |
| 5 | 大数定律及中心极限定理 | 14 |
| 5.1 | 大数定律 | 14 |
| 5.2 | 中心极限定理 | 15 |
| 6 | 样本及抽样分布 | 15 |
| 6.1 | 随机样本 | 15 |
| 6.2 | 抽样分布 | 15 |
| 6.2.1 | 三大抽样分布 | 16 |
| 6.2.2 | 正态总体抽样定理 | 16 |
| 7 | 参数估计 | 16 |
| 7.1 | 点估计 | 16 |
| 7.1.1 | 矩估计法 | 16 |
| 7.1.2 | 最大似然估计 | 16 |
| 7.2 | 估计量评价标准 | 17 |
| 7.3 | 区间估计 | 17 |
| 7.4 | 正态总体区间估计 | 17 |

1 概率论的基本概念

1.1 随机试验

- 随机试验：
 1. 可以在相同条件下重复地进行;
 2. 每次试验的可能结果不止一个, 并且能事先明确实验的所有可能结果;
 3. 进行一次实验之前不能确定哪一个结果会出现.

1.2 样本空间、随机事件

1.2.1 样本空间

随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 **样本空间**。

样本空间的元素, 即 E 的每个结果称为 **样本点**。

1.2.2 随机事件

试验 E 的样本空间 S 的子集称为 **随机事件**, 简称 **事件**。

每次试验中, 当且仅当这一子集的一个样本点出现称为 **事件发生**。

有一个样本点组成的单点集称为 **基本事件**。

样本空间 S 包含所有的样本点, 它是 S 自身的子集, 在每次试验中它总是发生的, S 成为 **必然事件**。

空集 \emptyset 不包含任何样本点, 它也作为样本空间的子集, 它在每次试验中都不发生, \emptyset 称为 **不可能事件**。

1.2.3 事件间的关系与事件的运算

1. 若 $A \subset B$, 则称事件 B 包含事件 A , 这指的是事件 A 发生必导致事件 B 发生。若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 即 $A = B$, 则称事件 A 与事件 B 相等。
2. 事件 $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的 **和事件**。当且仅当 A, B 中至少一个发生时, 事件 $A \cup B$ 发生。类似地, 称 $\bigcup_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 的 **和事件**; 称 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 A_1, A_2, \dots 的 **和事件**。
3. 事件 $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的 **积事件**。当且仅当 A, B 同时发生时, 事件 $A \cap B$ 发生。 $A \cap B$ 也记作 AB 。类似地, 称 $\bigcap_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 的 **积事件**; 称 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 A_1, A_2, \dots 的 **积事件**。
4. 事件 $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的 **差事件**。当且仅当 A 发生、 B 不发生时事件 $A - B$ 发生。
5. 若 $A \cap B = \emptyset$, 则称事件 A 与事件 B 是 **互不相容的**, 或 **互斥的**。这指的是事件 A 与事件 B 不能同时发生。基本事件也是两两互不相容的。

6. 若 $A \cup B = S$ 且 $A \cap B = \emptyset$, 则称事件 A 与事件 B 互为 **逆事件**。又称事件 A 与事件 B 互为 **对立事件**。这指的是对每次试验而言, 事件 A, B 中必有一个发生, 且仅有一个发生。 A 的对立事件记为 \bar{A} , $\bar{A} = S - A$ 。

- 交换律: $A \cup B = B \cup A$;
 $A \cap B = B \cap A$ 。
- 结合律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$;
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$ 。
- 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。
- 德摩根律: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$; $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ 。

1.3 频率与概率

1.3.1 频率

在相同条件下, 进行了 n 次试验, 在这 n 次试验中, 事件 A 发生的次数为 n_A 称为事件 A 发生的 **频数**。比值 $\frac{n_A}{n}$ 称为事件 A 发生的 **频率**, 并记成 $f_n(A)$ 。

- 性质:
 1. $0 \leq f_n(A) \leq 1$;
 2. $f_n(S) = 1$;
 3. 若 A_1, A_2, \dots, A_k 是两两互不相容的事件, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)。$$

1.3.2 概率

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间。对于 E 的每一事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$, 称为事件 A 的 **概率**, 如果集合函数 $P(\cdot)$ 满足以下条件:

1. **非负性**: 对于每一个事件 A , 有 $P(A) \geq 0$;
2. **规范性**: 对于必然事件 S , 有 $P(S) = 1$;
3. **可列可加性**: 设 A_1, A_2, \dots 是两两互不相容的事件, 即对于 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots。$$

- 性质:
 1. $P(\emptyset) = 0$ 。
 2. 若 A_1, A_2, \dots, A_n 是两两互不相容的事件, 则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)。$$

3. 设 A, B 是两个事件, 若 $A \subset B$, 则有

$$P(B - A) = P(B) - P(A);$$

$$P(B) \geq P(A)。$$

4. 对于任一事件 A , 有

$$P(A) \leq 1。$$

5. 对于任意两事件 A, B 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)。$$

1.4 等可能概型 (古典概型)

1. 试验的样本空间只包含有限个元素。

2. 试验中每个基本事件发生的可能性相同。

具有以上两个特点的试验称为 **等可能概型**, 它在概率论发展初期曾是主要的研究对象, 所以也称为 **古典概型**。

设试验的样本空间为 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 若 A 包含 k 个基本事件, 则有:

$$P(A) = \sum_{j=1}^k P(\{e_{i_j}\}) = \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{S \text{ 中基本事件的总数}}。$$

超几何分布的概率公式:

$$p = \frac{\binom{D}{k} \binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}。$$

1.5 条件概率

1.5.1 条件概率

设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件 A 发生下事件 B 发生的 **条件概率**。

1.5.2 乘法定理

设 $P(A) > 0$, 则有

$$P(AB) = P(B | A)P(A)。$$

1.5.3 全概率公式和贝叶斯公式

全概率公式: 设试验 E 的样本空间为 S , A 为 E 的事件, B_1, B_2, \dots, B_n 为 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$P(A) = P(A | B_1)P(B_1) + P(A | B_2)P(B_2) + \dots + P(A | B_n)P(B_n)。$$

贝叶斯 (Bayes) 公式: 设试验 E 的样本空间为 S , A 为 E 的事件, B_1, B_2, \dots, B_n 为 S 的一个划分, 且 $P(A) > 0$, $P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

1.6 独立性

设 A, B 两事件如果满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A, B **相互独立**, 简称 A, B **独立**。

• 定理:

1. 设 A, B 是两事件, 且 $P(A) > 0$ 。若 A, B 相互独立, 则 $P(B | A) = P(B)$ 。反之亦然。
2. 若事件 A 与 B 相互独立, 则下列各对事件也相互独立: A 与 \bar{B} , \bar{A} 与 B , \bar{A} 与 \bar{B} 。

一般, 设 A_1, A_2, \dots, A_n 是 n ($n \geq 2$) 个事件, 如果对于其中任意 2 个、任意 3 个、 \dots 、任意 n 个事件的积事件的概率, 都等于各事件概率之积, 则称事件 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立。

• 推论:

1. 若事件 A_1, A_2, \dots, A_n ($n \geq 2$) 相互独立, 则其中任意 k ($2 \leq k \leq n$) 个事件也是相互独立的。
2. 若 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n ($n \geq 2$) 相互独立, 则将 A_1, A_2, \dots, A_n 中任意多个事件换成它们各自的对立事件, 所得的 n 个事件仍相互独立。

2 随机变量及其分布

2.1 随机变量

设随机试验的样本空间为 $S = \{e\}$ 。 $X = X(e)$ 是定义在样本空间上的单值函数。称 $X = X(e)$ 为 **随机变量**。

2.2 离散型随机变量及其分布率

2.2.1 (0-1) 分布

设随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值, 它的分布律是

$$P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, \quad k = 0, 1 \quad (0 < p < 1)$$

则称 X 服从以 p 为参数的 (0-1) 分布或两点分布。

2.2.2 伯努利试验、二项分布

设试验 E 只有两个可能结果： A 及 \bar{A} ，则称 E 为 **伯努利 (Bernoulli) 试验**。

将 E 独立重复地进行 n 次，则称这一串重复的独立试验为 n **重伯努利试验**。

以 X 表示 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数，每次伯努利试验中 A 事件发生的概率为 p ，称随机变量 X 服从参数为 n, p 的 **二项分布**，并记为 $X \sim b(n, p)$ 。它的分布律是

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

2.2.3 泊松分布

设随机变量 X 的所有可能取的值为 $0, 1, 2, \dots$ ，而取各个值的概率为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数。则称 X 服从参数为 λ 的 **泊松分布**，记为 $X \sim \pi(\lambda)$ 。

泊松定理：设 $\lambda > 0$ 是一个常数， n 是任意正整数，设 $np_n = \lambda$ ，则对于任意固定的非负整数 k 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

一般，当 $n \geq 20$ ， $p \leq 0.05$ 时，用 $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ ($\lambda = np$) 作为 $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ 的近似值效果颇佳。

2.3 随机变量的分布函数

设 X 是一个随机变量， x 是任意实数，函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, \quad -\infty < x < \infty$$

称为 X 的 **分布函数**。

2.4 连续型随机变量及其概率密度

如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，存在非负可积函数 $f(x)$ ，使对于任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则称 X 为 **连续型随机变量**，其中函数 $f(x)$ 称为 X 的 **概率密度函数**，简称 **概率密度**。

2.4.1 均匀分布

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a, b) 上服从 **均匀分布**，记为 $X \sim U(a, b)$ 。

2.4.2 指数分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 θ 的 **指数分布**。

2.4.3 正态分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

其中 μ, σ ($\sigma > 0$) 为常数, 则称 X 服从参数为 μ, σ 的 **正态分布** 或 **高斯 (Gauss) 分布**, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

• 性质:

1. 曲线关于 $x = \mu$ 对称。这表明对于任意 $h > 0$ 有

$$P\{\mu - h < X \leq \mu\} = P\{\mu < X \leq \mu + h\}.$$

2. 当 $x = \mu$ 时取到最大值

$$f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}.$$

特别地, 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 称随机变量 X 服从 **标准正态分布**。其概率密度和分布函数分别用 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示, 即有

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \\ \Phi(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \end{aligned}$$

易知

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x).$$

• 引理: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

2.5 随机变量的函数的分布

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < \infty$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$)。则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数。

3 多维随机变量及其分布

3.1 二维随机变量

一般, 设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, 设 $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个向量 (X, Y) 叫做 **二维随机向量**或 **二维随机变量**。

设 (X, Y) 是二维随机变量, 对于任意实数 x, y , 二元函数

$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} := P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 或称为随机变量 X 和 Y 的 **联合分布函数**。

• 性质:

1. $F(x, y)$ 是变量 x 和 y 的不减函数, 即对于固定的 y , 当 $x_2 > x_1$ 时, $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$; 对于任意固定的 x , 当 $y_2 > y_1$ 时, $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$ 。
2. $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且
 - (a) 对于任意固定的 y , $F(-\infty, y) = 0$;
 - (b) 对于任意固定的 x , $F(x, -\infty) = 0$;
 - (c) $F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(\infty, \infty) = 1$ 。
3. $F(x+0, y) = F(x, y)$, $F(x, y+0) = F(x, y)$, 即 $F(x, y)$ 关于 x 右连续, 关于 y 也右连续。
4. 对于任意 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , 若 $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$, 则

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0.$$

如果二维随机变量 (X, Y) 全部可能取到的值是有限对或可列无限多对, 则称 (X, Y) 是 **离散型的随机变量**。

称 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots$) 为二维离散型随机变量 (X, Y) 的 **分布律**, 或称随机变量 X 和 Y 的 **联合分布律**。

对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负可积函数 $f(x, y)$, 使对于任意 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv,$$

则称 (X, Y) 是 **连续型的二维随机变量**, 函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的 **概率密度**, 或称为随机变量 X 和 Y 的 **联合概率密度**。

• 性质:

1. $f(x, y) \geq 0$;
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = F(\infty, \infty) = 1$;
3. 设 G 是 xOy 平面上的区域, 点 (X, Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy;$$

4. 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$$

设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, 设 $X_1 = X_1(e), X_2 = X_2(e), \dots, X_n = X_n(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个 n 维向量 (X_1, X_2, \dots, X_n) 叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量。

对于任意 n 个实数 x_1, x_2, \dots, x_n , n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

称为 n 维随机变量 (X_1, X_2, \dots, X_n) 的分布函数, 或随机变量 X_1, X_2, \dots, X_n 的联合分布函数。

3.2 边缘分布

二维随机变量 (X, Y) 作为一个整体, 具有分布函数 $F(x, y)$ 。而 X 和 Y 都是随机变量, 各自也有分布函数, 分别记为 $F_X(x), F_Y(y)$, 依次称为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布函数。

对于离散型随机变量可得

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij},$$

X 的分布律为

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots$$

同样, Y 的分布律为

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots$$

记

$$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = P\{X = x_i\}, \quad i = 1, 2, \dots,$$

$$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = P\{Y = y_j\}, \quad j = 1, 2, \dots,$$

分别称 $p_{i\cdot}$ ($i = 1, 2, \dots$) 和 $p_{\cdot j}$ ($j = 1, 2, \dots$) 为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律。

对于连续型随机变量 (X, Y) , 设它的概率密度为 $f(x, y)$, 由于

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx,$$

X 是一个连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy.$$

同样, Y 也是一个连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx.$$

分别称 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度。

3.3 条件分布

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的 **条件分布律**。同样, 对于固定的 i , 若 $P\{X = x_i\} > 0$, 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, \quad j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的 **条件分布律**。

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$ 。若对于固定的 y , $f_Y(y) > 0$, 则称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的 **条件概率密度**, 记为

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)},$$

类似地, 可以定义

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}.$$

3.4 相互独立的随机变量

设 $F(x, y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别是二维随机变量 (X, Y) 的分布函数及边缘分布函数。若对于所有 x, y 有

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\},$$

即

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y),$$

则称随机变量 X 和 Y 是相互独立的。

- 定理: 设 (X_1, X_2, \dots, X_m) 和 (Y_1, Y_2, \dots, Y_n) 相互独立, 则 X_i ($i = 1, 2, \dots, m$) 和 Y_j ($j = 1, 2, \dots, n$) 相互独立。若 h, g 是连续函数, 则 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立。

4 随机变量的数字特征

4.1 数学期望

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

若级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

绝对收敛, 则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 的和为随机变量 X 的 **数学期望**, 记为 $E(X)$, 即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k.$$

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 若积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

绝对收敛, 则称积分 $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$ 的值为随机变量 X 的 **数学期望**, 记为 $E(X)$, 即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

数学期望简称 **期望**, 又称 **均值**。

• 性质:

1. 设 C 是常数, 则有 $E(C) = C$;
2. 设 X 是随机变量, C 是常数, 则有

$$E(CX) = CE(X);$$

3. 设 X, Y 是两个随机变量, 则有

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y);$$

这一性质可以推广到任意有限多个随机变量之和的情况;

4. 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 则有

$$E(XY) = E(X)E(Y);$$

这一性质可以推广到任意有限个相互独立的随机变量之积的情况。

4.2 方差

设 X 是一个随机变量, 若 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在, 则称 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 为 X 的 **方差**, 记为 $D(X)$ 或 $\text{Var}(X)$, 即

$$D(X) = \text{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}.$$

在应用上还引入量 $\sqrt{D(X)}$, 记为 $\sigma(X)$, 称为 **标准差**或 **均方差**。

• 性质:

1. 设 C 是常数, 则有 $D(C) = 0$;
2. 设 X 是随机变量, C 是常数, 则有

$$D(CX) = C^2 D(X),$$

$$D(X + C) = D(X);$$

3. 设 X, Y 是两个随机变量, 则有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\};$$

特别地, 若 X, Y 相互独立, 则有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y);$$

这一性质可以推广到任意有限多个相互独立的随机变量之和的情况;

4. $D(X) = 0$ 的充要条件是 X 以概率为 1 取常数 $E(X)$, 即

$$P\{X = E(X)\} = 1.$$

4.3 常见分布的期望和方差

常见分布的期望和方差如下表:

- (0-1) 分布 $B(1, p)$: $EX = p, DX = p(1 - p)$
- 二项分布 $B(n, p)$: $EX = np, DX = np(1 - p)$
- Poisson 分布 $\pi(\lambda)$: $EX = \lambda, DX = \lambda$
- 均匀分布 $U(a, b)$: $EX = \frac{a+b}{2}, DX = \frac{(b-a)^2}{12}$
- 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$: $EX = \mu, DX = \sigma^2$
- 指数分布 $Exp(\theta)$: $EX = \theta, DX = \theta^2$

4.4 协方差及相关系数

量 $E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的 **协方差**, 记为 $\text{Cov}(X, Y)$, 即

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}.$$

而

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

称为随机变量 X 与 Y 的 **相关系数**。

由定义知

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X),$$

$$\text{Cov}(X, X) = D(X).$$

对于任意两个随机变量 X 和 Y , 下列等式成立:

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y).$$

将 $\text{Cov}(X, Y)$ 的定义式展开, 易得

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

常用此式计算协方差。

• 性质:

1. $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$, 其中 a, b 是常数;
2. $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$ 。

• 定理:

1. $|\rho_{XY}| \leq 1$;
2. $|\rho_{XY}| = 1$ 的充要条件是存在常数 a, b , 使得

$$P\{Y = a + bX\} = 1.$$

当 $|\rho_{XY}| = 1$ 时, 称 X 和 Y 不相关。

4.5 矩、协方差矩阵

设 X 和 Y 是随机变量:

- 若 $E(X^k)$ ($k = 1, 2, \dots$) 存在, 称它为 X 的 k 阶原点矩;
- 若 $E\{[X - E(X)]^k\}$ ($k = 2, 3, \dots$) 存在, 称它为 X 的 k 阶中心矩;
- 若 $E(X^k Y^l)$ ($k, l = 1, 2, \dots$) 存在, 称它为 X 和 Y 的 $k + l$ 阶混合矩;
- 若 $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$ ($k, l = 1, 2, \dots$) 存在, 称它为 X 和 Y 的 $k + l$ 阶混合中心矩。

X 的数学期望 $E(X)$ 是其一阶原点矩, 方差 $D(X)$ 是二阶中心矩, 协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 是二阶混合中心矩。

设 n 维随机变量 (X_1, X_2, \dots, X_n) 的二阶混合中心矩

$$c_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

都存在, 则称矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

为 n 维随机变量的 协方差矩阵。由于 $c_{ij} = c_{ji}$, 该矩阵为对称矩阵。

5 大数定律及中心极限定理

5.1 大数定律

弱大数定理 (辛钦大数定理): 设 X_1, X_2, \dots 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_k) = \mu$, 则对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \epsilon \right\} = 1.$$

称随机变量序列 Y_1, Y_2, \dots 依概率收敛于 a , 若对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \epsilon\} = 1,$$

记为 $Y_n \xrightarrow{P} a$ 。

- 性质: 若 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$, 且函数 $g(x, y)$ 在 (a, b) 连续, 则

$$g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b).$$

伯努利大数定理: 设 f_A 为 n 次独立试验中事件 A 发生的次数, p 为每次试验中 A 发生的概率, 则对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| < \epsilon \right\} = 1.$$

5.2 中心极限定理

独立同分布的中心极限定理: 设 X_1, X_2, \dots 是独立同分布序列, $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2 > 0$, 则标准化变量

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

棣莫弗-拉普拉斯定理: 设 $\eta_n \sim b(n, p)$, 则对任意 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

6 样本及抽样分布

6.1 随机样本

总体中抽取的独立同分布样本 X_1, X_2, \dots, X_n 称为 **简单随机样本**, 其观察值 x_1, x_2, \dots, x_n 称为 **样本值**.

6.2 抽样分布

统计量是不含未知参数的样本函数。常用统计量包括:

- 样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
- 样本方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- 样本标准差: $S = \sqrt{S^2}$
- 样本 k 阶矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

经验分布函数:

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{\{X_i \leq x\}}$$

其中 I 为示性函数。

6.2.1 三大抽样分布

1. χ^2 分布:

(a) 定义: $X_1, \dots, X_n \sim N(0, 1)$, 则 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$

(b) 性质: 可加性: $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$

2. t 分布: 定义: $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$ 独立, 则 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$

3. F 分布: 定义: $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$ 独立, 则 $F = \frac{U/n_1}{V/n_2} \sim F(n_1, n_2)$

6.2.2 正态总体抽样定理

- 样本均值分布: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- 样本方差分布: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
- t 分布构造: $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
- 方差比分布: $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

7 参数估计

7.1 点估计

7.1.1 矩估计法

通过匹配样本矩与总体矩来估计参数。设总体前 k 阶矩为 $\mu_l(\theta_1, \dots, \theta_k)$, 解方程组:

$$\begin{cases} \mu_1 = A_1 \\ \vdots \\ \mu_k = A_k \end{cases}$$

得矩估计量 $\hat{\theta}_i$ 。

7.1.2 最大似然估计

似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ 或 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$, 通过求解 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$ 得极大似然估计量。

7.2 估计量评价标准

- 无偏性: $E(\hat{\theta}) = \theta$
- 有效性: 方差最小的无偏估计量
- 相合性: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| < \epsilon) = 1$

7.3 区间估计

构造置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 使得 $P(\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}) \geq 1 - \alpha$, 常用枢轴量法:

1. 寻找与参数相关的枢轴量 $W(X, \theta)$, 其分布已知
2. 确定区间 (a, b) 使得 $P(a < W < b) = 1 - \alpha$
3. 转化为参数不等式

7.4 正态总体区间估计

- 均值估计 (σ^2 已知): $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- 均值估计 (σ^2 未知): $\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$
- 方差估计: $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$