

量子力学

作者：Guotao He

编译时间：2026-09-30

目录

Chapter 1	前言	1
Chapter 2	波函数与 Schrodinger 方程	2
2.1	旧量子论	2
2.2	波函数	3
2.3	Schrodinger 方程	6
2.4	定态 Schrodinger 方程	9
2.5	态叠加原理	10
Chapter 3	一维势场中的粒子	12
3.1	一维势场中能量本征态的一般性质	12
3.2	方势	14
3.2.1	无限深势阱的束缚态	14
3.2.2	有限深方势阱的束缚态	15
3.2.3	方势垒的散射态	18
3.2.4	方势阱的散射态	20
3.3	Delta 势	21
3.3.1	Delta 势垒的散射态	21
3.3.2	Delta 势阱的束缚态	22
3.4	一维谐振子	23
Appendix A	常用公式	25
A.1	数学公式表	25
A.2	特殊函数	26

Chapter 1

前言

量子力学有如下五大基本假设：

- **波函数公设**：微观体系的状态由希尔伯特空间中的归一化态矢量 $|\psi\rangle$ （或波函数 $\psi(x, t)$ ）完全表征，其模方代表粒子在空间各处出现的几率密度。
- **算符公设**：每一个经典可观测物理量都对应希尔伯特空间中的一个线性厄米算符 $\hat{A}$ ，以保证其测量可能值为实数。
- **测量公设**：对物理量进行测量的可能结果仅为其算符的本征值，测量瞬间系统波函数会坍缩到所测本征值对应的本征态上（波包坍缩）。
- **演化公设**：封闭孤立量子系统的状态随时间按含时薛定谔方程 $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$ 进行确定性的幺正演化。
- **全同性原理**：全同粒子系统在交换任意两个粒子时状态不可区分，体系总波函数对玻色子是对称的，对费米子则是反对称的（服从泡利不相容原理）。

课程的主要内容如下：

- 波函数与 Schrödinger 方程
- 一维势场中的粒子
- 力学量用算符表达
- 中心力场
- 矩阵力学表象变换
- 角动量理论
- 近似方法

Chapter 2

波函数与 Schrodinger 方程

2.1 旧量子论

黑体辐射: Rayleigh-Jeans 公式: 单位空腔内, 频率在 $\nu \sim \nu + d\nu$ 之间的电磁场振子数目为:

$$N(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}d\nu$$

由能量均分定理, 每个振子平均能量 $\bar{\epsilon} = kT$, 于是能量密度:

$$E(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}kTd\nu$$

此即 R-J 公式, 在低温下与实验符合, 高频下发散, 称为紫外灾难.

同时, Wein 给出一个半经验公式:

$$E(\nu)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3}\nu^3 e^{-h\nu/kT}d\nu$$

在高温区与实验吻合但低温下不吻合. Planck 注意到:

$$E(\nu)d\nu = \frac{c_1\nu^3 d\nu}{e^{c_2\nu/T} - 1} = \begin{cases} \frac{c_1}{c_2}\nu^2 T d\nu, & \nu \rightarrow 0 \\ c_1\nu^3 e^{-c_2\nu/T} d\nu, & \nu \rightarrow \infty \end{cases}$$

于是引入能量量子假说, 假设振子能量只能取 $h\nu$ 的整数倍, 即 $E_n = nh\nu$, 假设能量分布满足 Boltzmann 分布:

$$\rho(n) \propto e^{-E_n/kT}$$

因此, 每个振子的平均能量为:

$$\bar{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu e^{-nh\nu/kT}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu/kT}} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

其中会运用到级数展开的求和公式:

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx} = \frac{1}{1 - e^{-x}}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} ne^{-nx} = \frac{e^{-x}}{(1 - e^{-x})^2}$$

从而得到 Planck 公式:

$$E(\nu)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu$$

Remark 2.1.1 (为何 Planck 能解决“紫外灾难”?). 在经典物理中, 能量均分定理要求每个振子的平均能量都是 kT , 与频率无关, 而 Planck 假设能量是分立的, 能量 $E_n = nh\nu$, 频率越高, 能量越大, 因此高频的振子很难被激发, 从而避免了紫外灾难.

光电效应: Einstein 提出, 辐射场本身由光子组成:

$$E = h\nu$$

光照到金属表明, 溢出电子的动能:

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A$$

其中 A 为溢出功. 从而解释了光电效应.

氢原子光谱与 Bohr 旧量子论: 为解释氢原子光谱, Bohr 建立旧量子论, 并得到氢原子能级:

$$E_n = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{n^2}, \quad a = \frac{\hbar^2}{me^2}$$

Compton 散射: X 射线被散射后波长变长, 康普顿根据光量子假设, 把散射过程看作光子与自由电子的碰撞过程, 从而得到:

$$\Delta\lambda = \frac{2h}{mc} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

2.2 波函数

波函数: de Broglie 猜测实物粒子也具有波动性, 其能量和动量与这种波的关系为:

$$E = h\nu, \quad p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

这种波的波函数记为 $\psi(\mathbf{r})$, Born 指出其物理含义:

Theorem 2.2.1 (Born 波函数统计诠释). 波函数 ψ 的模方 $|\psi(\mathbf{r})|^2$ 表示粒子在 $\mathbf{r}$ 处发现的概率密度.

我们定义两个波函数之间的内积:

$$(\phi, \psi) = \int \phi^* \psi d^3r$$

根据 Born 统计诠释, 我们易得波函数满足如下性质:

- **归一化条件:** 全空间概率为 1, 因此一般要求 $(\psi, \psi) = 1$.
- **振幅无关性:** 波函数振幅不重要, 即 ψ 和 $c\psi$ 描述同一状态, c 为常数.
- **相位不定性:** 波函数相位不重要, 即 ψ 和 $e^{i\alpha}\psi$ 描述同一状态, α 为常数.

平面波: 我们考虑最简单的自由粒子的情况, 此时波函数是平面波, 一维情况下:

$$\begin{aligned} \psi_p &= Ae^{i(kx - \omega t)} \\ &= Ae^{i(px - Et)/\hbar} \quad (\text{利用 de Broglie 关系}) \end{aligned}$$

考虑不同平面波的内积:

$$\begin{aligned} (\psi_p, \psi_{p'}) &= A^2 \int e^{-i(p-p')x/\hbar} dx \\ &= A^2 \cdot 2\pi\hbar \delta(p - p') \end{aligned}$$

我们不同平面波正交归一, 此时:

$$A^2 \cdot 2\pi\hbar = 1$$

解得波函数:

$$\begin{aligned} \psi_p &= Ae^{i(px - Et)/\hbar} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i(px - Et)/\hbar} \end{aligned}$$

三维情况下:

$$\psi_p = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-Et)/\hbar}$$

这里 3/2 的指数可以从量纲分析看出.

平面波展开与动量空间中波函数: 在定义内积的情况下, 我们可以将任意波函数 ψ 用前面的平面波 ψ_p 进行展开, 此时:

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \phi(\mathbf{p}) d^3p \\ \phi(\mathbf{p}) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \psi(\mathbf{r}) d^3r\end{aligned}$$

这里 ϕ 称为动量空间中波函数, 其模方 $|\phi|^2$ 表示在动量 $\mathbf{p}$ 附近发现的概率密度. 从上面式子中可以看到, ϕ 和 ψ 互为 Fourier 变换.

力学量与算符: 给定波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 后, 某一个物理量 A 的平均值 $\langle A \rangle$ 写为:

$$\langle A \rangle = \int \psi^* \hat{A} \psi d^3r$$

其中 $\hat{A}$ 为力学量对应的算符.

坐标的平均值:

$$\langle \mathbf{r} \rangle = \int \psi^* \mathbf{r} \psi d^3r$$

势能的平均值:

$$\langle V(\mathbf{r}) \rangle = \int \psi^* V(\mathbf{r}) \psi d^3r$$

动量的平均值使用动量空间波函数, 因此:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{p} \rangle &= \int \phi^* \mathbf{p} \phi d^3p \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3p \int e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \psi^* \mathbf{p} \phi d^3r \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3r \psi^* \int \mathbf{p} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \phi d^3p \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3r \psi^* \int (-i\hbar \nabla) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \phi d^3p \\ &= \int \underbrace{\psi^* (-i\hbar \nabla)}_{\hat{\mathbf{p}}} \psi d^3r\end{aligned}$$

从而有动量算符 (在坐标表象下):

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$$

从而有:

$$\langle \mathbf{p} \rangle = \int \psi^* \hat{\mathbf{p}} \psi d^3r$$

同理, 在动量空间中:

$$\hat{\mathbf{r}} = i\hbar \nabla_p, \quad \hat{\mathbf{p}} = \mathbf{p}$$

其中 ∇_p 表示以 p_x, p_y, p_z 求梯度.

动能算符:

$$\hat{T} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$$

Hamiltonian 算符 (能量算符):

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r})$$

Attention. 使用算符计算物理量平均值时, 波函数必须是归一化的.

统计诠释对波函数的要求: 统计诠释给波函数一定的要求:

- **单值:** 波函数模方 $|\psi|^2$ 在空间各点有唯一确定的值.
- **有限:** $|\psi|^2$ 在全空间可积, 且为有限值.
- **连续:** 除开有限个孤立奇点外, 波函数在全空间连续, 且一阶导数连续.

Remark 2.2.1 (理论补充). 这里我们引入后面形式理论的一些内容, 微观体系的完整量子状态由 Hilbert 空间 ($\mathcal{H}$) 中的右矢 (Ket) 抽象表示, 构成一个右矢空间.

左矢 (Bra) $\langle\phi|$, 是一个线性映射, 从 $\mathcal{H}$ 映射到复数域 $\mathbb{C}$, 即:

$$\langle\phi| : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}, \quad |\phi\rangle \mapsto \langle\phi|(|\psi\rangle) \in \mathbb{C}$$

所有左矢构成一个左矢空间 (记为 $\mathcal{H}^*$), 左矢空间是右矢空间的对偶空间.

进一步我们定义某种内积操作 $(\cdot, \cdot) : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 此时, 对于某一个右矢 $|\psi\rangle$, 我们可以唯一地对应一个左矢:

$$\langle\phi| = (|\phi\rangle, \cdot), \quad \langle\phi|(|\psi\rangle) = \langle\phi|\psi\rangle = (|\phi\rangle, |\psi\rangle)$$

一个定义了内积的线性空间可以选取基底, 如果基底 $\{|x\rangle\}$ 是完备的, 也就是它们张成了整个 Hilbert 空间, 那么任意态矢都可以用这组基底展开空间, 那么任意态矢都可以用这组基底展开. 一般而言, 我们要求基底正交归一, 记基底为 $|n\rangle$, 则满足:

$$\int |n\rangle \langle n| dn = \hat{I}$$

波函数本质上是抽象态矢在特定基底下的投影 (展开系数), 比如在坐标基底下, 之前我们的波函数为:

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle, \quad \psi^*(x) = \langle\psi|x\rangle$$

类似地, 如果选取动量本征态 $|p\rangle$ 作为基底, 则态矢 $|\psi\rangle$ 在动量基底下的展开系数为:

$$\phi(p) = \langle p|\psi\rangle, \quad \phi^*(p) = \langle\psi|p\rangle$$

因此, 同一个量子态 $|\psi\rangle$ 可以在不同的基底下表示, 而 $\psi(x)$ 和 $\phi(p)$ 只是同一个抽象态矢在不同基底下的坐标表示, 这种表示称为表象. 两种表象描述的是完全相同的物理状态, 只是选取的基底不同.

考虑坐标波函数与动量波函数之间的关系, 在动量表象展开单位算符:

$$\hat{I} = \int |p\rangle \langle p| dp$$

于是：

$$\begin{aligned}
 \psi(x) &= \langle x | \psi \rangle \\
 &= \langle x | \hat{I} | \psi \rangle \\
 &= \int \langle x | p \rangle \langle p | \psi \rangle dp \\
 &= \int \langle x | p \rangle \phi(p) dp
 \end{aligned}$$

其中 $\langle x | p \rangle$ 表示用坐标基底表示动量本征态时的展开系数，即动量本征态在坐标表象下的波函数。因此 $|p\rangle$ 满足：

$$\hat{p} |p\rangle = p |p\rangle$$

因此（先只考虑一维情况）：

$$p \langle x | p \rangle = \langle x | \hat{p} | p \rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle x | p \rangle$$

上面微分方程解得：

$$\langle x | p \rangle = C \cdot e^{ipx/\hbar}$$

其中 C 为待定的归一化常数，我们约定 $C^* = C$ ，也就是 C 是一个实数。下面我们要求 $|p\rangle$ 满足正交归一条件：

$$\begin{aligned}
 \delta(p - p') &= \langle p | p' \rangle \\
 &= \int \langle p | x \rangle \langle x | p' \rangle dx \\
 &= \int C e^{-ipx/\hbar} \cdot C e^{ip'x/\hbar} dx \\
 &= C^2 \int e^{i(p' - p)x/\hbar} dx \\
 &= C^2 \cdot 2\pi\hbar \delta(p - p')
 \end{aligned}$$

因此：

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

综上，我们有：

$$\langle x | p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

从而得到动量表象到坐标表象的转换关系。三维情况下同理有：

$$\langle \mathbf{r} | \mathbf{p} \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} / \hbar}$$

2.3 Schrodinger 方程

Schrodinger 方程描述了波函数随时间的演化，为：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi$$

概率流密度和概率守恒： 定义概率密度 ρ ：

$$\rho = \psi^* \psi$$

因此：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

利用 Schrodinger 方程：

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \\ -i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V\psi^* \end{aligned}$$

注意这里我们假定势能 V 为实数，从而有：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} \\ &= \frac{i\hbar^2}{2m} (\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*) \end{aligned}$$

其中应用 Green 第二恒等式：

$$\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^* = \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$

因此：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= \frac{i\hbar}{2m} \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \\ &= \nabla \cdot \underbrace{\left[\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \right]}_{-\mathbf{j}} \end{aligned}$$

从而有概率流连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

其中概率流密度 $\mathbf{j}$ 为：

$$\mathbf{j} = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$

其物理意义表示粒子数守恒。

若令 Ω 为全空间，对于一般的波函数，有：

$$\int |\psi|^2 d^3r < \infty$$

因此， $r \rightarrow \infty$ 时 $\psi \sim r^{-3/2}$ ， $\mathbf{j} \sim r^{-4}$ ，因此：

$$\oint \mathbf{j} d\mathbf{S} \sim r^{-2} \rightarrow 0$$

从而有：

$$\frac{d}{dt} \int |\psi|^2 d^3r = 0$$

因此有：

$$\int |\psi|^2 d^3r = \text{Constant}$$

这表明波函数的归一化不随时间改变，初始函数归一化后随 Schrodinger 方程演化得到的波函数仍然保持归一化。

另一方面, 概率流密度可以写为:

$$\begin{aligned}\mathbf{j} &= -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \\ &= -\frac{i\hbar}{m} \text{Im} (\psi^* \nabla \psi) \\ &= \text{Re} \left(\psi^* \underbrace{\frac{\hat{\mathbf{p}}}{m}}_{\hat{\mathbf{v}}} \psi \right)\end{aligned}$$

可见概率流密度与粒子的速度 (速度算符) 有关.

自由粒子的传播子: 态函数 ψ 随时间的演化可以由传播子 (核函数) 描述, 定义为:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \int G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') \psi(\mathbf{r}', t') d^3 r'$$

其实际上描述了初态为 δ 函数的演化过程. 设 $\psi(\mathbf{r}', t') = \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}'_0)$, 因此:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \int G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}'_0) d^3 r' = G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}'_0, t')$$

对于自由粒子, Schrodinger 方程:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi$$

坐标表象下 t 时刻可以用平面波展开:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \phi(\mathbf{p}, t) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} d^3 p$$

其中 $E = p^2/2m$. 根据 Schrodinger 方程, $\psi_p = e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r} - Et)/\hbar}$ 随时间演化满足:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_p = E \psi_p = \frac{p^2}{2m} \psi_p$$

因此:

$$\psi_p(t) = e^{-iE(t-t')/\hbar} \psi_p(t')$$

从而有:

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \phi(\mathbf{p}, t') e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} e^{-iE(t-t')/\hbar} d^3 p \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \left[\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \psi(\mathbf{r}', t') e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}'/\hbar} d^3 r' \right] e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar - i\frac{p^2}{2m\hbar}(t-t')} d^3 p \\ &= \int \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \underbrace{\int e^{-\frac{i(t-t')}{2m\hbar} p^2 + \frac{i}{\hbar} \mathbf{p}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')} d^3 p}_{\text{Gauss 积分}} \psi(\mathbf{r}', t') d^3 r' \\ &= \underbrace{\int \left(\frac{m}{2\pi i\hbar(t-t')} \right)^{3/2} \exp \left[\frac{im|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2}{2\hbar(t-t')} \right] d^3 r'}_{G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t')} \psi(\mathbf{r}', t')\end{aligned}$$

其中用到 Gauss 积分:

$$\int e^{-(ax^2+b)} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}$$

因此, 传播子 G 为:

$$G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = \left(\frac{m}{2\pi i\hbar(t-t')} \right)^{3/2} \exp \left[\frac{im|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2}{2\hbar(t-t')} \right]$$

Remark 2.3.1 (从 Delta 函数演化计算传播子). 另一方面, 我们也可以从 Delta 函数的演化出发, 由于:

$$\psi(\mathbf{r}, t') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{1}{2\pi} \int e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} d^3k$$

注意到:

$$\hat{H}e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

因此, 从 t' 演化到 t 为:

$$\begin{aligned} G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') &= \frac{1}{2\pi} \int e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} e^{-i\frac{\hbar^2 k^2}{2m}(t-t')} d^3k \\ &= \left(\frac{m}{2\pi i \hbar (t-t')} \right)^{3/2} \exp \left[\frac{im|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2}{2\hbar(t-t')} \right] \end{aligned}$$

根据定义, 此即传播子.

2.4 定态 Schrodinger 方程

假设势能不含时, 则此时波函数可以分离变量:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})T(t)$$

带入 Schrodinger 方程:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi T &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 (\psi T) + V\psi T \\ \frac{i\hbar}{T} \frac{dT}{dt} &= \frac{1}{\psi} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi \right] + V = E \end{aligned}$$

其中 E 为分离常数, 从而有:

$$T = e^{-iEt/\hbar}$$

以及:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = E\psi$$

也就是:

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

此即定态 Schrodinger 方程. 可见这里的分离常数 E 就是某个定态的哈密顿量 (能量). 对于初始的某个定态 ψ_n , 其演化为:

$$\psi_n(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r})e^{-iE_n t/\hbar}$$

Remark 2.4.1 (本征方程, 本征函数, 本征值). 对于某个算符 $\hat{F}$, 如果存在数 λ 和函数 f 使得:

$$\hat{F}f = \lambda f$$

则称 f 为算符 $\hat{F}$ 的本征函数, λ 为本征值.

定态: 定态是能量确定的态, 而且能量不随时间改变:

$$\langle E \rangle = \int \psi^* \hat{H} \psi d^3r = E \int |\psi|^2 d^3r = E$$

且其概率密度和概率流密度均不随时间改变:

$$\begin{aligned}\rho &= |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 \\ &= \psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}\psi^*(\mathbf{r})e^{iEt/\hbar}\psi(\mathbf{r}) \\ &= |\psi(\mathbf{r})|^2 \\ &= \text{Constant}\end{aligned}$$

从而任何可观测量的平均值和概率分布都不随时间改变.

$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= \int \psi^*(\mathbf{r}, t) \hat{A} \psi(\mathbf{r}, t) d^3r \\ &= \int \psi^*(\mathbf{r}) e^{iEt/\hbar} \hat{A} \psi(\mathbf{r}) e^{-iEt/\hbar} d^3r \\ &= \int \psi^*(\mathbf{r}) \hat{A} \psi(\mathbf{r}) d^3r \\ &= \text{Constant}\end{aligned}$$

定态叠加的演化: 假设波函数初始时是某些定态的叠加:

$$\psi(\mathbf{r}, 0) = \sum_n c_n \psi_n(\mathbf{r})$$

其中 $\psi_n(\mathbf{r})$ 是定态, c_n 为叠加系数. 则随时间演化为:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n c_n \psi_n(\mathbf{r}) e^{-iE_n t/\hbar}$$

Attention. 这里定态的叠加不是定态, 因为其能量不确定.

对于连续谱, 波函数初始时可以写为某些定态的积分:

$$\psi(\mathbf{r}, 0) = \int c(E) \psi_E(\mathbf{r}) dE$$

则随时间演化为:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \int c(E) \psi_E(\mathbf{r}) e^{-iEt/\hbar} dE$$

2.5 态叠加原理

表象: 对同一个量子态的描述, 可以选取不同的基底, 从而写出不同表象下波函数. 不同表象之间有完全确定的变换关系.

态叠加原理: 量子态可以叠加, 即如果 ψ_1 和 ψ_2 是体系可能的状态, 那么

$$\psi = c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2$$

也是体系可能的状态. 其中 c_1, c_2 为复数.

Attention. 这里的叠加是量子态的叠加, 不是概率的叠加, 也就是:

$$\psi = \psi_1 + \psi_2$$

而不是:

$$|\psi|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2$$

实际上：

$$|\psi|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + \psi_1^* \psi_2 + \psi_2^* \psi_1$$

也就是会存在干涉项.

Chapter 3

一维势场中的粒子

3.1 一维势场中能量本征态的一般性质

一维势场中本征方程为：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi = E\psi$$

对于同一个 E ，上述方程最多存在两个线性无关的解，也就是说能级简并度最多是 2.

Definition 3.1.1 (简并). 若 $\hat{F}\psi_{na} = \lambda_n \psi_{na}$ ($a = 1, 2, \dots, f_n$) 也就是对同一个本征值 λ_n ，存在多个线性无关的本征函数，则称本征值 λ_n 是简便的，简并度为 f_n .

Theorem 3.1.1. 若 $\psi(x)$ 是能量本征态，则它的复共轭 $\psi^*(x)$ 也是同一个能量的能量本征态.

Proof. ψ 满足：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi = E\psi$$

两边取复共轭 ($V^*(x) = V(x)$)，得到：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi^* = E\psi^*$$

所以 ψ^* 也是该能量的本征态. □

Corollary 3.1.2. 若 E 无简并，则 ψ_E 可以取为实函数.

Theorem 3.1.3. 若 E 有简并，则可以找到完备的实函数解.

Proof. 假设 ψ 和 ψ^* 是同一个能级 E 的两个线性无关解（由 Theorem 3.1.1 保证）。因此构造：

$$\begin{aligned} \psi_I &= \frac{\psi + \psi^*}{2} \\ \psi_{II} &= \frac{\psi - \psi^*}{2i} \end{aligned}$$

也是同一个 E 两个线性无关的解，且都是实函数。由于 ψ 和 ψ^* 是完备的，因此其变换后 ψ_I 和 ψ_{II} 也是完备的（同一个空间，且线性无关）。 □

Theorem 3.1.4. 若 $V(x) = V(-x)$ ，则 $\psi(x)$ 和 $\psi(-x)$ 对应同一能级 E .

Proof. 若 $V(x) = V(-x)$ ，因此 $\hat{H}(x) = \hat{H}(-x)$ 。于是对定态方程：

$$\hat{H}(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

两边进行做变换 $x \rightarrow -x$ （记为宇称算符 $\hat{P}$ ）得到：

$$\hat{H}(-x)\psi(-x) = E\psi(-x) \implies \hat{H}(x)\psi(-x) = E\psi(-x)$$

因此若 $\psi(x)$ 是本征函数， $\psi(-x)$ 也是本征函数. □

Corollary 3.1.5. 若 E 无简并, 则 $\psi(x)$ 必须具有确定的宇称.

Proof. 由 Theorem 3.1.4, E 无简并则 $\psi(x) \propto \psi(-x)$. 对 $\psi(x)$ 作用两次宇称算符 (等于自身, 即 $\hat{P}^2 = \hat{I}$), 有:

$$\psi(x) = \hat{P}^2 \psi(x) = C^2 \psi(x) \implies C^2 = 1$$

其中 C 是比例常数, $C = \pm 1$. 因此本征函数必为偶函数或奇函数.

- $C = 1$, $\psi(x) = \psi(-x)$, 称为偶宇称解.
- $C = -1$, $\psi(x) = -\psi(-x)$, 称为奇宇称解.

□

Theorem 3.1.6. 若 E 简并, 则能级必可分离为完备的奇宇称和偶宇称解.

Proof. 由 Theorem 3.1.4, E 简并时, 本征函数有 $\psi(x)$ 和 $\psi(-x)$. 构造:

$$\begin{aligned}\psi_I &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi(x) + \psi(-x)] \\ \psi_{II} &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi(x) - \psi(-x)]\end{aligned}$$

显然 ψ_I 是偶函数 (偶宇称), ψ_{II} 是奇函数 (奇宇称), 且二者是线性无关的, 由于 $\psi(x)$ 和 $\psi(-x)$ 是完备的, 因此其变换后 ψ_I 和 ψ_{II} 也是完备的. □

Theorem 3.1.7. 若 $V(x)$ 只有 C_1 类间断点 (有限间断点), 则 ψ 和 ψ' 连续.

Proof. 假设断点在 x_0 . 由定态薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi'' + V(x)\psi = E\psi$$

在 x_0 处积分为 0:

$$\psi'(x_0^+) - \psi'(x_0^-) = \frac{2m}{\hbar^2} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{x_0-\epsilon}^{x_0+\epsilon} [V(x) - E]\psi(x) dx = 0$$

因此 ψ' 连续, ψ 也连续. □

Theorem 3.1.8. 若 ψ_1 和 ψ_2 是同一个能级 E 的两个不同的本征函数, 则它们的 Wronskian 为常数. 即:

$$\psi_1' \psi_2 - \psi_1 \psi_2' = \text{Constant}$$

Proof. ψ_1 和 ψ_2 满足能量本征方程:

$$\hat{H}\psi_1 = E\psi_1$$

$$\hat{H}\psi_2 = E\psi_2$$

即:

$$\begin{aligned}\psi_1'' &= \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E]\psi_1 \\ \psi_2'' &= \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E]\psi_2\end{aligned}$$

因此可以得到 $\psi_1''\psi_2 - \psi_1\psi_2'' = 0$. 而:

$$\frac{d}{dx}(\psi_1'\psi_2 - \psi_1\psi_2') = \psi_1''\psi_2 + \psi_1'\psi_2' - \psi_1'\psi_2' - \psi_1\psi_2'' = \psi_1''\psi_2 - \psi_1\psi_2'' = 0$$

因此:

$$\psi_1'\psi_2 - \psi_1\psi_2' = \text{Constant}$$

□

定义束缚态和游离态:

- **束缚态**: $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $\psi \rightarrow 0$ 的态 (只分布在有限区域) .
- **游离态**: $x \rightarrow \pm\infty$ 时, ψ 不趋于 0 的态 (分布在无限区域) .

Corollary 3.1.9. 对于束缚态, 由于 $x \rightarrow \infty$ 时, $\psi_1, \psi_2 \rightarrow 0$, 因此:

$$\psi_1\psi_2' = \psi_1'\psi_2$$

Theorem 3.1.10. 若 V 是正则势场 (没有奇点), 且存在束缚态, 则所有束缚态能级都是非简并的.

Proof. 假设能级 E 简并, 存在两个束缚态 ψ_1 和 ψ_2 . 由 Corollary 3.1.9 可得:

$$\frac{\psi_1'}{\psi_1} = \frac{\psi_2'}{\psi_2}$$

即:

$$\frac{d}{dx} \ln \left(\frac{\psi_1}{\psi_2} \right) = 0 \implies \frac{\psi_1}{\psi_2} = \text{Constant}$$

即 $\psi_1 \propto \psi_2$, 与简并定义矛盾. 因此束缚态能级非简并.

□

3.2 方势

3.2.1 无限深势阱的束缚态

对于一维无限深势阱:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & \text{Other} \end{cases}$$

由于势阱无限大, ψ 在阱外为 0, 边界 $x = 0, a$ 处连续, 即 $\psi(0) = \psi(a) = 0$. 势阱内, 有本征方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi = E\psi$$

令 $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$, 解得:

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

带入边界条件, 得 $B = 0$, $ka = n\pi$, $n \in \mathbb{N}^+$, 因此:

$$k_n = \frac{n\pi}{a} = \sqrt{\frac{2mE_n}{\hbar^2}} \implies E_n = \frac{k_n^2 \hbar^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

可见这里的能量 E 是分立的. E 对应的本征函数:

$$\psi_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad 0 < x < a$$

A_n 通过 ψ_n 的归一化条件, 有:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = |A_n|^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx \\ &= |A_n|^2 \frac{a}{2} \\ \Rightarrow A_n &= \sqrt{\frac{2}{a}} \end{aligned}$$

综上:

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Remark 3.2.1. 注意这里 n 不可以取 0. 若 $n=0$ 则 $E=0$, 对应 $\psi=0$, 是没意义的, 且不可归一化. 可见, 基态能量 $E_1 > 0$.

对于二维无限深势阱:

$$V(x, y) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, 0 < y < b \\ \infty, & \text{Other} \end{cases}$$

分离变量 $\psi(x, y) = \psi_x(x)\psi_y(y)$, 带入定态方程, 有:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\psi_x''}{\psi_x} + \frac{\psi_y''}{\psi_y} \right) = E$$

因此可以化成两个一维无限深势阱:

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_x &= E_x \psi_x \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dy^2} \psi_y &= E_y \psi_y \\ E_x + E_y &= E \end{aligned}$$

由前文一维无限深势阱, 易解得:

$$\begin{aligned} E_{n_x n_y} &= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} \right) \\ \psi_{n_x n_y}(x, y) &= \frac{2}{\sqrt{ab}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{b}\right) \end{aligned}$$

3.2.2 有限深方势阱的束缚态

取势阱:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| < \frac{a}{2} \\ V_0, & |x| > \frac{a}{2} \end{cases}$$

先只考虑束缚态 $0 < E < V_0$. 势阱外:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_0 \right) \psi = E \psi \Rightarrow \psi'' = \underbrace{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}_{\beta^2} \psi$$

解得：

$$\psi = Ae^{-\beta x} + Be^{\beta x}$$

由于是束缚态， $|x| \rightarrow \infty$ 时 $\psi \rightarrow 0$ ，因此：

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{-\beta x}, & x > -\frac{a}{2} \\ Be^{\beta x}, & x < \frac{a}{2} \end{cases}$$

势阱内：

$$\psi'' = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi$$

令 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ ，解得：

$$\psi(x) = C \sin(kx) + D \cos(kx)$$

显然，势阱 V 在原点对称，具有空间反射不变性，由 Theorem 3.1.6，解可以分为偶宇称和奇宇称。先考虑偶宇称，则解容易写为：

$$\psi = \begin{cases} Ae^{\beta x}, & x < -\frac{a}{2} \\ D \cos(kx), & -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \\ Ae^{-\beta x}, & x > \frac{a}{2} \end{cases}$$

又因为 ψ 和 ψ' 连续，因此：

$$\begin{aligned} D \cos\left(\frac{ka}{2}\right) &= A \exp\left(-\beta \frac{a}{2}\right) \\ kD \sin\left(\frac{ka}{2}\right) &= \beta A \exp\left(-\beta \frac{a}{2}\right) \end{aligned}$$

两式相除：

$$k \tan \frac{ka}{2} = \beta$$

又因为 k 和 β 满足：

$$\beta = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2} - k^2} \implies \beta^2 + k^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$$

若令 $\xi = ka/2$ ， $\eta = \beta a/2$ ，则有：

$$\begin{aligned} \eta &= \xi \tan \xi \\ \xi^2 + \eta^2 &= \frac{mV_0 a^2}{4\hbar^2} \end{aligned}$$

这是一个超越方程，其解需要画图或借助数值方法求解。

同样的，对于奇宇称，解可以写为：

$$\psi(x) = \begin{cases} -Ae^{\beta x}, & x < -\frac{a}{2} \\ C \sin(kx), & -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \\ Ae^{-\beta x}, & x > \frac{a}{2} \end{cases}$$

同样的, 由 ψ 和 ψ' 连续, 可以得到:

$$\begin{aligned} C \sin\left(\frac{ka}{2}\right) &= A \exp\left(-\beta\frac{a}{2}\right) \\ kC \cos\left(\frac{ka}{2}\right) &= -\beta A \exp\left(-\beta\frac{a}{2}\right) \end{aligned}$$

两式相除:

$$k \cot \frac{ka}{2} = -\beta$$

同样 k 与 β 满足:

$$\beta^2 + k^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$$

若令 $\xi = ka/2$, $\eta = \beta a/2$, 则有:

$$\begin{aligned} \eta &= -\xi \cot \xi \\ \xi^2 + \eta^2 &= \frac{mV_0 a^2}{4\hbar^2} \end{aligned}$$

同样是一个超越方程, 可以借助画图或数值方法求解.

Remark 3.2.2 (奇宇称阈值). 从图像法可以看出, 只有曲线的半径大于 $\frac{\pi}{2}$ 时, 奇宇称态才可能存在, 即 $V_0 < \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ 时, 奇宇称态不存在.

这里给出一个简单的看法, 奇宇称要求中心有一个波节, 也就是 0 到 $\pm a/2$ 中至少要出现一个明显的波瓣, 若 a 很小, 则需要有很短的波长, 也就是有很大的 k , 即很高的能量 E , 若超过有限深势阱, 则就不是束缚态了.

当 $V_0 \rightarrow \infty$ 时,

$$\eta = \begin{cases} \xi \tan \xi \rightarrow \infty, & \text{偶宇称} \\ -\xi \cot \xi \rightarrow \infty, & \text{奇宇称} \end{cases}$$

即 $\xi = n\pi/2$, 得到:

$$k = \frac{n\pi}{a} \implies E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2}$$

这就回到了无限深势阱.

Remark 3.2.3 (为何一维束缚态能级是分立的). 考虑能量本征方程:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V\right) \psi = E\psi$$

因此:

$$\psi'' = -\frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \psi$$

在经典允许区 ($E > V$), ψ'' 与 ψ 异号, ψ 是震荡的; 在经典禁区 ($E < V$), ψ'' 与 ψ 同号, ψ 是指数的.

束缚态要求:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x) = 0$$

在远离势阱的经典禁区中, 波函数一般可以写成指数函数的线性组合. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时:

$$\psi(x) \sim A_+(E)e^{-\kappa x} + B_+(E)e^{+\kappa x}$$

为了满足 $\psi \rightarrow 0$, 必须有:

$$B_+(E) = 0$$

而当 $x \rightarrow -\infty$ 时:

$$\psi(x) \sim A_-(E)e^{+\kappa x} + B_-(E)e^{-\kappa x}$$

为了满足 $\psi \rightarrow 0$, 必须有:

$$B_-(E) = 0$$

对于任意给定的能量 E , 从一侧满足衰减条件的解积分到另一侧后, 一般会同时包含衰减项和发散项. 只有某些特殊的 E 能使另一侧的发散项系数恰好为零, 因此满足两端衰减条件的能量通常只能取一系列离散值, 因此一维束缚态的能谱通常是分立的.

3.2.3 方势垒的散射态

取势垒:

$$V = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a \\ 0, & \text{Other} \end{cases}$$

对于势垒外部:

$$\psi'' = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi \implies \psi = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

其中 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. 我们约定:

$$\psi = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < 0 \\ Se^{ikx}, & x > a \end{cases}$$

其中 R 为反射振幅系数, S 为透射振幅系数, 上面入射波函数的振幅取 1 是为了方便, 对于散射问题, 由于不能归一化, 因此振幅的具体值没有意义, 我们更多考虑透射和反射相对入射的振幅比, 因此取入射振幅为 1 能对求解带来便利.

由于概率流:

$$j = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*)$$

入射波概率流密度:

$$\begin{aligned} j_i &= \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \frac{d}{dx} \psi - \psi \frac{d}{dx} \psi^* \right) \\ &= \frac{\hbar k}{m} \end{aligned}$$

透射波概率流密度:

$$\begin{aligned} j_r &= \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \frac{d}{dx} \psi - \psi \frac{d}{dx} \psi^* \right) \\ &= \frac{\hbar k}{m} |S|^2 \end{aligned}$$

同理, 反射波概率流密度:

$$j_r = -\frac{\hbar k}{m} |R|^2$$

因此, 反射系数 R_r 和透射系数 T 分别定义为:

$$R_r = \left| \frac{j_r}{j_i} \right| = |R|^2, \quad T = \left| \frac{j_t}{j_i} \right| = |S|^2$$

其满足:

$$R_r + T = 1$$

也就是概率守恒.

Attention. 这里需要注意区分透射/反射振幅系数和透射/反射系数, 二者并不相同, 前者是一个复数, 后者是前者的模方.

另一方面, 对于波函数 $\psi = A \exp(ikx)$ 注意概率流为满足:

$$j = \frac{\hbar k}{m} |A|^2 \propto k |A|^2$$

而透射系数/反射系数定义为概率流密度的比值, 因此有时不一定 $T = |S|^2$, 两侧的 k 可能不同, 需要写成:

$$T = \frac{k_t}{k_i} |S|^2, \quad R_r = |R|^2$$

其中 k_t 是透射波的波矢, k_i 是入射波的波矢, 只有当二者相等时, 才有 $T = |S|^2$. (对于反射波, 由于在同一个区域, 因此没有这个问题)

对于势垒内部, 满足:

$$\psi'' - \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} \psi = 0$$

定义 $\beta = \sqrt{2m(V_0 - E)/\hbar^2}$, 因此:

$$\psi = Ae^{\beta x} + Be^{-\beta x}$$

其中 A, B 是待定系数. 在势垒边界, 有波函数连续, 波函数导数连续, 因此, 在 $x = 0$ 处, 有:

$$1 + R = A + B$$

$$ik - ikR = \beta A - \beta B$$

同理, 在 $x = a$

$$Ae^{\beta a} + Be^{-\beta a} = Se^{ika}$$

$$\beta Ae^{\beta a} - \beta Be^{-\beta a} = ikSe^{ika}$$

上面四个方程, 可以求解出 A, B, S, R 四个待定系数, 有:

$$R = \frac{(k^2 + \beta^2) \sinh(\beta a)}{2ik\beta \cosh(\beta a) + (k^2 - \beta^2) \sinh(\beta a)}$$

$$S = \frac{2ik\beta e^{-ika}}{2ik\beta \cosh(\beta a) + (k^2 - \beta^2) \sinh(\beta a)}$$

$$A = \frac{ik(\beta + ik)e^{-\beta a}}{2ik\beta \cosh(\beta a) + (k^2 - \beta^2) \sinh(\beta a)}$$

$$B = \frac{ik(\beta - ik)e^{\beta a}}{2ik\beta \cosh(\beta a) + (k^2 - \beta^2) \sinh(\beta a)}$$

因此，透射系数和散射系数分别为：

$$T = |S|^2 = \frac{4k^2\beta^2}{(k^2 + \beta^2)^2 \sinh^2(\beta a) + 4k^2\beta^2}$$

$$R_r = |R|^2 = \frac{(k^2 + \beta^2)^2 \sinh^2(\beta a)}{(k^2 + \beta^2)^2 \sinh^2(\beta a) + 4k^2\beta^2}$$

不难验证： $T + R_r = 1$ ，也就是满足概率守恒。

隧穿效应：一般而言 $\beta a \gg 1$ ，也就是势垒比较宽或者势垒比较高的情况，此时：

$$\sinh(\beta a) \approx \frac{1}{2}e^{\beta a}$$

此时，透射系数：

$$\begin{aligned} T &= \frac{4k^2\beta^2}{(k^2 + \beta^2)^2 \sinh^2(\beta a) + 4k^2\beta^2} \\ &\approx \frac{4k^2\beta^2}{\frac{1}{4}(k^2 + \beta^2)^2 e^{2\beta a}} \\ &= \frac{16k^2\beta^2}{(k^2 + \beta^2)^2} e^{-2\beta a} \\ &= \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} \exp\left[-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}\right] \end{aligned}$$

可见，即使 $E < V_0$ ，透射系数 T 也不为 0，尤其是当 a 比较小时，这就是量子力学中的**隧穿效应**。

3.2.4 方势阱的散射态

取势阱：

$$V = \begin{cases} -V_0, & 0 < x < a \\ 0, & \text{Other} \end{cases}$$

我们可以将方势阱看成是前面方势垒的 $V_0 \rightarrow -V_0$ 的情况，只需要将之前解的 V_0 用 $-V_0$ 代替即可。此时对前面的解进行如下替换：

$$\beta \rightarrow i\beta = i\sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}}$$

注意到：

$$\sinh(i\beta a) = i\sin(\beta a), \quad \cosh(i\beta a) = \cos(\beta a)$$

因此，容易解得透射系数和反射系数：

$$T = \frac{4k^2\beta^2}{(k^2 + \beta^2)^2 \sin^2(\beta a) + 4k^2\beta^2}$$

$$R_r = \frac{(k^2 + \beta^2)^2 \sin^2(\beta a)}{(k^2 + \beta^2)^2 \sin^2(\beta a) + 4k^2\beta^2}$$

其中：

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad \beta = \sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}}$$

因此，透射系数 T 可写为：

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(E+V_0)} \sin^2(\beta a)}$$

- 当 $E \ll V_0$ 时, 一般情况下 $\sin^2(\beta a) \neq 0$, 透射系数 $T \ll 1$, 波函数几乎全部反射.
- 当 $E \gg V_0$ 时, 一般情况下 $\sin^2(\beta a) \neq 0$, 透射系数 $T \rightarrow 1$, 波函数几乎全部透射.

但当 $\sin \beta a = 0$ 时, 有 $T = 1$, 此时为共振透射. 此时:

$$\beta a = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

解得共振能级:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} - V_0$$

3.3 Delta 势

3.3.1 Delta 势垒的散射态

取势垒:

$$V = \gamma \delta(x)$$

能量本征方程:

$$\psi'' = \frac{2m}{\hbar^2} [\gamma \delta(x) - E] \psi$$

在 $(-\varepsilon, +\varepsilon)$ 积分并让 $\varepsilon \rightarrow 0$, 有:

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m}{\hbar^2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \gamma \delta(x) \psi(x) dx = \frac{2m\gamma}{\hbar^2} \psi(0)$$

可见此时波函数 ψ 的导数在 $x = 0$ 不连续. 但波函数 ψ 在 $x = 0$ 连续.

对于 $x \neq 0$, 波函数可以写成:

$$\psi = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < 0 \\ Se^{ikx}, & x > 0 \end{cases}$$

其中 $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ 代入边界条件, 有:

$$S = 1 + R$$

$$ikS - ik + ikR = \frac{2m\gamma}{\hbar^2} S$$

解得:

$$R = \frac{-i\beta}{2k + i\beta}$$

$$S = \frac{2k}{2k + i\beta}$$

其中 $\beta = 2m\gamma/\hbar^2$, 则:

$$T = |S|^2 = \frac{4k^2}{4k^2 + \beta^2} = \frac{1}{1 + \frac{m\gamma^2}{2\hbar^2 E}}$$

$$R_r = |R|^2 = \frac{\beta^2}{4k^2 + \beta^2} = \frac{1}{1 + \frac{2\hbar^2 E}{m\gamma^2}}$$

3.3.2 Delta 势阱的束缚态

取势能：

$$V(x) = -\gamma\delta(x)$$

粒子能量 $E < 0$ ，边界条件满足：

$$\begin{aligned}\psi(0^+) &= \psi(0^-) \\ \psi'(0^+) - \psi'(0^-) &= -\frac{2m\gamma}{\hbar^2}\psi(0)\end{aligned}$$

在 $x \neq 0$ 处，有：

$$\psi'' + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0 \implies \beta^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2} > 0$$

注意这里 $E < 0$ ，因此 β 是实数，解得：

$$\psi = Ae^{\beta x} + Be^{-\beta x}$$

由于势能 $V(x)$ 是偶函数，因此我们可以把波函数分为偶宇称和奇宇称。

对于奇宇称，有：

$$\psi = \begin{cases} Ce^{-\beta x}, & x > 0 \\ -Ce^{\beta x}, & x < 0 \end{cases}$$

带入 $\psi(0^+) = \psi(0^-)$ 解得 $C = 0$ ，无意义，因此不存在奇宇称束缚态。

对于偶宇称，有：

$$\psi = \begin{cases} Ce^{-\beta x}, & x > 0 \\ Ce^{\beta x}, & x < 0 \end{cases}$$

带入边界条件，有：

$$-\beta C - \beta C = -\frac{2m\gamma}{\hbar^2}C \implies \beta = \frac{m\gamma}{\hbar^2}$$

有且只有一个解，因此有且只有一个束缚态，此时能级为：

$$E_0 = -\frac{\hbar^2\beta^2}{2m} = -\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}$$

因此：

$$\psi(x) = Ce^{-\beta|x|}$$

带入归一化条件：

$$\begin{aligned}1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 dx \\ &= 2C^2 \int_0^{\infty} e^{-2\beta x} dx \\ &= \frac{C^2}{\beta}\end{aligned}$$

因此 $C = \sqrt{\beta}$ ，能量本征函数为：

$$\psi(x) = \sqrt{\beta}e^{-\beta|x|}$$

这里定义 Delta 势的特征长度：

$$L = \frac{1}{\beta} = \frac{\hbar^2}{m\gamma}$$

3.4 一维谐振子

取势能:

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

定态薛定谔方程满足:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] \psi = E\psi$$

进行无量纲化:

$$\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}, \quad \xi = \alpha x, \quad \lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

定态薛定谔方程两边同乘 $2/\hbar\omega$, 得到:

$$\left[-\frac{\hbar}{m\omega} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{m\omega}{\hbar} x^2 \right] \psi = \frac{2E}{\hbar\omega} \psi$$

因此:

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi = 0$$

从而化为 Weber 方程.

考虑 $x \rightarrow \infty$ 也就而是 $\xi \rightarrow \infty$ 时的渐进解, 易得:

$$\psi'' - \xi^2\psi = 0 \implies \psi \sim e^{\pm \frac{\xi^2}{2}}$$

我们要求 $\xi \rightarrow \infty$ 时 $\psi \rightarrow 0$, 因此:

$$\psi \sim e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

从而解可以写成:

$$\psi = e^{-\frac{\xi^2}{2}} H(\xi)$$

带入 Weber 方程, 化简得到:

$$H'' - 2\xi H' + (\lambda - 1)H = 0$$

从而得到 Hermite 方程.

Remark 3.4.1 (Hermite 方程的解). 注意到 $\xi = 0$ 为方程的常点 (方程系数解析的点), 因此可以在 $\xi = 0$ 进行展开:

$$H = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \xi^k$$

因此:

$$\begin{aligned} H' &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k \xi^{k-1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} \xi^k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 H'' &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)a_k \xi^{k-2} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2} \xi^k
 \end{aligned}$$

带回原先方程，有：

$$\sum_{k=1}^{\infty} [(k+2)(k+1)a_{k+2} - 2ka_k + (\lambda-1)a_k] \xi^k = 0$$

$$2a_2 + (\lambda-1)a_0 = 0$$

因此：

$$a_{k+2} = \frac{2k - (\lambda-1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

从而可以设：

$$H(\xi) = a_0 H_0(\xi) + a_1 H_1(\xi)$$

其中：

$$\begin{aligned}
 H_0(\xi) &= 1 + \frac{1-\lambda}{2!} \xi^2 + \frac{1}{24} (1-\lambda)(5-\lambda) \xi^4 + \cdots \\
 H_1(\xi) &= \xi + \frac{3-\lambda}{3!} \xi^3 + \frac{1}{120} (3-\lambda)(7-\lambda) \xi^5 + \cdots
 \end{aligned}$$

Appendix A

常用公式

A.1 数学公式表

三角函数和指数函数转换

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

二次函数配分

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

Gauss 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ax^2+bx)} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}}$$

Gamma 函数

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

当 z 为正整数时, $\Gamma(n+1) = n!$. 特别地, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Fourier 变换

$$\mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F(k)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk$$

Delta 函数

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk$$

Green 第二恒等式

$$\int a \nabla^2 b - b \nabla^2 a \, d^3x = \oint (a \nabla b - b \nabla a) \cdot d\mathbf{S}$$

Proof. 注意到:

$$\nabla \cdot (a \cdot \nabla b) = \nabla a \cdot \nabla b + a \nabla^2 b$$

$$\nabla \cdot (b \cdot \nabla a) = \nabla b \cdot \nabla a + b \nabla^2 a$$

两式相减, 并由 Gauss 定理, 有:

$$\begin{aligned} \int a \nabla^2 b - b \nabla^2 a \, d^3x &= \int \nabla \cdot (a \nabla b - b \nabla a) \, d^3x \\ &= \oint (a \nabla b - b \nabla a) \cdot d\mathbf{S} \end{aligned}$$

□

A.2 特殊函数

Hermite 多项式 Hermite 多项式 (H_n) 为如下微分方程的解:

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0$$

其是权函数 $\exp(-x^2)$, 定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的正交多项式.

递推关系:

$$H_{n+1} = 2xH_n - 2nH_{n-1}$$

母函数:

$$e^{2tx-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n$$

正交性:

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m(x) H_n(x) e^{-x^2} dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{mn}$$

前 n 个项:

$$H_0(x) = 1$$

$$H_1(x) = 2x$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x$$