




기후요소 및 기후요인

기후	- 어떠한 한 지역에서 오랜 시간 나타나는 대기의 종합적이고, 평균적인 상태 → 약 30년의 평균값을 의미함. - 계절의 변화: 자전축이 기울어져서 태양을 공전하기 때문에 계절의 변화가 나타남.
기후 요소	기온, 강수, 습도, 바람, 일사량 등 → 기후를 구성하는 요소
기후 요인	- 기후가 지역 별로 다르게 나타나는 이유 및 원인 a. 위도 b. 해발고도 c. 수륙분포 d. 지형 e. 해류

Remind



강수



저기압 (상승 기류)

- 가열된 공기가 위로 상승하면 식어서 수증기가 물방울로 변함 (수증기 = 물의 기체 상태)
 - 결과: 구름 생성 및 성장 → **강수**

※ 강수의 종류: 대류, 지형, 전선, 저기압성


고기압 (하강 기류)

- 무거운 공기가 아래로 눌려지면 압축되면서 뜨거워지고 건조해짐
 - 결과: 구름 소멸 → **맑은 날씨**

바람


적도수렴대 (저기압)

- 햇빛을 가장 많이 받아 **뜨거운 공기가 상승**하는 곳
→ 연중 비가 많이 내림






아열대고기압


- 위도 20 ~ 30도 부근. 적도에서 올라온 **공기가 식은 뒤 하강** → 건조하고 뜨거움



바람







열대 기후

열대 우림 (Af)



- 강수량 매우 많음 (가장 적은 달 60mm 이상)
- 적도 근처 (적도 수렴대)
- 이동식 화전 농업 → 얀, 카사바
- 통풍이 잘 되는 옷 + 부패 방지 향신료
- 고상 가옥

열대 사바나 (Aw)





- 여름: 우기(적도수렴대), 겨울: 건기(아열대고압대)
- 적도 위 20도 부근

열대 몬순(Am)



- 여름: 해풍, 겨울: 육풍 → 큰 대륙과 큰 바다 근처
- 동남아(아시아, 태평양), 미국 남동부 등
- 고온 다습한 여름 → 벼농사
- 사바나 지역에 **계절풍**이 작용
 - 여름 계절풍 시기에 강수 집중 (겨울은 건기)

해풍과 육풍




- 기후(날씨)에 영향을 주는 바람은 여러가지가 존재함.
 - 지구 전체 → 무역풍, 편서풍 → 1년 내내 항상 같은 방향으로 부는 바람 → 적도 수렴대와 아열대 고압대를 만들
 - 대륙과 바다 → 계절풍 → 아주 큰 대륙(유라시아 등)과 아주 넓은 바다(태평양 등) 근처에서 특별한 시기에 부는 바람
 - 하나의 도시 → 해풍과 육풍 → 작은 동네(뉴욕, 부산 등)와 작은 바다 근처에서 낮과 밤에 부는 바람

계절풍



- 계절풍

- 해풍과 육풍의 계절 버전 → 여름에는 해풍, 겨울에는 육풍
- 큰 대륙과 큰 바다가 만나는 곳에서 나타남: 유라시아 대륙과 태평양 → 남부아시아, 동남아시아 쪽에서 나타남
- 여름 계절풍 → 습윤한 해풍으로 인해 여름 강수량 ↑
- 겨울 계절풍 → 건조한 육풍으로 인해 겨울 건조



몬순(Am)

열대 사바나(Aw)(10~20)

열대 우림(Af)(0~10)


열대 사바나(Aw)

열대 기후

열대 우림 기후


싱가포르

기온(°C)



열대 몬순 기후


마이애미





사바나 기후

다르에스살람

강수량(mm)







여름 → 아열대 고압대의 상승

온대 기후

온대 기후

- 중위도 부근(30 ~ 60 사이)
- 전체적으로 따뜻한 기후
- 계절에 따른 기온 변화가 뚜렷함
- 기후대 별로 생활 양식이 다름

서안 해양성(Cfb)



- 기온의 연교차 적음 (여름 기온 22도 이하)
- 1년 내내 고른 강수량 (f → 매달 30mm 이상)
- 목축업, 밀 농사 → 혼합 농업
- 대륙 서안 지역에서 나타남

지중해성(Cs)



- 여름에 고온 건조, 겨울에 온난 습윤
- 수목 농업(올리브, 포도 등) → 여름
- 목축업, 밀 농사 → 겨울
- 대륙 서안 지역 + 아열대 고압대의 영향

온대 기후

온대 기후

- 중위도 부근(30 ~ 60 사이)
- 전체적으로 따뜻한 기후
- 계절에 따른 기온 변화가 뚜렷함
- 기후대 별로 생활 양식이 다름

온대 겨울 건조(Cw)




- 여름에 고온 다습, 겨울에 건조 → 계절풍 영향
- 여름 기온 22도 이상
- 벼농사 활발
- 대륙 동안 지역에서 나타남

온난 습윤 기후(Cfa)





- 기본적으로는 Cw랑 똑같음
- but 겨울에 비가 옴 (큰 바다의 영향)
- 벼농사 활발
- 대륙 동안 지역에서 주로 나타남
 - 계절풍의 영향을 받지만 Cw 만큼 극단적이지 않음 → Cw + 큰 바다가 있을 때 Cfa가 나타나기 때문)

온대 기후



온대 기후





냉대 기후

냉대 기후

- 주로 고위도에 발달
- 겨울이 춥고 길며, 여름이 짧음, 연교차가 큼
- 겨울 -3도 미만, 여름 10도 이상
- 침엽수림(타이가) 발달

냉대 습윤 (Df)



- 겨울이 춥고 길고, 여름이 짧음
- 강수량이 1년 내내 고른 편 → 대륙 서안


냉대 겨울 건조 (Dw)




- 대륙의 영향 → 겨울 기온 낮음 + 겨울 강수↓
- 대륙 동안

냉대 기후

냉대 겨울 건조 기후



냉대 습윤 기후




건조 기후

건조 기후

- 남북위 30도 부근
- 연 강수량 500 미만, 강수량 < 증발량
- 일교차 ↑
- 햇빛, 모래를 막기 위한 얇고 긴 옷

스텝(BS)




- 연평균 강수량 250 ~ 500
- 초원(스텝) 발달, 사막 기후 주변에 발달
- 이동식 가옥 → 목축업, 유목 생활

사막(BW)



- 연평균 강수량 250 미만
- 식생이 없는 사막 발달
- 나무 X → 흙벽돌집
- 오아시스 농업, 관개 농업 → 대추야자, 밀 등

건조 기후



한대 기후

한대 기후

- 극지방
- 최난월 10도 미만, 연강수량 매우 적음

툰드라(ET)



- 최난월 0 ~ 10도로 아주 짧은 여름
- 이끼 등의 식생 성장
- 여름에 토양의 상층부가 녹음 (활동층)
- 가옥의 난방 → 고상 가옥
- 순록 유목, 수렵 등 가능

빙설(EF)




- 최난월 0도 미만, 여름 없음
- 연중 지표면이 얼어 있음

한대 기후


툰드라 기후

배로



빙설 기후

보스토크



고산 기후

고산 기후(H)

- 해발 고도가 높아 기온이 상대적으로 낮은 기후
- 열대 고산 기후(AH)
 - 열대 지역 고산 지역에서 나타남
 - 열대 기후에 비해 기온이 낮아 연중 온화한 날씨
 - 상춘 기후(항상 봄 같은 날씨)라고도 부름
- 예외
 - 온대 및 지역 고산지대 → 사실상 한대기후

열대 고산 기후(AH)

