GL
BIOCHEM BRAZIL

CATÁLOGO TÉCNICO - LINHA INICIAL 2026

CATÁLOGO OFICIAL 2026 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

IMPORTANTE
Os campos “Dose/Estudo” abaixo são apresentados como referência informativa de pesquisa e não constituem prescrição ou recomendação individualizada. Resultados percentuais são de estudos específicos e não representam garantia de resultado. Este material não inclui instruções operacionais de diluição, preparo de seringa ou aplicação de compostos de pesquisa.

Portfólio inicial

11 produtos • 18 apresentações

Categoria	Produto	Apresentações GL
CONTROLE METABÓLICO / PESO	RETATRUTIDE	10 mg • 20 mg • 30 mg • 60 mg
CONTROLE METABÓLICO / PESO	TIRZEPATIDE	30 mg • 60 mg
CONTROLE METABÓLICO / PESO	CAGRILINTIDE	5 mg
METABOLISMO / COMPOSIÇÃO CORPORAL	AOD-9604	5 mg • 10 mg
METABOLISMO / COMPOSIÇÃO CORPORAL	5-AMINO-1MQ	50 mg
METABOLISMO / COMPOSIÇÃO CORPORAL	AICAR	50 mg
METABOLISMO / COMPOSIÇÃO CORPORAL	TESAMORELIN	20 mg
ENERGIA CELULAR	MOTS-C	20 mg
ENERGIA CELULAR	NAD+	500 mg • 1000 mg
RECUPERAÇÃO	BPC-157 + TB-500	5 mg + 5 mg
ESTÉTICA / PELE	GHK-Cu	50 mg • 100 mg

CONTROLE METABÓLICO / PESO

RETATRUTIDE

Agonista triplo investigacional dos receptores GIP, GLP-1 e glucagon.

10 mg	20 mg	30 mg	60 mg

Foco de pesquisa

Pesquisa em obesidade, controle do peso e parâmetros cardiometabólicos.

DOSE / ESTUDO

1 mg - 10 mg

Referência informativa; não é protocolo individualizado.

RESULTADO OBSERVADO EM ESTUDO

Até 24,2% de redução média de peso em 48 semanas.

Média/desfecho do estudo citado; resultados individuais variam.

Nível de evidência: HUMANO - ensaio clínico; resultado depende do estudo e população.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

CONTROLE METABÓLICO / PESO

TIRZEPATIDE

Agonista duplo dos receptores GIP e GLP-1.

30 mg	60 mg

Foco de pesquisa

Pesquisa e uso clínico em controle glicêmico e manejo do peso, conforme indicação regulatória aplicável.

DOSE / ESTUDO

1 mg - 15 mg

Referência informativa; não é protocolo individualizado.

RESULTADO OBSERVADO EM ESTUDO

Até 20,9% de redução média de peso em 72 semanas.

Média/desfecho do estudo citado; resultados individuais variam.

Nível de evidência: HUMANO - FASE 3.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

CONTROLE METABÓLICO / PESO

CAGRILINTIDE

Análogo de amilina de ação prolongada em investigação.

5 mg

Foco de pesquisa

Pesquisa em saciedade, ingestão alimentar e manejo do peso.

DOSE / ESTUDO
250 mcg - 1 mg Referência informativa; não é protocolo individualizado.

Nível de evidência: HUMANO - investigação clínica.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

METABOLISMO / COMPOSIÇÃO CORPORAL

AOD-9604

Fragmento modificado relacionado à região 176-191 do hormônio do crescimento.

5 mg	10 mg

Foco de pesquisa

Investigado historicamente em metabolismo lipídico e obesidade.

DOSE / ESTUDO
500 mcg/dia Referência informativa; não é protocolo individualizado.

Nível de evidência: EVIDÊNCIA LIMITADA / experimental.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

METABOLISMO / COMPOSIÇÃO CORPORAL

5-AMINO-1MQ

Inibidor de NNMT de pequena molécula - não é peptídeo.

50 mg

Foco de pesquisa

Pesquisa pré-clínica em metabolismo energético e vias relacionadas à NNMT/NAD+.

DOSE / ESTUDO
1 - 2 mg/dia Referência informativa; não é protocolo individualizado.

Nível de evidência: PRÉ-CLÍNICO / EXPERIMENTAL.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

METABOLISMO / COMPOSIÇÃO CORPORAL

AICAR

5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleosídeo; análogo de nucleosídeo - não é peptídeo.

50 mg

Foco de pesquisa

Pesquisa em AMPK, metabolismo energético e sinalização celular.

DOSE / ESTUDO
2 mg/dia Referência informativa; não é protocolo individualizado.

Nível de evidência: HUMANO + EXPERIMENTAL; vias e esquemas de pesquisa variam.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

METABOLISMO / COMPOSIÇÃO CORPORAL

TESAMORELIN

Análogo de GHRH.

20 mg

Foco de pesquisa

Estudos clínicos avaliaram redução de tecido adiposo visceral em populações específicas.

DOSE / ESTUDO
1 - 2 mg/dia Referência informativa; não é protocolo individualizado.

Nível de evidência: HUMANO - estudos em populações específicas.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

ENERGIA CELULAR

MOTS-C

Peptídeo derivado da mitocôndria.

20 mg

Foco de pesquisa

Pesquisa em homeostase metabólica, sinalização mitocondrial e envelhecimento.

DOSE / ESTUDO
1 mg/dia Referência informativa; não é protocolo individualizado.

Nível de evidência: EXPERIMENTAL.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

ENERGIA CELULAR

NAD+

Nicotinamida adenina dinucleotídeo; coenzima - não é peptídeo.

500 mg	1000 mg

Foco de pesquisa

Pesquisa em metabolismo redox, bioenergética e sinalização celular.

DOSE / ESTUDO
30 - 60 mg/dia Referência informativa; não é protocolo individualizado.

Nível de evidência: DADOS HUMANOS LIMITADOS / protocolos variáveis.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

RECUPERAÇÃO

BPC-157 + TB-500

Blend experimental de compostos associados a pesquisa de reparo tecidual.

5 mg + 5 mg

Foco de pesquisa

Pesquisa pré-clínica relacionada a sinalização tecidual e recuperação.

DOSE / ESTUDO
1 mg/dia (500 + 500 mcg) Referência informativa; não é protocolo individualizado.

Nível de evidência: EXPERIMENTAL / sem posologia humana estabelecida.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

ESTÉTICA / PELE

GHK-Cu

Tripeptídeo de cobre.

50 mg	100 mg

Foco de pesquisa

Pesquisa em matriz extracelular, colágeno, pele e folículos.

DOSE / ESTUDO
2,5 mg/dia Referência informativa; não é protocolo individualizado.

Nível de evidência: Evidência humana principalmente tópica/cosmética; regime injetável não padronizado.
Conservação/manuseio: seguir COA, especificação técnica e documentação do lote. Não presumir a mesma condição para todos os compostos.

RECONSTITUIÇÃO E MANUSEIO

Antes de qualquer preparo

Orientações gerais de segurança e manuseio para consulta técnica.

ETAPA	PONTO DE CONTROLE	ORIENTAÇÃO
1	Confirmar documentação	Verificar identidade do produto, lote, COA, apresentação e instruções específicas do fabricante.
2	Não padronizar diluente/volume	Diluente, volume, estabilidade e condições após reconstituição podem variar entre compostos e lotes.
3	Técnica asséptica	Qualquer manipulação estéril deve seguir procedimento profissional e requisitos aplicáveis.
4	Armazenamento	Seguir temperatura, proteção à luz e prazo pós-reconstituição documentados para o SKU/lote.

POR QUE NÃO HÁ UMA RECEITA ÚNICA DE DILUIÇÃO

Porque concentração do vial, diluente, estabilidade e especificações variam. Uma instrução genérica pode produzir concentração final incorreta ou contrariar a documentação do lote.

Consultar sempre a documentação técnica específica do SKU e do lote.

ADMINISTRAÇÃO / APLICAÇÃO

Página de segurança para o catálogo

Informações gerais de segurança relacionadas à administração e aplicação.

01	Verifique o status do produto Confirme se o SKU é destinado apenas a pesquisa e quais restrições regulatórias e de uso se aplicam.
02	Não extrapole “Dose/Estudo” A faixa apresentada nas fichas não é instrução de administração e não define volume, frequência ou técnica para um indivíduo.
03	Procedimento clínico Quando houver uso humano legalmente aplicável, técnica, via e acompanhamento devem seguir profissional habilitado e documentação oficial do produto.
04	Eventos adversos Interromper o procedimento e buscar avaliação profissional diante de reação importante, erro de preparo ou suspeita de contaminação.

Tabela comercial

Valores GL Biochem Brazil

Produto	Apresentação	Preço GL
RETATRUTIDE	10 mg	R$ 390,00
RETATRUTIDE	20 mg	R$ 550,00
RETATRUTIDE	30 mg	R$ 880,00
RETATRUTIDE	60 mg	R$ 1.200,00
TIRZEPATIDE	30 mg	R$ 499,00
TIRZEPATIDE	60 mg	R$ 850,00
CAGRILINTIDE	5 mg	R$ 350,00
AOD-9604	5 mg	R$ 299,00
AOD-9604	10 mg	R$ 499,00
5-AMINO-1MQ	50 mg	R$ 499,00
AICAR	50 mg	R$ 600,00
TESAMORELIN	20 mg	R$ 499,00
MOTS-C	20 mg	R$ 499,00
NAD+	500 mg	R$ 400,00
NAD+	1000 mg	R$ 600,00
BPC-157 + TB-500	5 mg + 5 mg	R$ 420,00
GHK-Cu	50 mg	R$ 300,00
GHK-Cu	100 mg	R$ 450,00