

CÓDIGO GLP-1

RECURSO CLÍNICO DESCARGABLE · EDICIÓN JULIO 2026

Manual Maestro de Alimentos y Platillos GLP-1

Base de datos nutricional de ingredientes mexicanos, recetas clínicas adaptadas y protocolos fisiológicos para preservar masa muscular y gestionar la saciedad durante el tratamiento con agonistas GLP-1.

DISEÑADO POR EL EQUIPO EDITORIAL DE CÓDIGO GLP-1 · HECHA EN MÉXICO

CAPÍTULO 01 · METODOLOGÍA CLÍNICA

El binomio GLP-1 y la proteína mexicana

El tratamiento con agonistas del receptor GLP-1 modifica tres ejes fisiológicos: retrasa el vaciamiento gástrico, aumenta la señalización de saciedad central y reduce la secreción de glucagón. Si este entorno farmacológico no se acompaña de una ingesta proteica estratégica, el cuerpo entra en un estado catabólico que degrada el tejido muscular esquelético para obtener aminoácidos. A este fenómeno se le denomina sarcopenia farmacológica.

La sarcopenia reduce el gasto energético basal (GER), creando un terreno propicio para el efecto rebote al suspender el fármaco. Para evitarlo, ~~el paciente requiere un mínimo de 1.6 gramos de proteína por kilo de peso al día~~. La dieta mexicana tradicional, sin embargo, se desbalancea hacia los carbohidratos en el desayuno y la cena, concentrando la proteína en una sola comida.

Este manual resuelve ese problema desglosando ingredientes mexicanos accesibles y proponiendo recetas calibradas para superar el umbral de leucina (2.5 a 3 g por comida), el aminoácido que activa la vía mTOR y estimula la síntesis de nueva fibra muscular.

Cómo leer la matriz nutricional (glosario clínico)

Proteína (g): gramos de aminoácidos por 100 g de porción comestible. El objetivo clínico es sumar 30-40 g por comida principal para asegurar la síntesis proteica.

Grasa (g) y Kcal: densidad energética. Bajo GLP-1 las grasas ralentizan aún más el vaciamiento, exacerbando la náusea. Se prefieren cortes magros (menos de 5 g de grasa por 100 g).

Biodisponibilidad (%): porcentaje real de esa proteína que el intestino absorbe. El huevo es el estándar de oro (100%); las proteínas vegetales aisladas rondan 60-70%.

Digestión gástrica: velocidad a la que el estómago procesa el alimento. Comer carnes de digestión lenta en la cena exagera el reflujo nocturno.

Perfil GLP-1: interacción alimento-fármaco. Terapéutico (mitiga estreñimiento o náusea), Óptimo (potencia saciedad sin irritar la mucosa), Limitar (densidad grasa contraproducente).

Mercurio (riesgo): exclusivo de pescados. Muy bajo permite consumo diario; Medio limita a 2 veces por semana.

Índice glucémico (IG): exclusivo de carbohidratos y frutas. Bajo (menos de 55) evita la hipersecreción de insulina que el GLP-1 intenta controlar.

NOTA DE CORRECCIÓN · 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Donde este capítulo dice que «el paciente requiere un mínimo de 1.6 gramos de proteína por kilo de peso al día», la cifra estaba mal presentada: 1.6 g es el extremo alto de un rango propuesto, no un mínimo. Una asesoría conjunta de cuatro sociedades estadounidenses (2025) recuerda que la ingesta diaria recomendada es de 0.8 g por kilo, que durante la pérdida de peso activa se han propuesto de 1.2 a 1.6 g y que calcularla con el peso actual puede sobrestimar la necesidad en personas con obesidad. En mayores de 65 años sanos, el grupo PROT-AGE recomienda de 1.0 a 1.2 g por kilo, y en enfermedad renal avanzada sin diálisis la cantidad se ajusta.

Registro público: glp1mexico.github.io/codigo-glp1/erratas.html · Detalle en el capítulo 03 del Núm. 05, octubre de 2026.

CAPÍTULO 02 · PROTEÍNAS ANIMALES

Cárnicos, aves, huevos e insectos

Base de datos por cada 100 g de porción comestible cocida. Valores de referencia para el mercado mexicano.

Alimento (100 g)	Prot. (g)	Grasa (g)	Kcal	Biodisp.	Digestión
Pechuga de pollo (sin piel, asada)	31.0	3.6	165	79%	Rápida
Muslo de pollo (sin piel, asado)	24.0	9.0	185	79%	Media
Pierna de pollo (sin hueso, asada)	26.0	8.5	184	79%	Media
Pollo molido (magro, cocido)	27.0	7.0	175	79%	Rápida
Huevo entero (2 pzs ~100 g)	13.0	11.0	155	100%	Rápida
Clara de huevo (4 pzs ~100 g)	11.0	0.2	48	100%	Muy rápida
Pechuga de pavo (natural, asada)	29.0	1.0	125	79%	Rápida
Pavo molido (magro, cocido)	27.0	8.0	170	78%	Rápida
Jamón de pavo (bajo en sodio)	22.0	2.0	106	75%	Rápida
Chorizo de pavo (bajo en grasa)	18.0	9.0	160	75%	Media
Bola de lomo de res (magra)	26.0	5.0	150	80%	Lenta
Carne molida de res (90% magro)	24.0	10.0	176	80%	Lenta
Arrachera (magra, asada)	27.0	9.0	195	80%	Lenta
Hígado de res (cocido)	29.0	5.0	175	80%	Media
Lomo de cerdo (magro, asado)	27.0	6.0	165	78%	Lenta
Pierna de cerdo (magra, asada)	26.0	7.0	170	78%	Lenta
Cabrito (pierna asada, magra)	24.0	8.0	168	78%	Lenta
Chapulines (tostados, sin aceite)	35.0	10.0	230	70%	Media

Análisis clínico: el huevo es la proteína más biodisponible (100%) y económica; con claras incrementa el volumen gástrico sin sumar grasa, ideal para la náusea por GLP-1. El pavo natural y la pechuga de pollo son la base de digestión rápida para cenas. Los cortes de res aportan hierro hemo y creatina (protectores de masa muscular) pero su digestión lenta los reserva para la comida. El hígado es el multivitamínico natural más denso, y los chapulines —proteína prehispánica— rinden 35 g por 100 g con perfil de aminoácidos completo.

CAPÍTULO 03 · MARINOS Y LÁCTEOS

Pescados, mariscos y quesos

Proteínas de digestión ligera, fundamentales para cenas y pacientes con sensibilidad gástrica severa bajo GLP-1.

Alimento (100 g)	Prot. (g)	Grasa (g)	Kcal	Mercurio	Perfil GLP-1
Atún en agua (lata escurrida)	25.0	1.0	110	Bajo	Óptimo
Tilapia (filete a la plancha)	26.0	3.0	128	Muy bajo	Óptimo
Mojarra (asada)	20.0	4.0	120	Muy bajo	Óptimo
Huachinango (filete al horno)	23.0	2.0	110	Bajo	Óptimo
Róbalo (filete a la plancha)	24.0	2.5	118	Bajo	Óptimo
Sierra (asada)	22.0	5.0	140	Bajo	Óptimo
Trucha (al horno)	21.0	7.0	150	Muy bajo	Óptimo
Salmón (filete al horno)	20.0	13.0	208	Bajo	Moderado
Sardina en tomate (lata)	22.0	10.0	180	Muy bajo	Óptimo
Bacalao (desalado, guisado)	21.0	1.5	105	Bajo	Óptimo
Camarón (crudo/pelado)	24.0	0.3	99	Medio	Óptimo
Pulpo (cocido)	22.0	1.0	82	Bajo	Moderado
Queso panela (natural)	18.0	5.0	115	N/A	Óptimo
Queso Oaxaca (hebra)	24.0	16.0	250	N/A	Limitar
Queso cotija (desmenuzado)	24.0	20.0	276	N/A	Limitar
Requesón (light)	12.0	1.0	55	N/A	Terapéutico
Yogur griego natural (sin azúcar)	10.0	0.7	59	N/A	Terapéutico
Queso cottage (light)	11.0	2.0	72	N/A	Terapéutico

Análisis clínico: el pescado blanco (tilapia, huachinango, róbal, bacalao) es la proteína ideal para la noche: alta carga proteica, digestión ligera y mínima grasa que no estanca el vaciamiento. La sardina y la trucha suman omega-3 antiinflamatorio. Entre los lácteos, el yogur griego, el requesón y el cottage aportan caseína y suero que cuidan la microbiota (alterada por el estreñimiento del GLP-1); el panela es el queso sólido más seguro, mientras Oaxaca y cotija se limitan a 20-30 g por su grasa, que dispara el reflujo.

CAPÍTULO 04 · BOTÁNICOS Y LEGUMINOSAS

Frijoles, maíz, quelites y verduras endémicas

El soporte volumétrico de la dieta mexicana: fibra soluble para la saciedad y el tránsito gastrointestinal.

Alimento (100 g cocido)	Prot. (g)	Carb. (g)	Fibra (g)	Kcal	Perfil GLP-1
Frijol negro (cocido, sin grasa)	8.8	22.0	8.0	130	Óptimo
Frijol bayo (cocido, sin grasa)	8.5	23.0	7.5	135	Óptimo
Frijol pinto (cocido)	9.0	22.0	7.0	132	Óptimo
Lenteja (cocida)	9.0	20.0	8.0	116	Óptimo
Garbanzo (cocido)	9.0	27.0	8.0	164	Óptimo
Haba (cocida)	8.0	18.0	5.0	110	Óptimo
Edamame / soya verde (cocida)	11.0	10.0	5.0	122	Óptimo
Tortilla de maíz nixtamalizado	5.7	44.0	6.0	218	Moderado
Elote (grano, cocido)	3.3	19.0	2.4	96	Moderado
Nopal (asado, sin mucílago)	1.5	3.0	2.5	22	Terapéutico
Verdolagas (cocidas)	1.5	4.0	2.5	20	Terapéutico
Quelites (cocidos)	2.5	4.0	2.5	25	Terapéutico
Huauzontle (cocido)	3.0	5.0	3.0	30	Terapéutico
Chayote (cocido)	0.8	4.0	1.7	19	Volumétrico
Calabacita (cocida)	1.2	3.0	1.0	17	Volumétrico
Flor de calabaza (salteada)	1.2	2.0	1.0	15	Volumétrico
Hongos (champiñón / seta)	3.0	3.0	1.0	22	Volumétrico
Ejote (cocido)	1.8	7.0	3.0	31	Volumétrico

Análisis clínico: el frijol combinado con maíz forma una proteína completa equivalente a la carne, con fibra que aplanan el pico de glucosa. El garbanzo y el edamame elevan la proteína vegetal por porción. El nopal es el botánico estrella: su mucílago recubre la mucosa gástrica y mitiga la irritación biliar del vaciamiento lento (asarlo sin aceite reduce la baba que causa náusea). Quelites, verdolagas y huauzontle aportan micronutrientes y volumen; las verduras volumétricas activan los receptores de estiramiento gástrico que el GLP-1 sensibiliza, multiplicando la saciedad por muy pocas calorías.

CAPÍTULO 05 · LÍPIDOS Y BOTÁNICOS DULCES

Grasas, semillas y frutas

Moduladores de la respuesta insulínica. Las grasas retrasan el vaciamiento, por lo que se dosifican con precisión bajo GLP-1.

Alimento (100 g)	Grasa (g)	Prot. (g)	Carb. (g)	IG	Perfil GLP-1
Aguacate Hass (pulpa)	14.7	2.0	8.5	15 (bajo)	Óptimo (dosis)
Aceite de aguacate (1 cda)	13.0	0.0	0.0	0	Terapéutico
Aceite de oliva virgen (1 cda)	13.0	0.0	0.0	0	Terapéutico
Pepita de calabaza (tostada)	30.0	25.0	15.0	15 (bajo)	Óptimo
Almendra (cruda, sin cáscara)	49.0	21.0	22.0	15 (bajo)	Moderado
Nuez de Castilla	65.0	15.0	14.0	15 (bajo)	Moderado
Cacahuete (natural, sin sal)	49.0	26.0	16.0	14 (bajo)	Moderado
Ajonjolí (semilla)	50.0	18.0	23.0	35 (bajo)	Óptimo
Chía (2 cdas ~28 g)	9.0	5.0	12.0	1 (muy bajo)	Terapéutico
Linaza (molida)	42.0	18.0	29.0	1 (muy bajo)	Terapéutico
Papaya (trozo)	0.3	0.5	11.0	60 (medio)	Terapéutico
Guayaba (pieza)	0.9	2.6	14.0	12 (bajo)	Óptimo
Fresa (taza)	0.3	0.7	8.0	40 (bajo)	Óptimo
Tuna (fruta de nopal)	0.5	0.7	10.0	30 (bajo)	Óptimo
Jícama (cruda)	0.1	0.7	9.0	17 (bajo)	Terapéutico
Mango ataulfo (trozo)	0.4	0.8	15.0	51 (medio)	Moderado
Mamey (pulpa)	0.5	1.0	32.0	50 (medio)	Limitar
Plátano tabasco (maduro)	0.3	1.1	23.0	62 (medio)	Limitar

Análisis clínico: bajo GLP-1 la grasa no es el enemigo, pero el exceso sí: el aguacate aporta ácido oleico antiinflamatorio, pero por arriba de 50 g por comida dispara la náusea. Pepita, ajonjolí, chía y linaza son el tratamiento de primera línea para el estreñimiento severo (fibra soluble + magnesio). La papaya contiene papaína, enzima proteolítica que ayuda a digerir la carne en un estómago perezoso. Entre las frutas, guayaba, fresa, tuna y jícama tienen IG bajo y mucha fibra; mango, mamey y plátano se limitan por su carga glucémica que contrarresta el control insulínico del fármaco.

CAPÍTULO 06 · DESAYUNOS

Desayunos de impacto metabólico

Calibrados para romper el ayuno superando el umbral de leucina y activar mTOR sin saturar la capacidad gástrica.

1. Huevos motuleños clínicos (fit)

TIEMPO 15 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 35 g

INGREDIENTES

- 2 huevos enteros
- 50 g de jamón de pavo en cubos
- ½ taza de frijoles negros machacados
- 1 tostada horneada (sin freír)
- 30 g de queso panela
- Salsa de tomate verde

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	420 kcal
Proteína	35 g
Carbohidratos	18 g
Grasas	20 g
Fibra	6 g

Justificación GLP-1: Sustituimos el frijol frito en manteca por frijol machacado natural y el queso doble crema por panela: baja la carga lipídica que exacerba el reflujo, mientras el jamón de pavo y los huevos disparan un pico de leucina rápido para activar mTOR matutino.

2. Omelette de nopal y queso panela

TIEMPO 10 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 28 g

INGREDIENTES

- 3 claras de huevo + 1 yema
- 100 g de nopal asado en tiritas
- 50 g de queso panela
- 1 cda de cebolla picada
- Cilantro fresco
- 1 cdta de aceite de aguacate

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	310 kcal
Proteína	28 g
Carbohidratos	8 g
Grasas	18 g
Fibra	4 g

Justificación GLP-1: Usar 3 claras reduce la carga lipídica del huevo entero y evita el reflujo. El nopal aporta fibra soluble que ralentiza la absorción de grasa, y el panela cubre la leucina sin recurrir a quesos curados de digestión lenta.

3. Cazuela de frijol con huevo y chorizo de pavo

TIEMPO 12 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 32 g

INGREDIENTES

- 2 huevos enteros
- 40 g de chorizo de pavo (bajo en grasa)
- 1 taza de frijol de la olla
- ¼ de aguacate
- 2 tortillas de maíz tibias

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	480 kcal
Proteína	32 g
Carbohidratos	25 g
Grasas	25 g
Fibra	10 g

Justificación GLP-1: El chorizo de cerdo dispara la náusea por su grasa saturada; la versión de pavo conserva el perfil de achiote y chile con digestión rápida. El caldo de frijol hidrata el estómago y el aguacate aporta grasa monoinsaturada que no irrita la mucosa.

4. Smoothie proteico de guayaba y chía

TIEMPO 5 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 24 g

INGREDIENTES

- 200 g de yogur griego natural
- 1 guayaba
- 1 cda de chía hidratada
- ½ taza de fresa
- Hielo y agua al gusto

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	250 kcal
Proteína	24 g
Carbohidratos	22 g
Grasas	4 g
Fibra	8 g

Justificación GLP-1: El formato líquido es ideal para la saciedad extrema matutina: aporta proteína sin exigir volumen sólido. La caseína del yogur griego prolonga la liberación de aminoácidos, y la chía suma fibra soluble que combate el estreñimiento clásico del GLP-1.

5. Machaca norteña con huevo (fit)

TIEMPO 12 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 32 g

INGREDIENTES

- 40 g de machaca de res seca
- 2 huevos enteros
- ½ tomate, ¼ de cebolla
- Chile serrano al gusto
- 1 cdta de aceite de aguacate
- 1 tortilla de maíz

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	300 kcal
Proteína	32 g
Carbohidratos	6 g
Grasas	16 g
Fibra	2 g

Justificación GLP-1: La machaca concentra proteína deshidratada en muy bajo volumen, clave cuando la capacidad gástrica está reducida por el fármaco. El huevo completa el perfil de leucina para activar mTOR sin exceso de grasa.

6. Chilaquiles verdes horneados con pollo

TIEMPO 18 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 36 g

INGREDIENTES

- 2 tostadas horneadas troceadas
- 1 taza de salsa verde de tomatillo
- 120 g de pollo deshebrado
- 30 g de queso panela
- Cebolla y cilantro

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	380 kcal
Proteína	36 g
Carbohidratos	26 g
Grasas	12 g
Fibra	4 g

Justificación GLP-1: Usar tostada horneada en vez de totopo frito recorta ~200 kcal de grasa que provocarían reflujo inmediato. El pollo magro aporta la carga proteica que el chilaquil tradicional no tiene, y el tomatillo estimula las enzimas gástricas.

Perla clínica · El primer bocado: empieza siempre por la proteína, antes de la tortilla o el carbohidrato. Aprovechas la ventana de máxima capacidad gástrica —cuando el estómago aún no se llena por el vaciamiento lento— y alcanzas el umbral de leucina antes de saciarte por completo.

CAPÍTULO 07 · COMIDAS FUERTES

Comidas tradicionales adaptadas

Tacos y guisos mexicanos con control estricto de densidad calórica y maximización de proteína.

7. Tacos de tinga de pavo

TIEMPO 25 MIN · 3 TACOS · PROTEÍNA 42 g

INGREDIENTES

- 150 g de pechuga de pavo deshebrada
- 1 chipotle en adobo
- ½ cebolla en julianas
- 3 tortillas de maíz
- 30 g de queso cotija (garnish)
- 1 taza de lechuga romana

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	390 kcal
Proteína	42 g
Carbohidratos	20 g
Grasas	15 g
Fibra	4 g

Justificación GLP-1: Con pavo en vez de pierna de pollo y chorizo, logramos un volumen altísimo por pocas calorías. La lechuga romana añade volumen gástrico sin kcal, activando los receptores de estiramiento que el GLP-1 sensibiliza para una saciedad temprana.

8. Fajitas de res con pimientos

TIEMPO 20 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 45 g

INGREDIENTES

- 150 g de res (bola de lomo) en tiras
- 1 pimiento morrón
- ½ zanahoria en tiras finas
- ½ cebolla blanca
- Comino, ajo, pimienta
- 1 cda de aceite de oliva

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	480 kcal
Proteína	45 g
Carbohidratos	15 g
Grasas	22 g
Fibra	4 g

Justificación GLP-1: La bola de lomo es el corte de res más magro de México; cortada fina y salteada en seco acelera el tránsito (la res es la carne de digestión más lenta). La zanahoria da dulzor natural sin necesidad de salsas azucaradas.

9. Caldo tlalpeño con pollo y garbanzo

TIEMPO 30 MIN · 1 TAZÓN · PROTEÍNA 38 g

INGREDIENTES

- 120 g de pechuga de pollo deshebrada
- ½ taza de garbanzo cocido
- 1 chipotle, epazote
- ¼ de aguacate
- 1 taza de caldo desgrasado

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	360 kcal
Proteína	38 g
Carbohidratos	22 g
Grasas	12 g
Fibra	8 g

Justificación GLP-1: El caldo caliente hidrata y relaja el estómago perezoso, reduciendo la sensación de pesadez. El garbanzo suma proteína vegetal y fibra prebiótica que regula la microbiota alterada por la dismotilidad del GLP-1.

10. Albóndigas de res al chipotle (en caldillo)

TIEMPO 30 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 40 g

INGREDIENTES

- 150 g de res molida magra (90/10)
- 2 cdas de avena
- Caldillo de tomate sin freír
- Chipotle y hierbabuena
- Calabacita en cubos

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	390 kcal
Proteína	40 g
Carbohidratos	14 g
Grasas	16 g
Fibra	3 g

Justificación GLP-1: Cocinarlas en caldillo, no fritas, elimina la grasa que dispara el reflujo. La avena dentro de la albóndiga aporta betaglucanos que enlentecen la absorción de glucosa, potenciando el control insulínico del fármaco.

Perla clínica · Temperatura del plato: sirve las comidas tibias, nunca ardiendo ni heladas. El calor moderado relaja el píloro y mejora el vaciamiento gástrico; las temperaturas extremas aumentan el espasmo y la sensación de plenitud dolorosa bajo GLP-1.

CAPÍTULO 08 · COCINA TRADICIONAL DE FONDO

Guisos de celebración, reestructurados

Platillos de fiesta mexicana adaptados para mantener el paladar original sin disparar la intolerancia gástrica.

11. Pozole rojo fit (maíz y proteína magra)

TIEMPO 45 MIN · 1 TAZÓN · PROTEÍNA 38 g

INGREDIENTES

- 120 g de lomo de cerdo asado en cubos
- ½ taza de maíz pozolero
- 1 taza de caldo desgrasado
- Salsa de guajillo y ancho (sin freír)
- Rábanos, lechuga, cebolla

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	420 kcal
Proteína	38 g
Carbohidratos	22 g
Grasas	16 g
Fibra	6 g

Justificación GLP-1: El pozole tradicional usa maciza grasosa y exceso de maíz que dispara la glucosa. Esta versión reduce el maíz a media taza, usa lomo magro y elimina el aceite de la salsa. El caldo caliente hidrata el estómago perezoso y los rábanos dan volumen sin calorías.

12. Cochinita pibil fit (adaptada)

TIEMPO 30 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 38 g

INGREDIENTES

- 120 g de lomo de cerdo magro
- Achiote, jugo de naranja agria, comino
- ½ cebolla morada encurtida
- 3 tortillas de maíz pequeñas
- Ensalada de pepino con limón

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	410 kcal
Proteína	38 g
Carbohidratos	22 g
Grasas	14 g
Fibra	4 g

Justificación GLP-1: Se elimina la grasa de la panza de cerdo. La acidez de la naranja agria y el vinagre de la cebolla encurtida estimulan las enzimas gástricas, compensando la ralentización del vaciado, y el pepino aporta agua estructurada contra el estreñimiento.

13. Mole de olla con res magra y verduras

TIEMPO 45 MIN · 1 TAZÓN · PROTEÍNA 34 g

INGREDIENTES

- 120 g de res magra (bola de lomo)
- Calabacita, chayote, ejote
- ½ elote en trozo
- Caldo de chile guajillo
- Epazote fresco

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	360 kcal
Proteína	34 g
Carbohidratos	20 g
Grasas	14 g
Fibra	7 g

Justificación GLP-1: Guiso caldoso de alto volumen y baja densidad calórica: las verduras aportan fibra y agua estructurada para el tránsito intestinal, mientras la res magra sostiene la masa muscular y el caldo caliente facilita la digestión.

14. Birria de res magra en consomé

TIEMPO 50 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 42 g

INGREDIENTES

- 150 g de res magra (chambarete sin grasa)
- Consomé de guajillo y ancho desgrasado
- Cebolla y cilantro
- Jugo de limón
- 2 tortillas de maíz

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	410 kcal
Proteína	42 g
Carbohidratos	18 g
Grasas	16 g
Fibra	3 g

Justificación GLP-1: Servida en consomé y no como taco frito en grasa, mantiene el sabor sin la carga lipídica que provoca reflujo. El caldo caliente y la proteína magra sostienen músculo y prolongan la saciedad central.

Perla clínica · Desgrasado en frío: refrigera el caldo o el guiso una hora y retira la capa de grasa solidificada en la superficie. Eliminas hasta 200 kcal de grasa saturada sin tocar el sabor, evitando el reflujo nocturno tan común con GLP-1.

CAPÍTULO 09 · CENAS LIGERAS

Cenas de digestión rápida

Formatos ligeros y líquidos para no cargar el estómago de noche y evitar el reflujo del vaciamiento lento.

15. Enchiladas verdes de pollo (sin fritura)

TIEMPO 30 MIN · 3 ENCHILADAS · PROTEÍNA 40 g

INGREDIENTES

- 150 g de pechuga de pollo deshebrada
- 3 tortillas al vapor (no aceite)
- 1 taza de salsa verde cocida
- 30 g de queso panela
- ¼ de cebolla, crema ligera (1 cda)

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	450 kcal
Proteína	40 g
Carbohidratos	24 g
Grasas	15 g
Fibra	3 g

Justificación GLP-1: El pecado de las enchiladas es el aceite donde se fríe la tortilla; al pasarla por vapor conservamos textura pero eliminamos ~200 kcal de grasa saturada que causarían reflujo. El tomatillo aporta acidez que estimula la digestión.

16. Crema de flor de calabaza con pollo

TIEMPO 15 MIN · 1 TAZÓN · PROTEÍNA 30 g

INGREDIENTES

- 120 g de pechuga de pollo deshebrada
- 1 taza de flor de calabaza
- ½ cebolla, 1 diente de ajo
- 1 taza de caldo desgrasado
- 1 cda de aceite de aguacate

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	240 kcal
Proteína	30 g
Carbohidratos	8 g
Grasas	9 g
Fibra	2 g

Justificación GLP-1: Las cremas líquidas son el formato ideal para la saciedad extrema. La flor de calabaza, rica en potasio y de digestión intragástrica casi nula, pasa directo al intestino para hidratar el tracto y prevenir el estreñimiento.

17. Ensalada de nopal asado con atún

TIEMPO 15 MIN · PORCIÓN 1 · PROTEÍNA 30 g

INGREDIENTES

- 1 lata de atún en agua escurrida
- 1 taza de nopal asado en cubos
- ½ tomate, ¼ de cebolla
- Cilantro, limón y chile
- 1 cdta de aceite de oliva

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	230 kcal
Proteína	30 g
Carbohidratos	10 g
Grasas	6 g
Fibra	5 g

Justificación GLP-1: Cena de digestión rápida que no carga el estómago de noche. El mucílago del nopal protege la mucosa gástrica y su fibra soluble mejora la evacuación matutina, mientras el atún aporta proteína magra de absorción ligera.

18. Sopa de lima yucateca (fit)

TIEMPO 25 MIN · 1 TAZÓN · PROTEÍNA 30 g

INGREDIENTES

- 120 g de pechuga de pollo deshebrada
- Caldo de pollo desgrasado
- Jugo de 1 lima
- 1 tostada horneada en tiras
- Jitomate y chile al gusto

APORTE NUTRICIONAL

Calorías	240 kcal
Proteína	30 g
Carbohidratos	12 g
Grasas	6 g
Fibra	2 g

Justificación GLP-1: Caldo cítrico ligero perfecto para la noche: la acidez de la lima estimula las enzimas gástricas y facilita la digestión en estómagos de vaciamiento lento, sin la grasa de la versión tradicional con totopos fritos.

Perla clínica · Cierre de 3 horas: termina de cenar al menos 3 horas antes de acostarte. Con el vaciamiento ralentizado, dormir con el estómago lleno provoca reflujo y micro-despertares que elevan el cortisol y sabotean la recomposición corporal nocturna.

CAPÍTULO 10 · PROTOCOLOS FISIOLÓGICOS

Hidratación, náusea y control de grelina

El estreñimiento severo es el efecto secundario más subreportado con GLP-1. La ralentización del vaciamiento se propaga al intestino delgado y colon, reduciendo la motilidad (peristalsis). Sin hidratación adecuada, las heces se compactan causando dolor abdominal, fisuras y hemorroides.

El objetivo clínico mínimo es de 2.5 a 3 litros de agua al día. Pero beber un litro de golpe genera náusea porque el estómago no vacía rápido: la hidratación debe ser en micro-dosis (sorbos de 50-100 ml cada 20 minutos).

Protocolo botánico anti-náusea

- 1. Infusión de cedrón:** contiene geraniol, que relaja el músculo liso gástrico. Tomar tibia antes de comer.
- 2. Té de manzanilla:** sus flavonoides actúan como agonistas GABAérgicos, reduciendo el componente ansioso de la náusea.
- 3. Raíz de jengibre fresco:** el gingerol bloquea los receptores de serotonina (5-HT3) del estómago. Hervido con limón es el antiemético natural más potente.

Colaciones estructuradas (control de grelina)

Colación clínica (4:00 PM)	Prot. (g)	Kcal	Función fisiológica
Yogur griego natural + 10 almendras	15 g	180	Caseína lenta, saciedad prolongada.
1 lata de atún + 2 galletas horneadas	25 g	160	Carga proteica pura, volumen alto.
2 quesadillas de panela con epazote	18 g	220	Calidez gástrica, comfort food.
Pepino con limón + 50 g de jamón de pavo	12 g	90	Volumen gástrico extremo, cero grasa.
Requesón con guayaba picada	14 g	130	Proteína + fibra, corta el antojo dulce.
Edamame al vapor con limón (1 taza)	17 g	190	Proteína vegetal + fibra prebiótica.

"El músculo que se construye hoy con estos ingredientes es la póliza de seguro que evitará la reganancia de peso el día que el fármaco se suspenda."