Άνω ποσοστιαία σημεία για την κατανομή της σ.σ. των Anderson-Darling στην περίπτωση της κανονικής κατανομής $N(\mu,\sigma^2)$.

Περίπτωση 0: μ,σ^2 γνωστά

Περίπτωση 1: μ άγνωστο,σ^2 γνωστό

Περίπτωση 2: μ γνωστό,σ^2 άγνωστο

Περίπτωση 3: μ,σ^2 άγνωστα.

		α				
$\mathbf{A^2}$	**n**	**0.15**	**0.10**	**0.05**	**0.025**	**0.01**
Περίπτωση 0	≥ 5	1.610	1.933	2.492	3.070	3.857
Περίπτωση 1			0.908	1.105	1.304	1.573
Περίπτωση 2	≥ 5		1.760	2.323	2.904	3.690
Περίπτωση 3	10	0.514	0.578	0.683	0.779	0.926
	20	0.528	0.591	0.704	0.815	0.969
	50	0.546	0.616	0.735	0.861	1.021
	100	0.559	0.631	0.754	0.884	1.047
	∞	0.576	0.656	0.787	0.918	1.092
$A^*=A^2(1+0.75/n+2.25/n^2)$		0.561	0.631	0.752	0.873	1.035

© 2017 Κ. Πετρόπουλος