

№1 Сформулируйте утверждение о связи размерностей ядра и образа линейного отображения.

Пусть $\varphi : V_1 \longrightarrow V_2$ и $\dim V_1 = n$.

Тогда $\dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = n = \dim V_1$.

№2 Дайте определения собственного вектора и собственного значения линейного оператора.

Число λ называется собственным числом линейного оператора $\varphi : V \longrightarrow V$, если существует вектор $v \neq 0$ такой, что $\varphi(v) = \lambda v$. При этом вектор v называется собственным вектором оператора φ .

№3 Дайте определения характеристического уравнения и характеристического многочлена квадратной матрицы.

Для произвольной квадратной матрицы A многочлен вида $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ называется характеристическим многочленом, а уравнение $\chi_A(\lambda) = 0$ называется характеристическим уравнением матрицы A .

№4 Сформулируйте утверждение о связи характеристического уравнения и спектра линейного оператора.

Примечание Здесь немного «отсебятины», потому что переписывал с грубой формулы.

Следующие условия эквивалентны:

1. λ - собственное значение линейного оператора A .
2. $|A - \lambda E| = 0$ (т.е. $\chi_A(\lambda) = 0$ или λ является корнем характеристического многочлена A).

№5 Дайте определение собственного подпространства.

Собственным подпространством, отвечающим собственному значению λ_i оператора A называется множество:

$$V_{\lambda_i} = \{x \in V \mid Ax = \lambda_i x\}$$

№6 Дайте определения алгебраической и геометрической кратности собственного значения. Какое неравенство их связывает?

Алгебраической кратностью собственного значения называют его кратность как корня характеристического уравнения.

Пример $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 5)^3(\lambda - 6)^2(\lambda + 3)$: алгебраическая кратность собственного значения $\lambda = 5$ равна 3.

Геометрической кратностью собственного значения называют размерность собственного подпространства V_{λ_i} .

Геометрическая кратность собственного значения всегда положительна и не превосходит его алгебраической кратности.

№7 Каким свойством обладают собственные векторы линейного оператора, отвечающие различным собственным значениям?

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ - различные собственные значения линейного оператора A ($\forall i \neq j \quad \lambda_i \neq \lambda_j$), а v_1, \dots, v_k - соответствующие им собственные вектора. Тогда вектора v_1, \dots, v_k линейно независимы.

№8 Сформулируйте критерий диагональности матрицы оператора.

Матрица линейного оператора A является диагональной в данном базисе \iff все вектора этого базиса являются собственными векторами данного линейного оператора.

№9 Сформулируйте критерий диагонализруемости матрицы оператора с использованием понятия геометрической кратности.

Матрица линейного оператора диагонализруема \iff для любого его собственного значения геометрическая кратность равна алгебраической кратности.

№10 Дайте определение жордановой клетки. Сформулируйте теорему о жордановой нормальной форме матрицы оператора.

Жорданова клетка размера $m \times m$ соответствующего собственного значения λ_i - матрица вида:

$$J_m(\lambda_i) = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_i \end{pmatrix}}_m \Bigg\} m$$

Жорданова нормальная форма матрицы линейного оператора - блочно-диагональная матрица с Жордановыми клетками на диагонали.

$$J = \begin{pmatrix} J_{m_1}(\lambda_1) & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & J_{m_2}(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & J_{m_s}(\lambda_s) \end{pmatrix}$$

Теорема Любая матрица $A \in M_n(\mathbb{F})$ приводится заменой базиса к Жордановой нормальной форме над алгебраически замкнутым полем.

№11 Выпишите формулу для количества жордановых клеток заданного размера.

Пусть q_h - число жордановых клеток размера $h \times h$ с λ_i на диагонали. Пример:

$$\begin{pmatrix} \boxed{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{5} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{0} & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 5$$

$$q_1(\lambda_1) = 1, q_2(\lambda_1) = 0,$$

$$q_1(\lambda_1) = 0, q_2(\lambda_2) = 1, q_3(\lambda_2) = 1, q_4(\lambda_2) = 0$$

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda + 3)(\lambda - 5)^5$$

Утверждение Для любого собственного значения λ_i $q_h = r_{h+1} - 2r_h + r_{h-1}$, где $r_h = \text{Rg}(A - \lambda E)^h$, $r_0 = \text{Rg} E$

№12 Сформулируйте теорему Гамильтона—Кэли.

$\chi_A(A) = 0$, где χ_A - характеристический многочлен матрицы A .

№13 Дайте определение корневого подпространства.

Корневым подпространством оператора A , соответствующим собственному значению λ_i называют множество: $K_{\lambda_i} = \text{Ker}(A - \lambda_i E)^{m_i}$, где m_i - алгебраическая кратность собственного значения.

№14 Дайте определение минимального многочлена линейного оператора.

Минимальным многочленом линейного оператора A называется многочлен $\mu_A(\lambda)$ такой, что:

1. $\mu_A(A) = 0$
2. $\mu_A \neq 0$
3. Степень многочлена μ_A минимальна и старший коэффициент равен 1.

№15 Дайте определение инвариантного подпространства.

L называется инвариантным подпространством линейного оператора $A : V \rightarrow V$, если $\forall x \in L \quad Ax \in L$ (т.е. $A(L) \subset L$)

№16 Дайте определение евклидова пространства.

Евклидово пространство $\epsilon = (V, g)$ - линейное пространство над \mathbb{R} с определенным скалярным произведением g , где $g(x, y) : V^2 \Rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющим следующим аксиомам:

1. $\forall x, y \in V \quad g(x, y) = g(y, x)$
2. $\forall x, y, z \in V \quad g(x + y, z) = g(x, z) + g(y, z)$
3. $g(\lambda x, y) = \lambda g(x, y)$
4. $g(x, x) \geq 0$, причем $g(x, x) = 0 \iff x = 0$

№17 Выпишите неравенства Коши–Буняковского и треугольника.

Неравенство Коши–Буняковского $\forall x, y \in \epsilon \quad |(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$

Неравенство треугольника $\forall x, y \in \epsilon \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

№18 Дайте определения ортогонального и ортонормированного базисов.

Система векторов v_1, \dots, v_k называется:

- Ортогональной, если $\forall i \neq j \quad (v_i, v_j) = 0$
- Ортонормированной, если она ортогональна и $\forall i \quad (v_i, v_i) = 1$

Если $k = \dim V = n$, то v_1, \dots, v_k будет ортогональным базисом.

Если рассмотреть $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \dots, e_n = \frac{v_n}{\|v_n\|}$, то получим ОНБ (ортонормированный базис).

№19 Дайте определение матрицы Грама.

Пусть a_1, \dots, a_n - базис в ϵ . Тогда $g(x, y) = X^T G Y$, где X, Y - столбцы координат векторов x и y в базисе a_1, \dots, a_n .

$$G = \begin{pmatrix} (a_1, a_1) & \cdots & (a_1, a_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_n, a_1) & \cdots & (a_n, a_n) \end{pmatrix} - \text{матрица Грама.}$$

№20 Выпишите формулу для преобразования матрицы Грама при переходе к новому базису.

Матрицы Грама двух базисов e и e' связаны следующим соотношением: $G' = U^T G U$, где U - матрица перехода от e к e' .