EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTE VIH POR MEDIO DEL CUESTIONARIO "HIV SYMPTOMS INDEX"

MERCADAL ORFILA G , FONT LOPEZ J, PONS STOGER M, LIÑANA GRANELL C, ROMERO DEL BARCO R, BLASCO MASCARO I, MORAL GOMEZ F, SALVADOR GARCIA AI
gabriel.mercadal@hgmo.es
Servicio de Farmacia. H Mateu Orfila (Menorca)

OBJETIVOS

Los PROs(patient reported outcomes) son una herramienta fundamental en la evaluación global de los pacientes. En VIH , el cuestionario HIV symptoms index (HIV-SI) , nos permite evaluar los signos y síntomas que les afectan.
El objetivo fue evaluar el estado de los pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) y comparar si había diferencias entre los diferentes regímenes y entre sexo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, en el que se recogieron datos demográficos, clínicos, farmacológicos, y se pasó el cuestionario HIV-SI a los pacientes que aceptaron contestarlo.
Para la recogida de datos se utilizó el programa de historia clínica electrónica HP HCIS y se les paso el cuestionario HIV-SI.
Cabe destacar que parte del estudio ha sido realizado durante la pandemia del COVID-19, lo cual puede afectar algunos síntomas evaluados.
Se realizó el análisis de datos con SPSS v 26

RESULTADOS



Figura 1. Prevalencia de síntomas según sexo

97 pacientes contestaron el cuestionario
- ✓ 65,7 % hombres
- ✓ edad media 52,79 años(28-75)
- ✓ 28,5 % coinfectados con VHC y/o
- ✓ 85,7 % con triple terapia antitrretroviral)

Los síntomas más frecuentes:
- depósitos de grasa o aumento de peso 49,5 %
- **insomnio 46,4%**
- artromialgias 45,4%

En cambio, los síntomas menos frecuentes
- pérdida de apetito 9,3%
- las náuseas y vómitos 7,2%.

Las **mujeres padecían más prevalencia de síntomas** que los hombres en casi todos los síntomas, habiendo diferencias en :
- tos o dificultad para recuperar el aliento con un 31% mujeres vs 13,3 % hombres (p=0,033)
- ansiedad o nerviosismo con un 55% mujeres vs 30,8% hombres (p=0,048).

En la regresión logística detectamos :
- el **dolor muscular** está **asociado** al sexo femenino (OR= 3,63) , al índice de masa muscular (OR=1,23) y al tratamiento con **inhibidores de la integrasa** (INI) (OR: 3,23)

CONCLUSIONES

Del cuestionario HIV-SI cabe destacar la elevada prevalencia de patología neuropsiquiátrica respecto a otros estudios revisados, lo cual puede haber venido motivado porque dicho cuestionario fue realizado en pleno confinamiento por la pandemia COVID-19
El sexo femenino presenta mayor prevalencia de síntomas
Los inhibidores de la intregrasa se asociaron significativamente a mayor dolor muscular
La evaluación periódica de este cuestionario nos permite trazar un plan de mejora en la farmacoterapia del paciente VIH, en cooperación con el equipo de Infecciosas.
.