USO DEL CUESTIONARIO PSSD EN PACIENTES CON PSORIASIS EN TRATAMIENTO BIOLÓGICO COMO ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

MERCADAL ORFILA G , ESCRIVA SANCHO E, MORAL GÓMEZ F, BLASCO MASCARÓ I, ROMERO DEL BARCO R, LIÑANA GRANELL C, CUBERO ALIAS MP, PONS STOGER M

gabriel.mercadal@hgmo.es

Servicio de Farmacia. H Mateu Orfila (Menorca)

OBJETIVOS

En Psoriasis el cuestionario PSSD (The Psoriasis Symptoms and Signs Diary) , nos permite evaluar los signos y síntomas que afectan a los pacientes con psoriasis.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado de los pacientes con psoriasis en tratamiento biológico desde la consulta de Farmacia Hospitalaria, por medio del PSSD, y proponer a Dermatología cambio de tratamiento si el paciente no presenta un buen control de su psoriasis según puntuación PSSD

MATERIAL Y MÉTODOS

En Julio-Agosto de 2019 revisamos el PSSD de los pacientes activos de nuestro centro, de cara a optimizar los tratamientos que no estuvieran obteniendo un "target terapéutico" deseado (PSSD < 20).(PSSD puntuación 0 sin afectación - 110 máxima afectación).

Los pacientes con PSSD ≥ 20, fueron derivados con interconsulta a Dermatología, para valorar un cambio de diana terapéutica , concretamente a guselkumab

RESULTADOS

Pacientes , n	14
Edad (años), media ± DE	52 ± 14,1
Mujeres(%)	2(20)
Raza	10(100)
Blanca	10(100)
Oriental	0
Negra	0
IMC (kg/m2), Media ± DE	22,9 ± 5,5
Peso (Media +DE)	79,13+ 22,1
Duración de la psoriasis (años), media ± DE	8,8± 5,2
Puntuación PASI (0-72),	11,3 ± 4,6
Tratamientos previos	10(100)
Fármacos tópicos	10(100)
Fototerapia	0
Fármacos sistémicos convencionales	8(80)
Biológicos previos	
1	9(70)
2	3(20)
3	1(10)
Puntuación PSSD inicial [0-100], n	48,5 ± 21

Tabla 1. Cohorte estudiada

- 14 de 45 pacientes (**31,1%)** tenían un **PSSD≥20.**
- El **100%** aceptados a cambiar a Guselkumab

.



Figura 1. Evolución PSSD

CONCLUSIONES

El uso del PSSD en la consulta de Farmacia, nos permite detectar los pacientes que no están correctamente controlados, de acuerdo con la evaluación del propio paciente, y ello redunda en una detección temprana, de cara a optimizar el tratamiento, en colaboración multidisciplinar con Dermatología.

En nuestra serie, el cambio a una nueva diana terapéutica, concretamente anti IL-23 (Guselkumab) obtuvo un resultado satisfactorio en el control de la psoriasis medido por PSSD, pasando de 52,4 puntos basales a 5 puntos de media a los 12 meses , sin ningún evento adverso a 12 meses de evaluación.