POLIFARMACIA , COMORBILIDADES Y RIESGO ANTICOLINÉRGICO EN UNA COHORTE DE PACIENTES VIH DE MENORCA

MERCADAL ORFILA G , FONT LOPEZ J, PONS STOGER M, BLASCO MASCARO I, ROMERO DEL BARCO R, LIÑANA GRANELL C, MORAL GOMEZ F, SALVADOR GARCIA AI
gabriel.mercadal@hgmo.es Servicio de Farmacia. H Mateu Orfila (Menorca)

OBJETIVOS

Evaluar y analizar la polifarmacia, comorbilidades y carga anticolinérgica en una cohorte de pacientes VIH

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo retrospectivo, en el que se revisaron los tratamientos de todos los pacientes con VIH
Las variables estudiadas fueron demográficas, clínicas, y farmacoterapéuticas asociadas a los objetivos del estudio.

RESULTADOS

	n global	Resultado
Edad (mediana años; Q1, Q3)	223	53.00(44,5-58)
Sexo n (% hombres)	223	152 (68.2)
Fumadores n (%)	222	105 (47.3)
Drogas abuso n (%)	223	22 (9.9)
Tiempor desde el diagnóstico (mediana ; Q1,Q3	219	18,75(9,4-27,7)
CD4 recuento (mediana ; Q1,Q3	223	711(509,5-903)
Pacientes indetectables n (%)	223	211 (94.6)
CDC staging n (%)	223	
A1		22 (9.9)
C2		50 (22.4)
C3		12 (5.4)
Coinfección	219	
HCV		55 (25.1)
HBV		5 (2.3)
Transmisión	223	
Parenteral		56(25,1)
Sexual		118(52,9)
TAR(%)	223	
Triple terapia		192(86,1)
Biterapia		16 (7,2)
Interacciones (%)		
si		125(56,1)

Max: maximum; Min: minimum; SD: standard deviation.

Figura 1. Muestra pacientes estudiada



Figura 2. Polimedicación no antirretroviral por sexo



Figura 3. Prevalencia comorbilidades según sexo



Figura 4. Prevalencia de carga anticolinérgica según escala DBI y según sexo

CONCLUSIONES

La serie VIH presentada confirma una elevada prevalencia de comorbilidades de hasta el 86,1%, que lleva aparejada un elevado % de **polimedicación**, que fue **superior en las mujeres**, con un **35,3% vs un 24%** en los hombres (p=0,036).
Esto además, conllevó hasta un **56,1 % de interacciones potenciales**.
Además, observamos una **carga anticolinérgica media o alta de hasta en el 31,3%** de pacientes, con **mayor riesgo en mujeres** vs hombres(39,5% vs 27,5%).