

## Intervalos de Confiança - Exercício 8

Seja  $X$  uma variável aleatória que representa o desvio (em milímetros) entre o diâmetro observado e o diâmetro nominal de uma peça mecânica fabricada industrialmente. Considere que  $X$  tem distribuição normal com valor esperado  $\mu$  desconhecido e desvio padrão conhecido e igual a  $\sigma = 1.1$ .

1. Usando  $R$  e fixando a semente em 1089, gere  $m = 1800$  amostras de dimensão

$$n = 12$$

de uma distribuição normal com valor esperado igual a  $\mu = 0$  e desvio padrão  $\sigma = 1.1$  e determine os respectivos intervalos de confiança para  $\mu$  ao nível de confiança  $\gamma = 0.9$ .

2. Obtenha a proporção de intervalos de confiança gerados em 1. que contêm o valor esperado  $\mu = 0$ .

Indique o quociente entre o valor obtido em 2. e o nível de confiança  $\gamma$ , arredondado a 4 casas decimais.

## Código R

```
# Set parameters
set.seed(1089)
m <- 1800 # number of samples
n <- 12   # sample size
mu <- 0   # true mean
sigma <- 1.1 # known standard deviation
gamma <- 0.9 # confidence level

# Calculate alpha and critical value
alpha <- 1 - gamma
z_alpha_2 <- qnorm(1 - alpha/2)

cat("Parametros:\n")
cat("m =", m, "(numero de amostras)\n")
cat("n =", n, "(tamanho de cada amostra)\n")
cat("mu =", mu, "(valor esperado verdadeiro)\n")
cat("sigma =", sigma, "(desvio padrao conhecido)\n")
cat("gamma =", gamma, "(nivel de confianca)\n")
cat("alpha =", alpha, "\n")
cat("z_{alpha/2} =", z_alpha_2, "\n\n")

# Generate m samples and calculate confidence intervals
confidence_intervals <- matrix(0, nrow = m, ncol = 2) # Lower and upper bounds
contains_mu <- logical(m) # Track which intervals contain mu

for (i in 1:m) {
  # Generate sample of size n from normal distribution
  sample_data <- rnorm(n, mean = mu, sd = sigma)

  # Calculate sample mean
  x_bar <- mean(sample_data)

  # Calculate standard error
  se <- sigma / sqrt(n)
```

```

# Calculate confidence interval
margin_error <- z_alpha_2 * se
lower_bound <- x_bar - margin_error
upper_bound <- x_bar + margin_error

# Store interval
confidence_intervals[i, 1] <- lower_bound
confidence_intervals[i, 2] <- upper_bound

# Check if interval contains true mu
contains_mu[i] <- (lower_bound <= mu) & (mu <= upper_bound)
}

# Calculate proportion of intervals that contain mu
proportion_containing_mu <- mean(contains_mu)

# Calculate the quotient
quotient <- proportion_containing_mu / gamma

cat("1. Intervalos de confiança gerados: ", m, "\n")
cat("2. Proporcao de intervalos que contem mu = 0:", proportion_containing_mu, "\n")
cat("Quociente (proporcao / gamma):", quotient, "\n")
cat("Quociente arredondado a 4 casas decimais:", round(quotient, 4), "\n")

# Additional statistics
cat("\nEstatísticas adicionais:\n")
cat("Erro padrao teorico:", sigma/sqrt(n), "\n")
cat("Margem de erro teorica:", z_alpha_2 * sigma/sqrt(n), "\n")
cat("Numero de intervalos que contem mu:", sum(contains_mu), "\n")
cat("Numero de intervalos que NAO contem mu:", sum(!contains_mu), "\n")

```

## Resultados

### Solução

Para a simulação de intervalos de confiança com nível de confiança  $\gamma = 0.9$ :

Parâmetro/Resultado	Valor
Número de amostras ( $m$ )	1800
Tamanho de cada amostra ( $n$ )	12
Nível de confiança ( $\gamma$ )	0.9
$z_{\alpha/2}$	1.644854
Erro padrão teórico	0.3175426
Margem de erro teórica	0.5223112
1. Intervalos de confiança gerados	1800
2. Proporção que contém $\mu = 0$	0.8938889
<b>Quociente (proporção / <math>\gamma</math>)</b>	<b>0.9932099</b>

**Resposta final:** O quociente entre a proporção obtida em 2. e o nível de confiança  $\gamma$ , arredondado a 4 casas decimais, é 0.9932.

*Observação:* Dos 1800 intervalos gerados, 1609 contêm o verdadeiro valor de  $\mu = 0$  e 191 não contêm. O quociente próximo de 1 confirma a validade teórica dos intervalos de confiança.