

Teste de Hipóteses - Erro Tipo II - Exercício 9

Considere que (X_1, \dots, X_n) é uma amostra aleatória de dimensão n de uma população X com distribuição exponencial. Admita que $E(X) = \mu$ é desconhecido e que

$$T = \frac{2n\bar{X}}{\mu} \sim \chi_{(2n)}^2, \forall \mu \in \mathbb{R}^+.$$

Para testar $H_0 : \mu = \mu_0 = 5$ contra $H_1 : \mu = \mu_1 = 5.4$ pode utilizar-se a estatística de teste T_0 obtida de T admitindo que a hipótese H_0 é verdadeira, rejeitando-se H_0 , ao nível de significância α , se $T_0 > F_{\chi_{(2n)}^2}^{-1}(1 - \alpha)$.

Fixando a semente em 4382, gere $m = 700$ amostras de dimensão $n = 13$ da distribuição exponencial com valor esperado μ_1 . Aplique o teste de hipóteses, ao nível de significância $\alpha = 0.06$, a cada uma das $m = 700$ amostras geradas e calcule uma estimativa, $\hat{\beta}$, da probabilidade teórica do erro de 2 espécie, β .

Obtenha o quociente de $\hat{\beta}$ e β e indique o resultado arredondado a 4 casas decimais.

Código R

```
# Set parameters
set.seed(4382)
m <- 700      # number of samples
n <- 13       # sample size
mu_0 <- 5     # null hypothesis mean
mu_1 <- 5.4   # alternative hypothesis mean
alpha <- 0.06 # significance level

# Calculate critical value for chi-square test
# We reject H0 if T0 > chi2_critical
df <- 2 * n
chi2_critical <- qchisq(1 - alpha, df)

cat("Parametros do teste:\n")
cat("n =", n, "\n")
cat("m =", m, "\n")
cat("mu_0 =", mu_0, "\n")
cat("mu_1 =", mu_1, "\n")
cat("alpha =", alpha, "\n")
cat("Graus de liberdade:", df, "\n")
cat("Valor critico chi-quadrado:", chi2_critical, "\n\n")

# Generate m samples from exponential distribution with mean mu_1
# and apply hypothesis test to each sample
rejections <- 0 # Count how many times we reject H0

for (i in 1:m) {
  # Generate sample from exponential with mean mu_1
  # Note: rexp uses rate parameter = 1/mean
  sample_data <- rexp(n, rate = 1/mu_1)

  # Calculate sample mean
  x_bar <- mean(sample_data)

  # Calculate test statistic T0 under H0 (assuming mu = mu_0)
  T0 <- (2 * n * x_bar) / mu_0

  # Test: reject H0 if T0 > critical value
  if (T0 > chi2_critical) {
    rejections <- rejections + 1
  }
}
```

```

}
}

# Estimate beta (probability of Type II error)
# Beta = P(not reject H0 | H1 is true)
beta_hat <- (m - rejections) / m

cat("Resultados da simulacao:\n")
cat("Numero de rejeicoes de H0:", rejections, "\n")
cat("Numero de nao rejeicoes de H0:", m - rejections, "\n")
cat("Estimativa de beta (beta_hat):", beta_hat, "\n")

# Calculate theoretical beta
# When H1 is true (mu = mu_1), the test statistic follows:
# T = (2*n*X_bar)/mu_0, where X_bar ~ Exp(mu_1)
# We need P(T <= chi2_critical | mu = mu_1)

# Under H1, T = (2*n*X_bar)/mu_0, where X_bar has mean mu_1
# The distribution of T under H1 is more complex, but we can calculate it
# T = (2*n*X_bar)/mu_0 where X_bar ~ Gamma(n, n/mu_1)
# So T ~ Gamma(n, n*mu_0/mu_1) * (2*n/mu_0) = Gamma(n, 2*n/mu_1)

# Actually, 2*n*X_bar/mu_1 ~ chi2(2n) when samples are from Exp(mu_1)
# So T = (2*n*X_bar/mu_0) = (mu_1/mu_0) * (2*n*X_bar/mu_1) ~ (mu_1/mu_0) * chi2(2n)

# The theoretical beta is P(T <= chi2_critical | H1)
# where T ~ (mu_1/mu_0) * chi2(2n)
# This is equivalent to P(chi2(2n) <= chi2_critical * mu_0/mu_1)

adjusted_critical <- chi2_critical * mu_0 / mu_1
beta_theoretical <- pchisq(adjusted_critical, df)

cat("Beta teorico:", beta_theoretical, "\n")

# Calculate quotient
quotient <- beta_hat / beta_theoretical

cat("Quociente beta_hat / beta:", quotient, "\n")
cat("Quociente arredondado a 4 casas decimais:", round(quotient, 4), "\n")

# Additional information
cat("\nInformacoes adicionais:\n")
cat("Valor critico ajustado:", adjusted_critical, "\n")
cat("Poder do teste (1 - beta):", 1 - beta_theoretical, "\n")
cat("Poder estimado (1 - beta_hat):", 1 - beta_hat, "\n")

```

Resultados

Solução

Para o teste de hipóteses sobre a distribuição exponencial com $H_0 : \mu = 5$ vs $H_1 : \mu = 5.4$ e $\alpha = 0.06$:

Parâmetro/Resultado	Valor
Tamanho da amostra (n)	13
Número de simulações (m)	700
Nível de significância (α)	0.06
Graus de liberdade	26
Valor crítico χ^2	38.04354
Número de rejeições de H_0	79
Número de não rejeições de H_0	621
Estimativa de β ($\hat{\beta}$)	0.8871429
β teórico	0.8931416
Quociente $\hat{\beta}/\beta$	0.9932835

Resposta final: O quociente de $\hat{\beta}$ e β , arredondado a 4 casas decimais, é 0.9933.

Observações:

- Poder teórico do teste: $1 - \beta = 0.1069$
- Poder estimado do teste: $1 - \hat{\beta} = 0.1129$
- O quociente próximo de 1 confirma a precisão da estimação simulada do erro tipo II.