



**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(Финансовый университет)**

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий

**В.В.Щиголев**

**Алгебра и геометрия 2**  
Учебное пособие  
по дисциплине «Алгебра и геометрия»

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,  
профиль «Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах»,  
(программа подготовки бакалавра).

*Рассмотрено и одобрено на заседании Департамента анализа данных, при-  
нятия решений и финансовых технологий  
(протокол № от «» 2020 г.)*

Москва, 2020

**УДК 512  
ББК 22.1я73  
Щ76**

**Автор:** Щиголев В.В., доктор физико-математических наук, профессор департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

**Рецензент:** Зададаев С.А., кандидат физико-математических наук, доцент департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

**Алгебра и геометрия 2:** Учебное пособие по дисциплине «Алгебра и геометрия» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», профиль «Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах», (программа подготовки бакалавра).  
- М.: Финансовый университет, департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 2020. 32 с.

Учебное пособие предназначено для использования студентами в часы самостоятельной работы с целью освоения теоретических понятий высшей и линейной алгебры. Материал пособия может быть также полезен студентам-бакалаврам других направлений и профилей, магистрантам и аспирантам, осваивающим линейную алгебру.

**УДК 512**  
**ББК 22.1я73**

**Учебное издание**  
*Щиголев Владимир Викторович*  
**Алгебра и геометрия 2**  
Учебное пособие  
по дисциплине «Алгебра и геометрия»

Компьютерный набор, верстка В.В.Щиголев  
Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman  
Усл. п.л. 1. Изд. № - 2020.  
Заказ № \_\_\_\_\_  
Электронное издание

© ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
2020.

© Щиголев Владимир Викторович, 2020.

# Содержание

1. Комплексные числа.....	4
1.1 Построение поля комплексных чисел.....	4
1.2 Модуль и аргумент.....	6
1.3 Сложение и умножение.....	8
1.4 Сопряжение.....	8
1.5 Основная теорема алгебры.....	10
2. Эрмитовы пространства.....	11
2.1 Пространство $l_2$ .....	16
3. Линейные операторы .....	17
3.1 Собственные значения и векторы операторов.....	17
3.2 Сопряжённые операторы в евклидовых пространствах.....	19
3.3 Сопряжённые операторы в эрмитовых пространствах.....	20
3.4 Диагонализируемость самосопряжённого оператора.....	21
4. Квадратичные формы.....	22
4.1 Определение.....	22
4.2 Представление с помощью симметрической матрицы.....	25
4.3 Ортогональные матрицы.....	27
4.4 Канонический вид квадратичной формы в евклидовом пространстве.....	29
4.5 Пример для $\mathbb{R}^n$ .....	32
5. Список литературы.....	33

# 1 Комплексные числа

## 1.1 Построение поля комплексных чисел

Мы рассмотрим расширение поля действительных чисел, построив поле *комплексных чисел*. По определению комплексное число — это пара действительных чисел  $(a, b)$ . Комплексные числа можно складывать и умножать по следующим правилам:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc). \quad (1)$$

Множество всех таких пар мы обозначим через  $\mathbb{C}$ , имея ввиду, что на нём действуют вышеопределённые бинарные операции.

**Теорема 1.1** *Множество  $\mathbb{C}$  является полем относительно операций сложения и умножения (1).*

*Доказательство.* Докажем сначала, что  $\mathbb{C}$  — коммутативное кольцо с единицей. Для этого существует два способа.

*Способ 1.* Проверим вручную выполнение свойств из определения кольца. Сложение комплексных чисел ассоциативно и коммутативно, так как таково сложение на множестве действительных чисел, а операция сложения в  $\mathbb{C}$  определена независимо по каждой координате. Нулём является пара  $(0, 0)$ , противоположным к паре  $(x, y)$  является пара  $(-x, -y)$ .

Ассоциативность умножения следует из следующих вычислений:

$$\begin{aligned} ((a, b)(c, d))(f, g) &= (ac - bd, ad + bc)(f, g) = \\ &= ((ac - bd)f - (ad + bc)g, (ac - bd)g + (ad + bc)f) = \\ &= (acf - bdf - adg - bcg, acg - bdg + adf + bcf). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a, b)((c, d)(f, g)) &= (a, b)(cf - dg, cg + df) = \\ &= (a(cf - dg) - b(cg + df), a(cg + df) + b(cf - dg)) = \\ &= (acf - adg - bcg - bdf, acg + adf + bcf - bdg). \end{aligned}$$

Как легко видеть, эти выражения совпадают. Проверим дистрибутивность:

$$\begin{aligned} (a, b)((c, d) + (f, g)) &= \\ &= (a, b)(c + f, d + g) = (a(c + f) - b(d + g), a(d + g) + b(c + f)) = \\ &= (ac + af - bd - bg, ad + ag + bc + bf). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a, b)(c, d) + (a, b)(f, g) &= (ac - bd, ad + bc) + (af - bg, ag + bf) = \\ &= (ac - bd + af - bg, ad + bc + ag + bf). \end{aligned}$$

Эти выражения тоже совпадают. Кроме того, в кольце  $\mathbb{C}$  существует еди-

ница — это элемент  $(1,0)$ :

$$(1,0)(a,b) = (1 \cdot a - 0 \cdot b, 1 \cdot b + 0 \cdot a) = (a,b),$$

$$(a,b)(1,0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a,b),$$

и это кольцо коммутативно:

$$(a,b)(c,d) = (ac - bd, ad + bc), \quad (c,d)(a,b) = (ca - db, cb + da).$$

*Способ 2.* отождествим пару  $(a,b)$  со следующей матрицей:

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Используя правила умножения матриц, легко проверить, что такое отождествление сохраняет сумму и произведение:

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & -b-d \\ b+d & a+c \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & -ad - bc \\ bc + ad & -bd + ac \end{pmatrix}.$$

При этом единице  $(1,0)$  в кольце  $\mathbb{C}$  соответствует единичная матрица  $E$ , а противоположному элементу соответствует противоположная матрица. Теперь тот факт, что  $\mathbb{C}$  — кольцо следует из того, что  $M_2(\mathbb{R})$  — кольцо. Фактически мы отождествили  $\mathbb{C}$  с подкольцом кольца  $M_2(\mathbb{R})$ .

Теперь остаётся доказать, что  $\mathbb{C}$  — поле. Это следует из следующего вычисления:

$$(a,b) \left( \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, -\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) = (1,0),$$

верного для любых действительных  $a$  и  $b$  одновременно не равных нулю.

□

Теперь мы можем ввести обозначение  $i = (0,1)$ . Легко проверить, что  $i^2 = (-1,0)$ .

**Лемма 1.2** *Отображение  $\iota: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ , заданное правилом  $\iota(a) = (a,0)$  является инъективным гомоморфизмом колец.*

*Доказательство.* Отображение  $\iota$  инъективно по определению. Остаётся доказать, что  $\iota$  сохраняет операции сложения и умножения. Это следует из следующих вычислений:

$$\iota(a) + \iota(b) = (a,0) + (b,0) = (a+b,0) = \iota(a+b),$$

$$\iota(a)\iota(b) = (a,0)(b,0) = (ab - 0 \cdot 0, a \cdot 0 + 0 \cdot b) = (ab,0) = \iota(ab).$$

□

Теперь мы можем отождествить каждое действительное число  $a$  с его образом  $\iota(a)$ . При этом мы получаем  $i^2 = -1$ . Так как для любого комплексного числа  $(a, b)$  выполнено

$$(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = (a, 0) + (b, 0)i,$$

то мы можем представить любое комплексное число  $z$  (с использованием вышеупомянутого отождествления) в виде

$$z = a + bi$$

для соответствующих действительных  $a$  и  $b$ . Такое представление называется *алгебраической формой записи* комплексного числа. Мы будем использовать обозначения  $a = \operatorname{Re} z$  и  $b = \operatorname{Im} z$ . Эти числа называются соответственно *действительной* и *мнимой* частью комплексного числа  $z$ .


**Замечание.** Мы ввели комплексные числа как пары действительных чисел. Существуют и альтернативные способы. Например, мы могли бы ввести поле комплексных чисел как подкольцо кольца матриц  $M_2(\mathbb{R})$  как в доказательстве теоремы 1.1. Наверное, самым естественным способом введения поля комплексных чисел было бы присоединение к полю действительных чисел  $\mathbb{R}$  элемента  $i$ , удовлетворяющего свойству  $i^2 = -1$ . Эту интуитивную идею можно превратить в строгое определение, если рассмотреть факторкольцо

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$$


и обозначить через  $i$  образ элемента  $x$  при естественном гомоморфизме  $\mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$ . Остаётся ещё обсудить вопрос, почему  $\mathbb{R}$  вкладывается в  $\mathbb{C}$  как подкольцо и почему любой элемент из  $\mathbb{C}$  можно единственным образом представлять в виде  $a + bi$  для  $a, b \in \mathbb{R}$ . Обсуждение этих вопросов увело бы нас слишком далеко от основного содержания этих лекций. Поэтому мы остановились на более наглядном определении поля комплексных чисел в виде множества пар действительных чисел с операциями (1).

## 1.2 Модуль и аргумент

Мы будем изображать комплексные числа на плоскости, считая первую компоненту абсциссой, а вторую ординатой.



Рассмотрим, что произойдёт, если задать ту же точку  $z$  на плоскости в полярной системе координат.



Формулой мы можем записать

$$|z| = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2}.$$

Это число называется *модулем* комплексного числа  $z$ . Рассмотрим теперь случай  $z \neq 0$ . Как известно угол в полярных координатах определён не однозначно, а с точностью до  $2\pi k$ . Используя наши знания о факторкольцах, мы можем определить *аргумент*  $\operatorname{Arg} z$  как элемент из факторгруппы  $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ , каждый представитель  $\varphi \in \operatorname{Arg} z$  которого удовлетворяет соотношениям

$$\cos \varphi = \frac{\operatorname{Re} z}{|z|}, \quad \sin \varphi = \frac{\operatorname{Im} z}{|z|}.$$

Впрочем, мы будем понимать сами функции  $\cos$  и  $\sin$  как функции из  $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$  в  $\mathbb{R}$ , получаемые из обычных тригонометрических функций следующим образом:

$$\cos(\varphi + 2\pi\mathbb{Z}) = \cos \varphi, \quad \sin(\varphi + 2\pi\mathbb{Z}) = \sin \varphi.$$

Тогда мы можем записать

$$\cos \operatorname{Arg} z = \frac{\operatorname{Re} z}{|z|}, \quad \sin \operatorname{Arg} z = \frac{\operatorname{Im} z}{|z|}.$$

Мы получили, что любое комплексное число  $z$  можно записать в виде

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

где  $r = |z|$  и  $\varphi \in \operatorname{Arg} z$ , если  $z \neq 0$ . Эта запись не однозначна по двум причинам: во первых даже если  $z \neq 0$ , то  $\varphi$  определён с точностью до  $2\pi k$ ; если  $z = 0$ , то в качестве  $\varphi$  можно взять любое число. Эта запись называется *тригонометрической формой записи* комплексного числа

### 1.3 Сложение и умножение

Обе формы записи комплексного числа: алгебраическая и тригонометрическая имеют свои преимущества. В первой форме легко складывать числа, а во второй их умножать:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

$$r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \cdot r'(\cos\varphi' + i\sin\varphi') = rr'(\cos(\varphi + \varphi') + i\sin(\varphi + \varphi')).$$

Последняя формула следует из формул косинуса и синуса суммы. Таким образом, мы заключаем, что модуль произведения двух комплексных чисел равен произведению их модулей. При этом, если оба числа ненулевые, то аргумент их произведения равен сумме их аргументов. В качестве следствия из последней формулы получаем формулу *Муавра*

$$(r(\cos\varphi + i\sin\varphi))^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)).$$

Кроме того, полезно (и легко запомнить) формулу *Эйлера*

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi.$$

Из этой формулы легко “получить” формулы косинуса и синуса суммы, если считать, что экспонента суммы равна произведению экспонент (что выглядит вполне естественно и известно из школьного курса математики). Здесь кавычки стоят потому, что как раз формулы косинуса и синуса суммы позволяют установить правило для экспоненты суммы. Однако такое соображение бывает полезно тем, кто забыл тригонометрические формулы, но помнит формулу Эйлера (что, согласитесь, гораздо проще).

Теперь мы можем определить

$$e^{a+ib} = e^a e^{ib} = e^a(\cos b + i\sin b).$$

Таким образом может быть записано любое комплексное число, кроме нуля. Такая форма записи комплексного числа называется *экспоненциальной*.

### 1.4 Сопряжение

Сопряжённым к комплексному числу  $z = a + ib$  называется число  $\bar{z} = a - ib$ . В тригонометрической форме получаем

$$\overline{r(\cos\varphi + i\sin\varphi)} = r(\cos\varphi - i\sin\varphi) = r(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi)).$$

Отсюда следует, что



$$\overline{e^z} = e^{\bar{z}}.$$

Через сопряжённое число удобно выразить действительную и мнимые части, модуль и обратное число:

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}, \quad |z| = \sqrt{z\bar{z}}, \quad z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Кроме того  $\bar{\bar{z}} = z$  и  $|\bar{z}| = |z|$ .

**Теорема 1.3** *Любой автоморфизм поля  $\mathbb{R}$  тождественный.*

*Доказательство.* Пусть  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — автоморфизм поля  $\mathbb{R}$ . Докажем последовательно следующие утверждения:

- (1)  $\varphi(x) > 0$ , если  $x > 0$ .
- (2)  $\varphi$  монотонное.
- (3)  $\varphi(n) = n$  для любого  $n \in \mathbb{Z}$ .
- (4)  $\varphi(q) = q$  для любого  $q \in \mathbb{Q}$ .
- (5)  $\varphi(x) = x$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ .

$$(1) \quad \varphi(x) = \varphi(\sqrt{x}^2) = \varphi(\sqrt{x})^2 > 0.$$

(2) Пусть  $x < y$ . Тогда  $y - x > 0$ . Согласно пункту 1 получаем  $\varphi(y - x) > 0$ . Отсюда  $\varphi(y) - \varphi(x) > 0$  и  $\varphi(y) > \varphi(x)$ .

(3) Пусть  $n$  — натуральное число. Тогда

$$\varphi(n) = \varphi(1 + \dots + 1) = \varphi(1) + \dots + \varphi(1) = n\varphi(1) = n.$$

Отсюда  $\varphi(-n) = -\varphi(n) = -n$ . Остаётся заметить, что  $\varphi(0) = 0$ .

(4) Пусть  $q = a/b$ , где  $a, b \in \mathbb{Z}$  и  $b \neq 0$ . Согласно пункту 3, получаем

$$a = \varphi(a) = \varphi(qb) = \varphi(q)\varphi(b) = \varphi(q)b.$$

Отсюда  $\varphi(q) = a/b = q$ .

(5) Пусть  $s < x < r$  для  $r, s \in \mathbb{Q}$ . Согласно пунктам 2 и 3 получаем

$$s = \varphi(s) < \varphi(x) < \varphi(r) = r.$$

Так как эти неравенства верны для любых рациональных  $r$  и  $s$  удовлетворяющих неравенствам  $s < x < r$ , то  $\varphi(x) = x$ . □

**Теорема 1.4** *Отображение из  $\mathbb{C}$  в себя, заданное формулой  $z \mapsto \bar{z}$ , является единственным нетождественным автоморфизмом поля  $\mathbb{C}$  переводящим  $\mathbb{R}$  в себя.*

*Доказательство.* Докажем сначала, что сопряжение — автоморфизм. Для этого заметим, что

$$\overline{(a+ib) + (c+id)} = \overline{a+c + i(b+d)} = a+c - i(b+d) = a-ib + c-id = \overline{a+ib} + \overline{c+id}.$$

$$\begin{aligned} \overline{(a+ib)(c+id)} &= \overline{ac - bd + i(ad+bc)} = ac - bd - i(ad+bc) = \\ &= ac - (-b)(-d) + i(a(-d) + (-b)c) = (a-ib)(c-id) = \\ &= \overline{(a+ib)(c+id)}. \end{aligned}$$

Пусть теперь  $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  — автоморфизм, переводящий  $\mathbb{R}$  в себя. Применяя теорему 1.1 к ограничению  $\varphi$  на  $\mathbb{R}$ , получаем, что  $\varphi(x) = x$  для любого  $x \in \mathbb{R}$ . Теперь мы можем заметить, что

$$\varphi(i)^2 = \varphi(i^2) = \varphi(-1) = -1.$$

Так как уравнение  $z^2 + 1 = 0$  имеет в  $\mathbb{C}$  только два решения  $z = i$  или  $z = -i$ , то  $\varphi(i) = i$  или  $\varphi(i) = -i$ . В первом случае получаем

$$\varphi(a+ib) = \varphi(a) + \varphi(i)\varphi(b) = a+ib$$

для любых  $a, b \in \mathbb{R}$ , и  $\varphi$  — тождественный автоморфизм. Во втором случае получаем

$$\varphi(a+ib) = \varphi(a) + \varphi(i)\varphi(b) = a-ib$$

для любых  $a, b \in \mathbb{R}$ , и  $\varphi$  — автоморфизм сопряжения. □

## 1.5 Основная теорема алгебры

Поле  $\mathbb{F}$  называется *алгебраически замкнутым*, если любой многочлен  $f \in \mathbb{F}[x]$  степени больше нуля (непостоянный многочлен) имеет хотя бы один корень в  $\mathbb{F}$ .

**Лемма 1.5** Пусть  $\mathbb{F}$  — алгебраически замкнутое поле. Тогда любой многочлен  $f \in \mathbb{F}[x]$  представляется в виде  $c(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$  для некоторых  $c, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ .

*Доказательство.* Если  $f = 0$ , то такое представление существует при  $c = 0$  и любых  $n$  и  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ . Теперь предположим, что  $\deg f > 0$  и докажем утверждение индукцией по этой степени. База индукции, это случай  $\deg f = 1$ . В это случае  $f = a_1x - a_0 = a_1(x - a_0/a_1)$  и утверждение выполнено.

Пусть теперь  $\deg f > 1$ . По определению  $f$  имеет корень, скажем  $\alpha_1$ . По теореме Безу  $f = (x - \alpha_1)g$  для некоторого  $g \in \mathbb{F}[x]$ . Мы знаем, что

$$\deg f = \deg(x - \alpha_1) + \deg g = 1 + \deg g,$$

откуда  $\deg g = \deg f - 1$  и  $1 \leq \deg g < \deg f$ . Поэтому к  $g$  применимо

утверждение леммы:

$$g = c(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n)$$

для некоторых  $c, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ . Выражая отсюда  $f$ , получаем требуемое разложение.  $\square$

**Теорема 1.6 (Основная теорема алгебры)** *Поле  $\mathbb{C}$  алгебраически замкнуто.*

Существует много доказательств этой теоремы от чисто топологических до почти полностью алгебраических. Мы не будем приводить их здесь.

## 2 Эрмитовы пространства

**Определение 2.1** Эрмитовым пространством называется линейное пространство  $E$  над полем комплексных чисел  $\mathbb{C}$ , наделённое отображением  $(\_, \_): E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ , которое удовлетворяет следующим свойствам:

- (Э1)  $(u|v) = \overline{(v|u)}$  для любых  $u, v \in E$ ;
- (Э2)  $(\alpha u + \beta v|w) = \alpha(u|w) + \beta(v|w)$  для любых  $u, v, w \in E$  и  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ;
- (Э3)  $(u|u) \in \mathbb{R}$  и  $(u|u) > 0$  для любого  $u \in E \setminus \{0\}$ .

Заметим, что свойство (Э1) доказывает аналог свойства (Э2) для второго аргумента

$$(Э2') \quad (w|\alpha u + \beta v) = \bar{\alpha} (w|u) + \bar{\beta} (w|v).$$

Действительно,

$$(w|\alpha u + \beta v) = \overline{(\alpha u + \beta v|w)} = \overline{\alpha(u|w) + \beta(v|w)} = \bar{\alpha} \overline{(u|w)} + \bar{\beta} \overline{(v|w)} = \bar{\alpha} (w|u) + \bar{\beta} (w|v).$$

Кроме того, из свойства (Э2) получаем  $(0|v) = (0 + 0|v) = (0|v) + (0|v)$ . Сокращая на  $(0|v)$ , получаем  $(0|v) = 0$ . Отсюда  $(v|0) = 0$ .

Отображение в  $(\_, \_): E \times E \rightarrow \mathbb{C}$  в определении 2.1 называется *скалярным произведением*. Для каждого вектора  $v \in E$  определим его *длину*

$$|v| = \sqrt{(v|v)}.$$

Извлечение корня корректно, так как  $(v|v)$  — неотрицательное действительное число. Возводя это равенство в квадрат, получаем

$$|v|^2 = (v|v).$$

Пусть  $\lambda \in \mathbb{C}$  и  $v \in E$ . Пользуясь свойствами (Э2) и (Э2'), мы получаем

$$|\lambda v| = \sqrt{(\lambda v|\lambda v)} = \sqrt{\lambda \bar{\lambda} (v|v)} = \sqrt{|\lambda|^2} \sqrt{(v|v)} = |\lambda| |v|.$$

В последней формуле  $|\lambda|$  обозначает модуль комплексного числа, а  $|v|$  обозначает длину вектора.

Основным примером конечномерных эрмитовых пространств является пространство  $\mathbb{C}^n$  со следующим скалярным произведением:

$$((x_1, \dots, x_n)|(y_1, \dots, y_n)) = x_1 \bar{y}_1 + \dots + x_n \bar{y}_n.$$

Легко проверить, что свойства (Э1)–(Э3) выполняются. Проверим, например, свойства (Э1) и (Э3):

$$\begin{aligned} \overline{((y_1, \dots, y_n)|(x_1, \dots, x_n))} &= \overline{y_1 \bar{x}_1 + \dots + y_n \bar{x}_n} = \bar{y}_1 \bar{\bar{x}_1} + \dots + \bar{y}_n \bar{\bar{x}_n} = \\ &= \bar{y}_1 x_1 + \dots + \bar{y}_n x_n = x_1 \bar{y}_1 + \dots + x_n \bar{y}_n = ((x_1, \dots, x_n)|(y_1, \dots, y_n)). \end{aligned}$$

$$((x_1, \dots, x_n)|(x_1, \dots, x_n)) = x_1 \bar{x}_1 + \dots + x_n \bar{x}_n = |x_1|^2 + \dots + |x_n|^2 \in \mathbb{R}.$$

Последнее число строго положительно, если  $(x_1, \dots, x_n) \neq 0$ .

**Лемма 2.2** Пусть  $a, b, c$  — действительные числа такие, что  $a \geq 0$  и  $at^2 + bt + c \geq 0$  для любого  $t \in \mathbb{R}$ . Тогда  $b^2 - 4ac \leq 0$ .

*Доказательство.* Рассмотрим случай  $a = 0$ . Тогда мы получаем  $bt + c \geq 0$ . Отсюда  $b = 0$  и  $b^2 - 4ac = 0 \leq 0$ . Пусть теперь  $a > 0$ . Вычисляя дискриминант  $D$ , получаем  $D = b^2 - 4ac$ . Если бы  $D > 0$ , то парабола  $y = at^2 + bt + c$  с ветвями вверх имела бы два различных корня. Между этими корнями она бы проходила ниже нуля, что невозможно по условию. Приходим к противоречию.  $\square$

**Теорема 2.3 (Неравенство Коши-Буняковского)**  $|(u|v)| \leq |u||v|$  для любых  $u, v \in E$ . При этом равенство достигается только при пропорциональных  $u$  и  $v$ .

*Доказательство.* В случае, когда  $u = 0$ , векторы  $u$  и  $v$  пропорциональны и обе части неравенства обращаются в ноль. Поэтому достаточно доказывать теорему в случае  $u \neq 0$ .

Рассмотрим функцию  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , заданную формулой

$$f(t) = (tu + (u|v)v|tu + (u|v)v).$$

По свойству 2.1 эта функция неотрицательная. Раскрывая скобки по свойствам 2.1 и 1 и пользуясь свойством 2.1, получаем

$$\begin{aligned}
f(t) &= t^2(u|u) + ((u|v)v|tu) + (tu|(u|v)v) + ((u|v)v|(u|v)v) = \\
&= |u|^2 t^2 + t(u|v)(v|u) + t(u|v)(u|v) + (u|v)(\overline{u|v})(v|v) = \\
&= |u|^2 t^2 + t(u|v)(\overline{u|v}) + t(u|v)(u|v) + (u|v)(\overline{u|v})|v|^2 = \\
&= |u|^2 t^2 + 2t|(u|v)|^2 + |(u|v)|^2 |v|^2 \geq 0.
\end{aligned}$$

Применяя лемму 2.2, получаем

$$4|(u|v)|^4 - 4|(u|v)|^2 |u|^2 |v|^2 \leq 0.$$

Если  $(u|v) = 0$ , то доказываемое неравенство автоматически выполнено. В противном случае, сокращая на положительное число  $4|(u|v)|^2$ , получаем  $|(u|v)|^2 \leq |v|^2 |u|^2$ . Извлекая квадратный корень, получаем требуемое неравенство.

Если выполнено равенство  $|(u|v)| = |u||v|$ , то мы получаем, либо  $u = 0$ , либо  $|u| > 0$  и  $D = 0$ . В первом случае  $u$  уже пропорционально  $v$  (как и любому другому вектору). Во втором случае квадратное уравнение  $f(t) = 0$  имеет решение  $t = t_0 \in \mathbb{R}$ . По свойству 2.1 это означает, что  $t_0 u + (u|v)v = 0$ . Пропорциональность векторов  $u$  и  $v$  можно считать установленной, если  $(u|v) \neq 0$ . В противном случае получаем  $0 = |u||v|$ . Отсюда  $|v| = 0$  и  $v = 0$ . Этот вектор пропорционален вектору  $u$ .

Пусть наоборот  $v = \lambda u$  для некоторого  $\lambda \in \mathbb{C}$ . В этом случае получаем

$$|(u|v)| = |(u|\lambda u)| = |\bar{\lambda}(u|u)| = |\bar{\lambda}|(u|u) = |\lambda||u|^2 = |u|(|\lambda||u|) = |u||\lambda u| = |u||v|.$$

В этой записи важно внимательно следить, где  $| \cdot |$  обозначают модуль действительного числа, а где длину вектора.  $\square$

Для любого подпространства  $U$  эрмитова пространства  $E$  положим

$$U^\perp = \{e \in E | (e|u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

Заметим, что  $U \cap U^\perp = 0$ . Это следует из части (Э3) определения эрмитового пространства. Кроме того, выполнено

$$0^\perp = E, \quad E^\perp = 0. \quad (2)$$

Первое равенство следует из свойства (Э2), а второе может быть доказано, например, так:

$$0 = E \cap E^\perp = E^\perp.$$

**Определение 2.4** Пусть  $E$  — эрмитово пространство и  $(e_1, \dots, e_n)$  — его базис. Этот базис называется ортогональным, если  $(e_i|e_j) = 0$  для различных  $i$  и  $j$ . Если дополнительно  $|e_i| = 1$  для любого  $i$ , то этот базис называется ортонормированным.

В ортонормированном базисе  $(e_1, \dots, e_n)$  легко записать координаты вектора. Действительно, пусть

$$v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Умножая на  $e_i$  обе части, получаем

$$(v|e_i) = \alpha_1(e_1|e_i) + \dots + \alpha_{i-1}(e_{i-1}|e_i) + \alpha_i(e_i|e_i) + \alpha_{i+1}(e_{i+1}|e_i) + \dots + \alpha_n(e_n|e_i) = \alpha_i(e_i|e_i).$$

Отсюда  $\alpha_i = (v|e_i)/(e_i|e_i)$ . Используя символ Кронекера

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

мы можем записать условие ортонормированности базиса  $e_1, \dots, e_n$  следующим образом

$$(e_i|e_j) = \delta_{i,j}.$$

Если у нас имеется ортогональный базис  $(f_1, \dots, f_n)$  пространства, то из него легко получить ортонормированный базис  $(e_1, \dots, e_n)$ , положив  $e_i = f_i/(f_i|f_i)$ .

**Теорема 2.5** (1) В произвольном конечномерном эрмитовом пространстве существует хотя бы один ортогональный базис. Более того, любой ненулевой вектор из  $E$  является элементом одного из таких базисов.

(2) Для любого подпространства  $U$  конечномерного эрмитова пространства  $E$  выполнено  $E = U \oplus U^\perp$ .

*Доказательство.* Мы докажем эту теорему при помощи процесса ортогонализации. Пусть  $(v_1, \dots, v_n)$  — произвольный базис пространства  $E$ . Мы построим базис  $(e_1, \dots, e_n)$  по индукции следующим образом:

$$e_1 = v_1, \quad e_i = v_i - \alpha_{i,1}e_1 - \dots - \alpha_{i,i-1}e_{i-1},$$

где

$$\alpha_{i,j} = \frac{(v_i|e_j)}{(e_j|e_j)}$$

В этом определении есть одна проблема: мы делим на возможно нулевое число  $(e_j|e_j)$ . Мы разрешим эту проблему следующим образом: индукцией по  $i = 1, \dots, n$  мы докажем, что

$$\langle v_1, \dots, v_i \rangle = \langle e_1, \dots, e_i \rangle. \quad (3)$$

Действительно,  $e_1 = v_1$ , что доказывает утверждение для  $i = 1$ . Пусть те-

перь  $1 < i \leq n$  и утверждение выполнено для  $i - 1$  вектора, то есть

$$\langle v_1, \dots, v_{i-1} \rangle = \langle e_1, \dots, e_{i-1} \rangle.$$

Докажем равенство (3). Во первых заметим, что если бы  $e_j = 0$  для некоторого  $j = 1, \dots, i - 1$ , то мы получили бы, что векторы линейно независимого набора  $(v_1, \dots, v_{i-1})$  принадлежат линейной оболочке  $i - 2$  векторов  $e_1, \dots, e_{j-1}, e_{j+1}, \dots, e_{i-1}$ . По лемме 4.8 из [3] получаем противоречие  $i - 2 \geq i - 1$ . Из доказанного факта  $e_1, \dots, e_{i-1} \neq 0$  следует, что  $e_i$  — корректно определённый вектор. Отсюда

$$v_i = e_i + \alpha_{i,1}e_1 + \dots + \alpha_{i,i-1}e_{i-1} \in \langle e_1, \dots, e_i \rangle.$$

Так как  $v_1, \dots, v_{i-1} \in \langle e_1, \dots, e_{i-1} \rangle \subset \langle e_1, \dots, e_i \rangle$ , то по лемме 4.13 из [3] получаем  $\langle v_1, \dots, v_i \rangle \subset \langle e_1, \dots, e_i \rangle$ .

Наоборот, по предположению индукции  $e_1, \dots, e_{i-1} \in \langle v_1, \dots, v_{i-1} \rangle \subset \langle v_1, \dots, v_i \rangle$  и  $v_i \in \langle v_1, \dots, v_i \rangle$ . Следовательно,

$$e_i = v_i - \alpha_{i,1}e_1 - \dots - \alpha_{i,i-1}e_{i-1} \in \langle v_1, \dots, v_i \rangle.$$

Поэтому по лемме 4.13 из [3] получаем  $\langle e_1, \dots, e_i \rangle \subset \langle v_1, \dots, v_i \rangle$ . Таким образом, равенство (3) доказано и наш алгоритм может продолжаться, пока не будут построены все  $n$  векторов  $e_1, \dots, e_n$ . Из этого равенства для  $i = n$  следует, что  $\langle e_1, \dots, e_n \rangle = V$ . Если бы набор  $(e_1, \dots, e_n)$  был линейно зависимым, то  $V = \langle e_1, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, e_n \rangle$  для некоторого  $i$ . Так как  $(v_1, \dots, v_n)$  линейно независим, то по лемме 4.8 из [3], получаем противоречие  $n - 1 \geq n$ .

Остаётся доказать, что  $(e_i|e_j) = 0$  для различных  $i \neq j$ . Без ограничения общности можно считать, что  $i > j$ . Мы докажем это утверждение индукцией по  $i$ . Для  $i = 1$  это утверждение очевидно, так как не существует  $j$  меньшего  $i$ . В противном случае по индуктивному предположению получаем

$$\begin{aligned} (e_i|e_j) &= (v_i|e_j) - \alpha_{i,1}(e_1|e_j) - \dots - \alpha_{i,j-1}(e_{j-1}|e_j) - \alpha_{i,j}(e_j|e_j) - \\ &\quad - \alpha_{i,j+1}(e_{j+1}|e_j) - \dots - \alpha_{i,i-1}(e_{i-1}|e_j) = (v_i|e_j) - \alpha_{i,j}(e_j|e_j) \\ &= (v_i|e_j) - \frac{(v_i|e_j)}{(e_j|e_j)}(e_j|e_j) = 0. \end{aligned}$$

Наконец, заметим, что если  $v$  — ненулевой вектор из  $E$ , то набор, состоящий из одного вектора  $v$  линейно независим. Отсюда по следствию 4.11 из [3] получаем, что существует базис  $(v_1, \dots, v_n)$  пространства  $E$  такой, что  $v_1 = v$ . В процессе ортогонализации мы получим ортогональный базис  $(e_1, \dots, e_n)$  для которого  $e_1 = v_1 = v$ .

Часть (1) автоматически следует из этой конструкции. Докажем теперь

часть (2). По следствию 4.11 из [3] существует такой базис  $(v_1, \dots, v_n)$  пространства  $E$ , что набор  $(v_1, \dots, v_m)$  образует базис пространства  $U$ , где  $m = \dim U$ . Применим процесс ортогонализации к набору  $(v_1, \dots, v_n)$  и получим ортогональный базис  $(e_1, \dots, e_n)$ . По уравнению (3) получаем  $\langle e_1, \dots, e_m \rangle = \langle v_1, \dots, v_m \rangle = U$ . Мы утверждаем, что  $U^\perp = \langle e_{m+1}, \dots, e_n \rangle$ . Действительно, в силу ортогональности базиса  $(e_1, \dots, e_n)$  получаем  $e_{m+1}, \dots, e_n \in U^\perp$ . Следовательно,  $\langle e_{m+1}, \dots, e_n \rangle \subset U^\perp$ . Наоборот, пусть  $v \in U^\perp$ . Разложим этот вектор по базису  $v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$ . Предположим, что  $\alpha_i \neq 0$  для какого-нибудь  $i = 1, \dots, m$ . Умножая на  $e_i$ , получаем

$$\begin{aligned} (v|e_i) &= \alpha_1(e_1|e_i) + \dots + \alpha_{i-1}(e_{i-1}|e_i) \\ &\quad + \alpha_i(e_i|e_i) + \alpha_{i+1}(e_{i+1}|e_i) + \dots + \alpha_n(e_n|e_i) = \\ &= 0 + \dots + 0 + \alpha_i(e_i|e_i) + 0 + \dots + 0 = \alpha_i(e_i|e_i) \neq 0, \end{aligned}$$

что противоречит тому, что  $v \in U^\perp$ . Таким образом  $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$  и  $v = \alpha_{m+1}e_{m+1} + \dots + \alpha_n e_n \in \langle e_{m+1}, \dots, e_n \rangle$ . Отсюда получаем

$$E = \langle e_{m+1}, \dots, e_n \rangle \oplus \langle e_{m+1}, \dots, e_n \rangle = U \oplus U^\perp.$$

□

## 2.1 Пространство $l_2$

По определению эрмитово пространство  $l_2$  — это множество всех счётных последовательностей комплексных чисел  $(z_1, \dots, z_n, \dots)$ , для которых ряд

$$\sum_{i=1}^{+\infty} |z_i|^2$$

сходится со скалярным произведением

$$(z_1, \dots, z_n, \dots)(w_1, \dots, w_n, \dots) = \sum_{i=1}^{+\infty} z_i \bar{w}_i.$$

Мы утверждаем, что последний ряд сходится абсолютно. Для этого рассмотрим (действительный) ряд модулей

$$\sum_{i=1}^{+\infty} |z_i \bar{w}_i| = \sum_{i=1}^{+\infty} |z_i| |\bar{w}_i| = \sum_{i=1}^{+\infty} |z_i| |w_i|. \quad (4)$$

Теперь заметим, что

$$|z_i| |w_i| \leq \frac{|z_i|^2 + |w_i|^2}{2}.$$

Так как ряд



$$\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{|z_i|^2 + |w_i|^2}{2}$$

сходится как полусумма сходящихся рядов, то ряд модулей (4) тоже сходится.

Мы собираемся использовать пространство  $l_2$  для того, чтобы показать необходимость условия конечномерности для равенств

$$E = U \oplus U^\perp, \quad (U^\perp)^\perp = U, \quad U + V = (U^\perp \cap V^\perp)^\perp. \quad (5)$$

Чтобы построить подпространство  $U$ , для которого нарушены эти равенства, мы определим его как множество последовательностей  $(z_1, \dots, z_n, \dots) \in E$ , для которых множество  $\{i \in \mathbb{N} \mid z_i \neq 0\}$  конечно. Мы утверждаем, что  $U^\perp = 0$ . Действительно, предположим, что  $w = (w_1, \dots, w_n, \dots) \in U^\perp$ . Возьмём последовательность  $z = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ , в которой 1 стоит на  $i$ -м месте. Эта последовательность, очевидно, принадлежит подпространству  $U$ . Беря скалярное произведение, получаем  $0 = (w|z) = w_i$ . Так как это равенство верно для любого  $i$ , то  $w = 0$ . Таким образом,  $U \oplus U^\perp = U$ . Последнее подпространство не равно всему  $E$ , так как  $E$  содержит, например, последовательность

$$1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \dots, \frac{1}{n^2}, \dots$$

Чтобы опровергнуть второе из равенств (5) заметим, что

$$(U^\perp)^\perp = 0^\perp = E \neq U.$$

Наконец, чтобы опровергнуть третье равенство, возьмём то же самое  $U$  и  $V = 0$ . Получаем

$$U + V = U \neq E = 0^\perp = (0 \cap E)^\perp = (U^\perp \cap V^\perp)^\perp.$$

### 3 Линейные операторы

*Линейным оператором* называется линейное отображение  $\varphi$  из векторного пространства в само себя. Таким образом, мы имеем возможность рассматривать один и тот же базис  $v$  на области определения и на области значений оператора. Матрицу оператора относительно этого базиса мы обозначим через  $M_v(\varphi)$ .

#### 3.1 Собственные значения и векторы операторов

Пусть  $\varphi: V \rightarrow V$  — линейный оператор на векторном пространстве  $V$  над полем  $\mathbb{F}$ . Вектор  $\lambda \in V$  называется *собственным*, если он ненулевой и

$$\varphi(\lambda) = t\lambda \quad (6)$$

для некоторого  $t \in \mathbb{F}$ . В этом случае элемент поля  $t$  называется *собственным значением* оператора  $\varphi$ , соответствующим собственному вектору  $\lambda$ . Далее мы будем рассматривать только тот случай, когда пространство  $V$  конечномерно.

Пусть  $v = (v_1, \dots, v_n)$  — какой-нибудь базис пространства  $V$ . Запишем наш собственный вектор в виде

$$\lambda = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n,$$

а результат действия оператора  $\varphi$  на него в виде

$$\varphi(\lambda) = b_1 v_1 + \dots + b_n v_n$$

для соответствующих  $a_i, b_i \in \mathbb{F}$ . В координатах векторов получаем

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = M_v(\varphi) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Таким образом, раскладывая обе части равенства (6), по базису  $v$  мы получаем

$$M_v(\varphi) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = tE \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Переносим всё в левую сторону, мы получаем

$$(M_v(\varphi) - tE) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = 0. \quad (7)$$

Таким образом матрица  $M_v(\varphi) - tE$  вырожденная и мы получаем  $\det(M_v(\varphi) - tE) = 0$ . С другой стороны, если это уравнение выполняется некоторого  $t \in \mathbb{F}$ , то матрица  $M_v(\varphi) - tE$  вырожденная и существует некоторый ненулевой набор  $(a_1, \dots, a_n)$  элементов поля  $\mathbb{F}$  для которого выполнено уравнение (7). Полагая  $\lambda = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$ , мы получаем  $\varphi(\lambda) = t\lambda$ .

Заметим, что многочлен  $\det(M_v(\varphi) - tE)$  не зависит от выбора базиса  $v$ . Действительно, пусть  $v'$  — ещё один базис пространства  $V$ . По формуле замены матрицы оператора при изменении базисов получаем

$$\begin{aligned} \det(M_{v'}(\varphi) - tE) &= \det(T_{v,v'}^{-1} M_v(\varphi) T_{v,v'} - tE) = \det(T_{v,v'}^{-1} (M_v(\varphi) - tE) T_{v,v'}) = \\ &= \det(T_{v,v'})^{-1} \det(M_v(\varphi) - tE) \det(T_{v,v'}) = \det(M_v(\varphi) - tE). \end{aligned}$$

Получившийся многочлен называется *характеристическим многочленом* оператора  $\varphi$  и обозначается  $\chi(\varphi)$  или  $\chi(\varphi, t)$ , если мы хотим указать переменную.

Наряду с собственными векторами значениями операторов мы можем рассматривать собственные значения квадратных матриц. Пусть  $A$  — квадратная матрица размера  $n \times n$  над полем  $\mathbb{F}$ . Рассмотрим оператор на арифметическом пространстве  $\mathbb{F}^n$ , заданный формулой  $\varphi(\lambda) = A\lambda$ . Его собственные векторы, собственные значения и характеристический многочлен назовём собственными векторами, собственными значениями и характеристическим значением матрицы  $A$ . Выбирая стандартный базис в  $\mathbb{F}^n$ , получаем, что характеристический многочлен матрицы  $A$  равен  $\det(A - tE)$ .

### 3.2 Сопряжённые операторы в евклидовых пространствах

**Определение 3.1** Пусть  $E$  — евклидово пространство со скалярным произведением  $(\cdot, \cdot)$  и  $\varphi$  и  $\psi$  — операторы на  $E$ . Мы будем говорить, что эти операторы сопряжённые, если  $(\varphi(v), u) = (v, \psi(u))$  для любых  $u, v \in E$ .

Сопряжённые операторы легко характеризовать на языке их матриц.

**Лемма 3.2** Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — ортонормированный базис евклидова пространства  $E$ . Операторы  $\varphi$  и  $\psi$  на пространстве  $E$  сопряжены тогда и только тогда, когда  $M_e(\psi) = M_e(\varphi)^T$ .

*Доказательство.* Запишем

$$M_e(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi_{1,1} & \cdots & \varphi_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{m,1} & \cdots & \varphi_{m,n} \end{pmatrix}, \quad M_e(\psi) = \begin{pmatrix} \psi_{1,1} & \cdots & \psi_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{m,1} & \cdots & \psi_{m,n} \end{pmatrix}$$

Тогда

$$\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^m \varphi_{i,j} e_i, \quad \psi(e_k) = \sum_{l=1}^m \psi_{l,k} e_l.$$

Предположим сначала, что операторы  $\varphi$  и  $\psi$  сопряжены. Получаем

$$(\varphi(e_j), e_k) = \sum_{i=1}^m \varphi_{i,j} (e_i, e_k) = \varphi_{k,j}.$$

С другой стороны,

$$(e_j, \psi(e_k)) = \sum_{l=1}^m \psi_{l,k} (e_j, e_l) = \psi_{j,k}$$

Так как  $(\varphi(e_j), e_k) = (e_j, \psi(e_k))$ , то  $\varphi_{k,j} = \psi_{j,k}$ . Это означает, что  $M_e(\psi) =$

$$M_e(\varphi)^T$$

Предположим теперь, что  $M_e(\psi) = M_e(\varphi)^T$ . Рассуждения выше, прочитанные в обратном порядке, означают, что

$$(\varphi(e_j), e_k) = (e_j, \psi(e_k)). \quad (8)$$

Возьмём теперь два произвольных вектора  $v, u \in E$  и разложим их по базису

$$v = \sum_{j=1}^n a_j e_j, \quad u = \sum_{k=1}^n b_k e_k.$$

Отсюда, используя формулу (8) получаем

$$\begin{aligned} (\varphi(v), u) &= \left( \sum_{j=1}^n a_j \varphi(e_j), \sum_{k=1}^n b_k e_k \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_j b_k (\varphi(e_j), e_k) = \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_j b_k (e_j, \psi(e_k)) = \left( \sum_{j=1}^n a_j e_j, \sum_{k=1}^n b_k \psi(e_k) \right) = (v, \psi(u)). \end{aligned}$$

□

Оператор сопряжённый сам себе (это означает, что  $\varphi$  и  $\varphi$  — сопряжённые операторы) называется *самосопряжённым*. Согласно предыдущей лемме, самосопряжённые операторы и только они имеют симметрическую матрицу в любом ортонормированном базисе. Более того для того, чтобы оператор был самосопряжённым достаточно, чтобы он имел симметрическую матрицу в одном из ортонормированных базисов.

### 3.3 Сопряжённые операторы в эрмитовых пространствах

Пусть  $E$  — эрмитово пространство со скалярным произведением  $(\cdot | \cdot)$  и  $\varphi$  и  $\psi$  — операторы на  $E$ . Мы будем говорить, что эти операторы *сопряжённые*, если  $(\varphi(v) | u) = (v | \psi(u))$  для любых  $u, v \in E$ .

Мы не приводим доказательство следующей леммы, так как оно почти полностью совпадает с доказательством леммы 3.2. Надо лишь использовать свойства (Э2) и (Э2') для выноса коэффициентов с первого и второго места произведения  $(\cdot | \cdot)$  соответственно.

**Лемма 3.3** Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  — ортонормированный базис эрмитова пространства  $E$ . Операторы  $\varphi$  и  $\psi$  на пространстве  $E$  сопряжены тогда и только тогда, когда  $M_e(\psi) = \overline{M_e(\varphi)}^T$ .

Оператор на эрмитовом пространстве сопряжённый сам себе (это означает, что  $\varphi$  и  $\varphi$  — сопряжённые операторы) называется *самосопряжённым*.

### 3.4 Диагонализируемость самосопряжённого оператора

Сначала мы докажем следующее вспомогательное утверждение.

**Лемма 3.4** Пусть  $E$  — конечномерное ненулевое евклидово пространство и  $\varphi$  — самосопряжённый оператор на  $E$ . Тогда  $\varphi$  имеет хотя бы один собственный вектор.

*Доказательство.* Пусть  $v = (v_1, \dots, v_n)$  — ортонормированный базис евклидова пространства  $E$ . По лемме 3.2 матрица  $M_e(\varphi)$  симметрическая. Рассмотрим эрмитово пространство  $\mathbb{C}^n$  со стандартным скалярным произведением  $(\cdot | \cdot)$  и оператор  $\psi$  на нём, заданный формулой  $\psi(v) = M_e(\varphi)v$ , где  $v \in \mathbb{C}^n$  воспринимается как столбец высоты  $n$ . Матрица  $M_e(\varphi)$  является матрицей оператора  $\psi$  в стандартном базисе пространства  $\mathbb{C}^n$ :

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1).$$

Матрица  $M_e(\varphi)$  вещественная, поэтому

$$\overline{M_e(\varphi)}^T = M_e(\varphi)^T = M_e(\varphi).$$

По лемме 3.3 оператор  $\psi$  самосопряжённый. Как любой оператор на конечномерном ненулевом комплексном пространстве  $\psi$  имеет собственный вектор, скажем,  $v$ . Следовательно,  $\psi(v) = \lambda v$  для соответствующего  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Отсюда по свойствам (Э2) и (Э2') получаем

$$\lambda(v|v) = (\lambda v|v) = (\psi(v)|v) = (v|\psi(v)) = (v|\lambda v) = \bar{\lambda}(v|v).$$

Сокращая на ненулевое число  $(v|v)$ , получаем  $\lambda = \bar{\lambda}$ . Следовательно,  $\lambda$  — вещественное число.

Согласно нашим рассуждениям в § 3.1 мы получаем  $\det(M_e(\varphi) - \lambda E) = 0$ , откуда следует, что  $\lambda$  — собственное значение оператора  $\varphi$ , а, следовательно, существует и собственный вектор оператора  $\varphi$  (соответствующий этому собственному значению).  $\square$

**Теорема 3.5** Пусть  $E$  — конечномерное евклидово пространство и  $\varphi$  — самосопряжённый оператор на  $E$ . Тогда оператор  $\varphi$  диагонализируем в некотором ортонормированном базисе.

*Доказательство.* Применим индукцию по размерности  $E$ . В случае  $\dim E = 0$  утверждение очевидно. Пусть теперь  $\dim E > 0$ . Тогда по лемме 3.4 существует собственный вектор  $v$  оператора  $\varphi$ . Запишем  $\varphi(v) = \lambda v$  для

соответствующего  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Положим  $U = \langle v \rangle^\perp$ . Мы утверждаем, что  $U$  инвариантно относительно  $\varphi$ . Действительно, пусть  $u \in U$ . Тогда

$$(\varphi(u), v) = (u, \varphi(v)) = (u, \lambda v) = \lambda(u, v) = 0.$$

Следовательно, мы можем рассмотреть ограничение  $\varphi|_U$ . Мы получаем  $E = \langle v \rangle \oplus U$ . Этот факт может быть доказан также как часть (2) теоремы 2.5, если рассуждать о евклидовых вместо эрмитовых пространствах. По лемме 4.16 из [3] мы получаем

$$\dim E = \dim \langle v \rangle + \dim U = 1 + \dim U.$$

Отсюда  $\dim U = \dim E - 1 < \dim E$ . Следовательно, к ограничению  $\varphi|_U$  применимо предположение индукции и этот оператор диагоналируем, скажем, в ортонормированном базисе  $(e_1, \dots, e_n)$ . Тогда, как легко видеть, оператор  $\varphi$  диагоналируем в ортонормированном базисе  $(e_1, \dots, e_n, v)$ .  $\square$

## 4 Квадратичные формы

### 4.1 Определение

Сначала мы дадим определение квадратичной формы над произвольным полем, а затем сосредоточимся на случае, когда это поле имеет характеристику не равную двум.

**Определение 4.1** Пусть  $\mathbb{F}$  — поле и  $V$  — векторное пространство над  $\mathbb{F}$ . Квадратичной формой на  $V$  называется отображение  $q: V \rightarrow \mathbb{F}$  такое, что  $q(cv) = c^2 q(v)$  для любых  $c \in \mathbb{F}$  и  $v \in V$  и отображение  $(\cdot, \cdot): V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ , заданное формулой  $(u, v) = q(u + v) - q(u) - q(v)$ , билинейное.

Заметим, что  $(u, v) = (v, u)$  вне зависимости от того, билинейная ли эта форма. Форму  $(\cdot, \cdot)$  назовём ассоциированной с  $q$ .

Мы можем описать квадратичные формы на конечномерных векторных пространствах более явно.

**Лемма 4.2** Пусть  $(v_1, \dots, v_n)$  — базис векторного пространства  $V$ . Квадратичные формы и только они определяются формулой

$$q(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} x_i x_j \quad \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{F} \quad (9)$$

для некоторых  $a_{i,j} \in \mathbb{F}$ .

*Доказательство.* Проверим сначала, что отображение  $q$ , заданное таким образом, является квадратичной формой. Для произвольного  $c \in \mathbb{F}$ , получаем

$$\begin{aligned} q(c(x_1v_1 + \dots + x_nv_n)) &= q((cx_1)v_1 + \dots + (cx_n)v_n) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}(cx_i)(cx_j) \\ &= c^2 \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}x_ix_j = c^2 q(x_1v_1 + \dots + x_nv_n). \end{aligned}$$

Теперь вычислим отображение  $(v, u) = q(v + u) - q(v) - q(u)$ . Для  $v = x_1v_1 + \dots + x_nv_n$  и  $u = y_1v_1 + \dots + y_nv_n$  Получаем

$$\begin{aligned} (v, u) &= q(u + v) - q(u) - q(v) = q((x_1 + y_1)v_1 + \dots + (x_n + y_n)v_n) - \\ &- q(x_1v_1 + \dots + x_nv_n) - q(y_1v_1 + \dots + y_nv_n) = \\ &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}(x_i + y_i)(x_j + y_j) - \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}x_ix_j - \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}y_iy_j \quad (10) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}(x_ix_j + y_ix_j + x_iy_j + y_iy_j) - \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}x_ix_j - \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}y_iy_j \\ &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}(y_ix_j + x_iy_j). \end{aligned}$$

Возьмём произвольный элемент  $c \in \mathbb{F}$ . Тогда получаем  $cv = cx_1v_1 + \dots + cx_nv_n$  и

$$(cv, u) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}(y_i cx_j + cx_i y_j) = c \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}(y_ix_j + x_iy_j) = c(v, u).$$

Теперь возьмём ещё один вектор  $v' = cx'_1v_1 + \dots + cx'_nv_n$ . Тогда  $v + v' = (x_1 + x'_1)v_1 + \dots + (x_n + x'_n)v_n$ . Отсюда получаем

$$\begin{aligned} (v + v', u) &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}(y_i(x_j + x'_j) + (x_i + x'_i)y_j) = \\ &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}(y_ix_j + x_iy_j) + \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j}(y_ix'_j + x'_iy_j) = (v, u) + (v', u). \end{aligned}$$

Линейность по второму аргументу отображения  $(\cdot, \cdot)$  следует из симметричности этого отображения.

Теперь пусть  $q: V \rightarrow \mathbb{F}$  — квадратичная форма и  $(\cdot, \cdot)$  — билинейная форма ассоциированная с  $q$ . Положим  $a_{i,i} = q(v_i)$  и  $a_{i,j} = (v_i, v_j)$  для  $i < j$ . Мы

докажем индукцией по  $k = 1, \dots, n$ , что

$$q(x_1 v_1 + \dots + x_k v_k) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq k} a_{i,j} x_i x_j.$$

Базой индукции является случай  $k = 1$ . Получаем

$$q(x_1 v_1) = x_1^2 q(v_1) = x_1^2 a_{1,1} = a_{1,1} x_1^2 = \sum_{1 \leq i \leq j \leq 1} a_{i,j} x_i x_j.$$

Теперь предположим, что  $1 \leq k < n$  и что доказываемая формула верна для  $k$ . Используя билинейность формы  $(\cdot, \cdot)$  и предположение индукции, мы получаем

$$\begin{aligned} q(x_1 v_1 + \dots + x_k v_k + x_{k+1} v_{k+1}) &= \\ &= (x_1 v_1 + \dots + x_k v_k, x_{k+1} v_{k+1}) + q(x_1 v_1 + \dots + x_k v_k) + q(x_{k+1} v_{k+1}) = \\ &= \sum_{1 \leq i \leq k} x_i x_{k+1} (v_i, v_{k+1}) + \sum_{1 \leq i \leq j \leq k} a_{i,j} x_i x_j + x_{k+1}^2 q(v_{k+1}) = \\ &= \sum_{1 \leq i \leq k} a_{i,k+1} x_i x_{k+1} + \sum_{1 \leq i \leq j \leq k} a_{i,j} x_i x_j + a_{k+1,k+1} x_{k+1}^2 = \sum_{1 \leq i \leq j \leq k+1} a_{i,j} x_i x_j. \end{aligned}$$

Требуемый результат получается при  $k = n$ . □

Заметим, что представление квадратичной формы  $q$  в виде (9) единственно. Действительно, сначала мы получаем

$$q(v_i) = q(0v_1 + \dots + 0v_{i-1} + 1v_i + 0v_{i+1} + \dots + 0v_n) = a_{i,i}.$$

Теперь применим формулу (10) в случае, когда  $i < j$ ,  $x_1 = \dots = x_{i-1} = x_{i+1} = \dots = x_n = 0$ ,  $x_i = 1$  и  $y_1 = \dots = y_{j-1} = y_{j+1} = \dots = y_n = 0$ ,  $y_j = 1$ . Получаем

$$(v_i, v_j) = a_{i,j} (y_i x_j + x_i y_j) = a_{i,j}.$$

Отождествляя матрицы размера  $1 \times 1$  с элементами поля, мы получаем

$$q(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n) = X^T A X, \tag{11}$$

где



$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

**Замечание.** Для произвольной квадратной матрицы  $B$  с элементами из поля  $\mathbb{F}$  отображение  $q: V \rightarrow \mathbb{F}$ , заданное формулой

$$q(x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n) = X^T B X,$$

является квадратичной формой. В этом можно убедиться непосредственными вычислениями аналогичными вычислениям доказательства леммы 4.2. С другой стороны, можно заметить, что

$$X^T B X = X^T A X,$$

где

$$A = \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} + b_{2,1} & b_{1,3} + b_{3,1} & \cdots & b_{1,n} + b_{n,1} \\ 0 & b_{2,2} & b_{2,3} + b_{3,2} & \cdots & b_{2,n} + b_{n,2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n,n} \end{pmatrix}$$

Отсюда и из леммы 4.2 следует, что  $q$  является квадратичной формой.

## 4.2 Представление с помощью симметрической матрицы

Предположим теперь, что  $\mathbb{F}$  — поле характеристики не равной двум. В представлении (11) мы использовали верхнетреугольную матрицу  $A$ . Однако часто нам удобнее использовать симметрическую матрицу. В данном случае мы можем добиться такого представления следующим приёмом. Транспонируя равенство (11) и используя тот факт, что матрица размера  $1 \times 1$  всегда симметрическая, получаем

$$\begin{aligned} q(x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n) &= q(x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n)^T = (X^T A X)^T = \\ &= X^T A^T (X^T)^T = X^T A^T X. \end{aligned}$$

Теперь складывая это равенство с равенством (11), получаем

$$2q(x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n) = X^T A X + X^T A^T X = X^T (A + A^T) X.$$

Деля на 2 (что мы можем сделать в поле характеристики не равной 2), получаем

$$q(x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n) = X^T \frac{A + A^T}{2} X.$$

Теперь замечаем, что

$$\left( \frac{A + A^T}{2} \right)^T = \frac{A^T + (A^T)^T}{2} = \frac{A^T + A}{2} = \frac{A + A^T}{2}.$$

Следовательно, матрица  $(A + A^T)/2$  симметрическая.

**Лемма 4.3** Пусть  $(v_1, \dots, v_n)$  — базис векторного пространства  $V$  над полем  $\mathbb{F}$  характеристики не равной двум. Представление квадратичной формы  $q: V \rightarrow \mathbb{F}$  в виде

$$q(x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n) = X^T A X,$$

с симметрической матрицей  $A$  существует и единственно.

*Доказательство.* Существование уже доказано непосредственно перед этой леммой. Поэтому докажем единственность. Запишем равенство из формулировки более подробно

$$q(x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{i,j} x_i x_j = \sum_{i=1}^n a_{i,i} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2a_{i,j} x_i x_j.$$

Отсюда получаем  $q(v_i) = a_{i,i}$ . Для  $i < j$  получаем

$$(v_i, v_j) = q(v_i + v_j) - q(v_i) - q(v_j) = (a_{i,i} + a_{j,j} + 2a_{i,j}) - a_{i,i} - a_{j,j} = 2a_{i,j}.$$

Так как 2 обратима в  $\mathbb{F}$ , то отсюда мы можем вычислить  $a_{i,j}$ . □

Мы обозначим матрицу  $A$  из этой леммы относящуюся к базису  $v = (v_1, \dots, v_n)$  через  $q_v$ . Наша следующая цель — понять, как меняется эта матрица при замене базиса.

**Лемма 4.4** Пусть  $v = (v_1, \dots, v_n)$  и  $u = (u_1, \dots, u_n)$  — базисы векторного пространства  $V$  над полем  $\mathbb{F}$  характеристики не равной двум. Тогда

$$q_v = (T_{u,v})^T q_u T_{u,v}$$

(напоминаем, что  $T_{u,v}$  — матрица перехода от базиса  $u$  к базису  $v$ ).

*Доказательство.* Пусть  $w$  — произвольный вектор из  $V$ . Запишем его в обоих базисах

$$w = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n, \quad w = y_1 u_1 + \cdots + y_n u_n.$$

Введём следующие обозначения для столбцов координат

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

По определению матриц  $q_v$  и  $q_u$  выполнены равенства

$$q(w) = X^T q_v X, \quad (12)$$

$$q(w) = Y^T q_u Y, \quad (13)$$

С другой стороны, по формуле (9) из [3] получаем  $Y = T_{u,v}X$ . Подставляя  $Y$  в формулу (13), получаем

$$q(w) = (T_{u,v}X)^T q_u T_{u,v}X = X^T (T_{u,v})^T q_u T_{u,v}X.$$

Сравнивая получившееся выражение с формулой (12), замечая, что матрица  $(T_{u,v})^T q_u T_{u,v}$  симметрическая, и пользуясь единственностью леммы 4.3, получаем требуемое равенство.  $\square$

### 4.3 Ортогональные матрицы

Квадратная матрица  $P$  над полем  $\mathbb{F}$  называется *ортогональной* тогда и только тогда, когда  $P^T P = E$ . Напомним, что  $E$  обозначает единичную матрицу такого же размера как  $P$ .

**Лемма 4.5** (1) Если матрица  $P$  ортогональная, то  $\det P = 1$  или  $\det P = -1$ .

(2) Матрица  $P$  ортогональная тогда и только тогда, когда  $P$  обратима и  $P^{-1} = P^T$ .

(3) Матрица  $P$  ортогональная тогда и только тогда, когда  $PP^T = E$ .

*Доказательство.* (1) Получаем

$$1 = \det(P^T P) = \det(P^T) \det(P) = \det(P)^2.$$

Заметим, что уравнение  $x^2 = 1$  имеет только два решения  $x = 1$  и  $x = -1$  над любым полем. Это следует из разложения  $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ . Следовательно,  $\det P = 1$  или  $\det P = -1$ .

(2) Если  $P$  ортогональная матрица, то согласно части (1) получаем  $\det P \neq 0$ . Поэтому матрица  $P$  обратима. Умножая равенство  $P^T P = E$  справа на  $P^{-1}$ , получаем

$$P^{-1} = EP^{-1} = (P^T P)P^{-1} = P^T (PP^{-1}) = P^T E = P^T.$$

Наоборот, пусть  $P$  обратима и  $P^{-1} = P^T$ . По определению обратной матри-

цы  $P^T P = P^{-1} P = E$ .

(3) Пусть матрица  $P$  ортогональна. Согласно части (2) получаем  $P^{-1} = P^T$ . Отсюда  $PP^T = PP^{-1} = E$ . Пусть, наоборот,  $PP^T = E$ . Переписывая наши рассуждения частей (1) и (2) задом наперёд, получаем, что  $P$  обратима и  $P^{-1} = P^T$ . Поэтому  $P^T P = P^{-1} P = E$ .  $\square$

Заметим, что уравнение  $PP^T = E$  эквивалентно тому, что строки  $r_1, \dots, r_n$  матрицы  $P$  удовлетворяют соотношению  $(r_i, r_j) = \delta_{i,j}$ , где  $\delta_{i,j}$  — символ Кронекера и  $(\cdot, \cdot): \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$  — стандартное произведение

$$(x_1, \dots, x_n)(y_1, \dots, y_n) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Аналогично равенство  $P^T P = E$  эквивалентно тому, что столбцы  $c_1, \dots, c_n$  матрицы  $P$  удовлетворяют соотношению  $(c_i, c_j) = \delta_{i,j}$ .

Нам потребуются ортогональные матрицы над полем вещественных чисел. В этом случае ортогональные матрицы можно описать, как матрицы перехода.

**Лемма 4.6** (1) Пусть  $u = (u_1, \dots, u_n)$  и  $v = (v_1, \dots, v_n)$  — два ортонормированных базиса евклидова пространства  $E$ . Тогда матрица перехода  $T_{u,v}$  от базиса  $u$  к базису  $v$  ортогональная.

(2) Пусть  $u = (u_1, \dots, u_n)$  и  $v = (v_1, \dots, v_n)$  — два базиса евклидова пространства  $E$  такие, что  $u$  ортонормированный и матрица перехода  $T_{u,v}$  от базиса  $u$  к базису  $v$  ортогональная. Тогда  $v$  тоже ортонормированный.

Доказательство. (1) Запишем матрицу  $T_{u,v}$  в виде

$$T_{u,v} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

При этом выполнено уравнение

$$v_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} u_i.$$

В силу ортонормированности базисов  $u$  и  $v$  получаем

$$\begin{aligned} \delta_{j,k} &= (v_j, v_k) = \left( \sum_{i=1}^n a_{i,j} u_i, \sum_{l=1}^n a_{l,k} u_l \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n a_{i,j} a_{l,k} (u_i, u_l) = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n a_{i,j} a_{l,k} \delta_{i,l} = \sum_{i=1}^n a_{i,j} a_{i,k} \end{aligned}$$

Это уравнение эквивалентно тому, что  $(T_{u,v})^T T_{u,v} = E$ . Следовательно, матрица  $T_{u,v}$  ортогональная.

(2) Если прочесть цепочку равенств выше справа налево, то мы получим  $\delta_{j,k} = (v_j, v_k)$ , что означает ортонормированность базиса  $v$ .  $\square$

#### 4.4 Канонический вид квадратичной формы в евклидовом пространстве

**Теорема 4.7** Пусть  $E$  — конечномерное евклидово пространство и  $q: E \rightarrow \mathbb{R}$  — квадратичная форма. Тогда существует такой ортонормированный базис  $e_1, \dots, e_n$  пространства  $E$  и вещественные числа  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , что

$$q(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

для любых  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ . Числа  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  определены однозначно с точностью до перестановки.

*Доказательство.* Обозначим скалярное произведение на  $E$  через  $(\cdot, \cdot)$ . Выберем произвольный ортонормированный базис  $v = (v_1, \dots, v_n)$  пространства  $E$ . Запишем матрицу квадратичной формы  $q$  в этом базисе в виде

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Напомним, что  $a_{i,j} = a_{j,i}$ . Пусть  $\varphi$  — оператор на  $E$  с матрицей  $q_v$ . По лемме 3.5 оператор  $\varphi$  самосопряжённый. Мы утверждаем, что

$$(\varphi(u), u) = q(u) \tag{14}$$

для любого вектора  $u \in E$ . Действительно, по построению

$$\varphi(v_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} v_i.$$

Используя ортонормированность базиса  $v$ , получаем  $(\varphi(v_j), v_k) = a_{k,j}$ . Пусть теперь  $u = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$ . Тогда

$$(\varphi(u), u) = \left( \sum_{j=1}^n x_j \varphi(v_j), \sum_{k=1}^n x_k v_k \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n x_j x_k (\varphi(v_j), v_k) =$$

$$= \sum_{j=1}^k \sum_{k=1}^n x_j x_k a_{k,j} = q(u).$$

Этим равенство (14) доказано. По теореме 3.5 оператор  $\varphi$  диагонализировать в некотором ортонормированном базисе  $e_1, \dots, e_n$ . Пусть  $\varphi(e_i) = \lambda_i e_i$ . Согласно формуле (14) мы получаем

$$\begin{aligned} q(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) &= (\varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n), x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = \\ &= (x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n), x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = \\ &= (x_1 \lambda_1 e_1 + \dots + x_n \lambda_n e_n, x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2. \end{aligned}$$

Заметим, что мы получили

$$q_e = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Для доказательства единственности предположим, что существует другой ортонормированный базис  $(e'_1, \dots, e'_n)$  пространства  $E$  и вещественные числа  $\lambda'_1, \dots, \lambda'_n$ , что

$$q(x_1 e'_1 + \dots + x_n e'_n) = \lambda'_1 x_1^2 + \dots + \lambda'_n x_n^2$$

для любых  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ . В этом случае

$$q_{e'} = \begin{pmatrix} \lambda'_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda'_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda'_n \end{pmatrix}$$

По лемме 4.4 получаем  $q_{e'} = (T_{e,e'})^T q_e T_{e,e'}$ . Согласно части (1) леммы 4.6 матрица перехода  $T_{e,e'}$  ортогональная. Следовательно,  $q_{e'} = (T_{e,e'})^{-1} q_e T_{e,e'}$  и матрицы  $q_{e'}$  и  $q_e$  сопряжены. Согласно единственности жордановой нормальной формы, эти матрицы имеют одинаковые с точностью до перестановки собственные значения, что и доказывает утверждение единственности этой теоремы.  $\square$

Конструкция первой части доказательства позволяет выписать формулы для координат. Пусть  $v \in E$  и  $v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$  и  $v = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$ . Запишем координаты в столбцы

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

по формуле (9) из [3] получаем  $X = T_{v,e}Y$ . Отсюда

$$u = vX, u = eY \Rightarrow Y = (T_{v,e})^T X, q(u) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2. \quad (15)$$

**Следствие 4.8** Пусть  $E$  — конечномерное евклидово пространство и  $q: E \rightarrow \mathbb{R}$  — квадратичная форма. Тогда существует такой ортогональный базис  $(f_1, \dots, f_n)$  пространства  $E$  и целые числа  $i$  и  $j$ , что  $1 \leq i \leq j \leq n$  и

$$q(x_1 f_1 + \dots + x_n f_n) = x_1^2 + \dots + x_i^2 - x_{i+1}^2 - \dots - x_j^2$$

для любых  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ . Числа  $i$  и  $j$  определены однозначно.

*Доказательство.* Пусть  $(e_1, \dots, e_n)$  — такой ортонормированный базис пространства  $E$ , который требуется в теореме 4.7. Переставляя, если необходимо, элементы базиса, мы можем добиться того, что

$$\lambda_1, \dots, \lambda_i > 0, \quad \lambda_{i+1}, \dots, \lambda_j < 0, \quad \lambda_{j+1} = \dots = \lambda_n = 0.$$

Положим

$$f_1 = \frac{e_1}{\sqrt{\lambda_1}}, \dots, f_i = \frac{e_i}{\sqrt{\lambda_i}}, f_{i+1} = \frac{e_{i+1}}{\sqrt{-\lambda_{i+1}}}, \dots, f_j = \frac{e_j}{\sqrt{-\lambda_j}}, f_{j+1} = e_{j+1}, \dots, f_n = e_n.$$

Мы получаем

$$\begin{aligned} q(x_1 f_1 + \dots + x_n f_n) &= \\ &= q\left(\frac{x_1}{\sqrt{\lambda_1}} e_1 + \dots + \frac{x_i}{\sqrt{\lambda_i}} e_i + \frac{x_{i+1}}{\sqrt{-\lambda_{i+1}}} e_{i+1} + \dots + \frac{x_j}{\sqrt{-\lambda_j}} e_j + x_{j+1} e_{j+1} + \dots + x_n e_n\right) \\ &= \lambda_1 \left(\frac{x_1}{\sqrt{\lambda_1}}\right)^2 + \dots + \lambda_i \left(\frac{x_i}{\sqrt{\lambda_i}}\right)^2 + \lambda_{i+1} \left(\frac{x_{i+1}}{\sqrt{-\lambda_{i+1}}}\right)^2 + \dots + \lambda_j \left(\frac{x_j}{\sqrt{-\lambda_j}}\right)^2 \\ &= x_1^2 + \dots + x_i^2 - x_{i+1}^2 - \dots - x_j^2. \end{aligned}$$

Предположим теперь, что  $(f'_1, \dots, f'_n)$  — ещё один ортогональный базис такой, что

$$q(x_1 f'_1 + \dots + x_n f'_n) = x_1^2 + \dots + x_{i'}^2 - x_{i'+1}^2 - \dots - x_{j'}^2$$

для любых  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ . Рассмотрим соответствующий ортонормированный базис  $(e'_1, \dots, e'_n)$ , где  $e'_k = f'_k / |f'_k|$ . Мы получаем

$$q(x_1 e'_1 + \dots + x_n e'_n) = q\left(\frac{x_1}{|f'_1|} f'_1 + \dots + \frac{x_n}{|f'_n|} f'_n\right)$$

$$= \frac{x_1^2}{|f'_1|^2} + \dots + \frac{x_{i'}^2}{|f'_{i'}|^2} - \frac{x_{i'+1}^2}{|f'_{i'+1}|^2} - \dots - \frac{x_{j'}^2}{|f'_{j'}|^2} + 0 x_{j'+1}^2 + \dots + 0 x_n^2.$$

Из теоремы 4.7 следует, что последовательности чисел (длины  $n$ )  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  и

$$\frac{1}{|f'_1|^2}, \dots, \frac{1}{|f'_{i'}|^2}, -\frac{1}{|f'_{i'+1}|^2}, \dots, -\frac{1}{|f'_{j'}|^2}, 0, \dots, 0$$

получаются одна из другой перестановкой. Учитывая знаки, получаем, что это возможно только, если  $i = i'$  и  $j = j'$ .  $\square$

#### 4.5 Пример для $\mathbb{R}^n$

Пусть квадратичная форма  $q$  на  $\mathbb{R}^3$  задана формулой

$$q(x_1, x_2, x_3) = 23 x_1^2 + 20 x_1 x_2 - 18\sqrt{3} x_1 x_3 - 4 x_2^2 + 20\sqrt{3} x_2 x_3 + 5 x_3^2.$$

Запишем её матрицу в стандартном базисе  $v = (v_1, v_2, v_3)$ , где

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Получаем

$$q_v = \begin{pmatrix} 23 & 10 & -9\sqrt{3} \\ 10 & -4 & 10\sqrt{3} \\ -9\sqrt{3} & 10\sqrt{3} & 5 \end{pmatrix}.$$

Рассматривая оператор с такой матрицей в базисе  $v$  мы находим следующие собственные значения:  $\lambda_1 = 16$ ,  $\lambda_2 = -24$ ,  $\lambda_3 = 32$  и следующие собственные векторы:

$$e_1 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{6}}{4} \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Записывая эти столбцы в одну матрицу, получаем



$$T_{v,e} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Пусть

$$(x_1, x_2, x_3) = y_1 e_1 + y_2 e_2 + y_3 e_3.$$

Тогда согласно формулам (15) получаем

$$\begin{cases} y_1 = \frac{-\sqrt{2}x_1 - 2\sqrt{2}x_2 - \sqrt{6}x_3}{4} \\ y_2 = \frac{\sqrt{2}x_1 - 2\sqrt{2}x_2 + \sqrt{6}x_3}{4} \\ y_3 = \frac{-\sqrt{3}x_1 + x_3}{2}, \end{cases} \quad q(x_1, x_2, x_3) = 16y_1^2 - 24y_2^2 + 32y_3^2.$$

Читатель может подставить  $y_1, y_2, y_3$  из левой части в правую и проверить, что в действительности получается исходная формула для  $q$ .

## 5 Список литературы

1. Математика в экономике. Ч.1: Линейная алгебра, аналитическая геометрия и линейное программирование: Учебник для студ. экономич. спец. вузов / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, И.Г. Шандра. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011.
2. Сборник задач по курсу «Математика в экономике». В 3-х ч. Ч.1. Линейная алгебра, аналитическая геометрия и линейное программирование: учеб. пособие / под ред. В.А. Бабайцева и В.Б. Гисина. — М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2013.
3. Щиголев В.В., Алгебра и геометрия 1, Учебное пособие по дисциплине «Алгебра и геометрия», Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации, Москва, 2018.