

Talviaikainen kasvipeitteisyys

Kuvaus

Talviaikainen kasvipeitteisyys voidaan toteuttaa usealla eri tavalla esimerkiksi monivuotisena nurmena, kerääjä- tai saneerauskasveja käyttämällä tai suorakylvöllä muokkaamatta viljan sänkeä.

Minne soveltuu: Suositeltavaa kaikkialla, mutta erityisesti eroosioherkillä ja jyrkillä pelloilla.

Viljelyn kokonaistalous

Sato ja kannattavuus: Joistakin kasveista saatavat ravinne- ja esikasvihyödyt voivat nostaa satotasoa. Jos kasvipeitteisyyden toteutustapa ei jostain syystä sovi peltolohkolle (esim. suorakylvö hiesul-la), voi vaikutus satotasoon olla negatiivinen.

Kustannukset ja säästöt: Kerääjäkasvien typpihyödyt voivat vähentää typpilannoituksen tarvetta. Kustannukseksi on arvioitu 35–65 €/ha/v. Kustannukset riippuvat kasvipeitteisyyden toteuttamistavasta, esimerkiksi jos kasvipeitteisyys toteutetaan säilyttämällä viljan sänki keväeseen ilman muokkausta tai jos nurmi kuuluu viljelykiertoon, ylimääräisiä kustannuksia ei synny. Kerääjäkasvien kylvöstä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia.

Tuet: Viljelijätukien ehdollisuuden vaatimuksena on talviaikainen vähimmäismaanpeite: 33 % peltojen ja pysyvien kasvien alasta oltava kasvipeitteistä (kasvi, sänki, kasvijäte, kevyesti muokattu). Talviaikaiseen kasvipeitteeseen voi saada ekojärjestelmätukea 50 €/ha.

Haasteet

Tutkimusten mukaan talviaikaan kasvipeitteisiä pelloja tulisi muokata ajoittain. Tällöin fosfori ei pääse rikastumaan pintamaahan, jolloin liukoisen fosforin kuormitus vähenee. Muokkauksen ajoituksessa huomioidaan riski maan tiivistymiselle, kasvinsuojelu ja -vuorotus sekä töiden jaksotus. Eroosioherkillä lohkoilla muokkaus voi olla harvempaa, sillä niissä painottuu hiukkasmaisen fosforin huuhtouman torjuminen.

Ympäristöhyödyt



Lisätietoa:

- [Talviaikainen kasvipeite \(ymparistokioski.fi\)](https://ymparistokioski.fi)
- [Samassa Vedessä -hankkeen politiikkasuositukset \(helda.fi\)](https://helda.fi)
- [Eräiden vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuuden vertailua \(mtk.fi\)](https://mtk.fi)