

Reducción y resolución formal

Modelo: R_plus_alpha_times_RiemannSq

$$\text{Lagrangiano: } L = g^{ac} g^{bd} R_{abcd} + \alpha g^{ae} g^{bf} g^{cg} g^{dh} R_{abcd} R_{efgh}$$

Ansatz: draft4_circular_specialized

$$\text{Especialización de } \phi : \quad \phi = q \varphi$$

Estado global: hay familias verificadas y ramas pendientes

$$\text{Dominio de trabajo: } f(r) \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos declarados: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Ecuaciones combinadas

$$E_{\tau}^{\tau} - E_r^r = 0$$

$$E_{\tau}^{\tau} - E_{\varphi}^{\varphi} = 0$$

$$E_r^r - E_{\varphi}^{\varphi} = 0$$

Combinaciones proyectadas y reducidas

$$E_{\tau}^{\tau} - E_r^r = -\frac{1}{r^3} 2\alpha \left(2f'(r) + r^3 f^{(4)}(r) - 2rf''(r) + 2r^2 f^{(3)}(r) \right) f(r) = 0$$

$$E_{\tau}^{\tau} - E_{\varphi}^{\varphi} = \frac{1}{2r^3} \left(f'(r)r^2 - f''(r)r^3 + 2\alpha \left(r^3 f''(r)^2 - 2rf'(r)^2 + 2f'(r)f(r) + f'(r)f''(r)r^2 - f'(r)f^{(3)}(r)r^3 - 2rf''(r)f(r) - 2f(r)f^{(3)}(r)r^2 - 2f(r)f^{(4)}(r)r^3 \right) \right) = 0$$

$$E_r^r - E_{\varphi}^{\varphi} = \frac{1}{2r^3} \left(f'(r)r^2 - f''(r)r^3 + 2\alpha \left(r^3 f''(r)^2 - 2rf'(r)^2 + 6f'(r)f(r) + f'(r)f''(r)r^2 - f'(r)f^{(3)}(r)r^3 - 6rf''(r)f(r) + 2f(r)f^{(3)}(r)r^2 \right) \right) = 0$$

Ecuaciones absolutas y escalares

$$E_{\tau}^{\tau} = \frac{1}{2r^3} \left(f'(r)r^2 + \alpha \left(r^3 f''(r)^2 - 4f'(r)f(r) + 2rf'(r)^2 - 8f(r)f^{(3)}(r)r^2 - 4f(r)f^{(4)}(r)r^3 - 2f'(r)f''(r)r^2 - 2f'(r)f^{(3)}(r)r^3 + 4rf''(r)f(r) \right) \right) = 0$$

$$E_{\phi} = 0 = 0$$

Componentes fuera de la diagonal: $0 = 0$.

Familias verificadas

Familia 1: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$\alpha = 0$$

$$q = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad C_1 \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 2: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$\alpha = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1, q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad q \neq 0, \quad C_1 \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 3: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1, α .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad C_1 \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 4: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1, α, q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad q \neq 0, \quad C_1 \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 5: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = -\frac{(r^2 - 2\alpha C_1)}{2\alpha}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2

Parámetros libres en esta familia: α, C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 - \frac{r^2}{2\alpha} \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad -\frac{1}{2\alpha} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 6: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = -\frac{(r^2 - 2\alpha C_1)}{2\alpha}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2

Parámetros libres en esta familia: α, C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 - \frac{r^2}{2\alpha} \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad -\frac{1}{2\alpha} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 7: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = -\frac{(r^2 - 2\alpha C_1)}{2\alpha}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2

Parámetros libres en esta familia: α, C_1, q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 - \frac{r^2}{2\alpha} \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad q \neq 0, \quad -\frac{1}{2\alpha} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 8: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = -\frac{(r^2 - 2\alpha C_1)}{2\alpha}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2

Parámetros libres en esta familia: α , C_1 , q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 - \frac{r^2}{2\alpha} \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \alpha \neq 0, \quad q \neq 0, \quad -\frac{1}{2\alpha} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Auditoría de ramas no aceptadas

Candidatos conservados solo en results.json: rejected=32, undetermined=1, partial=3.

Sistema: ODE; orden máximo: 4.

Funciones o parámetros libres: q

Complejidad: no demostrada. Una búsqueda simbólica acotada no certifica que no existan otras ramas diferenciales o singulares.