

Медуза

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 10 апреля 2026 года](#); проверки требует [1 правка](#).

Меду́за, или **медузоидное поколение** (греч. μέδουσα), — фаза [жизненного цикла](#) [стрекающих](#) из подтипа [Medusozoa](#): [гидроидных](#) (Hydrozoa), [сцифоидных](#) (Scyphozoa) и [кубомедуз](#) (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой [соединительной ткани](#) — [мезоглеи](#) — и по форме напоминает колокол или зонтик^[1]. Такое строение обеспечивает способность к реактивному движению путём сокращения мышц стенки колокола^[1]. Тело медузы в среднем на 98 % состоит из воды^[2]. Даже самые крупные медузы, чьи линейные размеры превышают метр, а масса доходит до нескольких центнеров, не способны противостоять морским течениям, поэтому рассматриваются в составе [планктона](#).



Крупное скопление [сцифомедуз](#) из отряда [корнеротов](#) (Rhizostomeae)



Chrysaora hysoscella

У **трахилид** и пелагии^[уточнить] чередование поколений утрачено, медуза развивается из яйца^[3].

Обычно медузы образуются в результате **почкования полипов** и размножаются **половым путём**, давая начало свободно плавающим личинкам — **планулам**^[1]. Некоторые гидроидные медузы способны и к бесполому размножению (путём почкования или поперечного деления)^[1]. В качестве источника пищи медузы используют **зоопланктон**, поедая в том числе икру и личинки некоторых видов рыб^[4]. В свою очередь, сами медузы становятся жертвами взрослых **пелагических** рыб^[4].

Стрекательные клетки некоторых видов кубомедуз и гидромедуз способны вызывать у человека болезненные ожоги^[1].

Название медуз произошло от **Медузы** из античной мифологии.

Строение




Схема строения медузы **гидроидных** в продольном разрезе

Различающиеся по строению медузы разных классов стрекающих получили собственные названия:

- **гидромедузы** (Hydrozoa);
- **сцифомедузы** (Scyphozoa);
- **кубомедузы** (Cubozoa)^[1].

Последние два термина также употребляют для обозначения всех стадий жизненного цикла представителей соответствующих классов, поскольку они наиболее известны именно по стадии медузы^[1].

Строение на примере ушастой аурелии

Основная статья: **Ушастая аурелия**


Примером сцифомедузы может служить **ушастая аурелия** (*Aurelia aurita*).

Медуза не имеет специализированных органов дыхания — она дышит всем телом. По периметру тела выступают чувствительные тельца (**ропалии**), воспринимающие различные импульсы среды, например свет. В студенистом и прозрачном теле медузы нет сложных глаз, которые могли бы различать объекты, — есть только глазки на ропалиях, способные лишь отличать свет от тьмы, реагировать на приближение крупных объектов (но, **кубомедузы** имеют до восьми настоящих глаз). Ротовое отверстие служит медузе как для употребления пищи, так и для удаления её остатков. Остатки пищи, не переваренные до конца, выводятся через то же отверстие. Около ротового отверстия находятся 4 ротовые лопасти, снабжённые стрекательными клетками, в них же содержится «обжигающее» стрекательное вещество, служащее для обороны и для добычи пищи. Поскольку медуза в основном (95—99 %, в зависимости от вида) состоит из воды и не

имеет скелета, её жизнь на суше невозможна. Когда медузу выбрасывает на берег, она погибает, высыхая на солнце.

Жизненный цикл

Основная статья: [Жизненный цикл Medusozoa](#)



Жизненный цикл [сцифоидных](#).

1-11 — бесполое поколение
(полип);

11-14 — половое поколение
(медуза)

Медуза размножается [половым путём](#). Мужские особи производят [сперматозоиды](#), женские — [яйцеклетки](#), после слияния образуется личинка — [планула](#), оседающая на дне. Из планулы вырастает [полип](#) (бесполое поколение). Когда полип достигает полной зрелости, от него почкованием отрываются молодые медузы. У [сцифоидных](#) только что отделившаяся медуза сильно отличается от зрелой формы и носит название [эфира](#)^[1].

Использование медуз человеком

Основная статья: [Блюда из медуз](#)

Некоторые виды медуз употребляются в пищу в странах Восточной и Юго-Восточной Азии и используются в качестве ингредиента в различных блюдах. В некоторых азиатских странах их считают деликатесом. Из медуз готовятся салаты, суши, лапши, основные блюда и даже мороженое. Существуют различные методы приготовления медуз.

Распространенным методом переработки является консервирование медуз, в результате чего получается высушенный готовый продукт, содержащий около 65% влаги и 20% соли. Медузы быстро портятся при комнатной температуре, поэтому обработка начинается вскоре после их вылова. Обезвоживание традиционно проводится путем посыпания медуз

поваренной солью и квасцами, слива рассола и повторения процесса. Обезвоженные и маринованные медузы считаются деликатесом в нескольких азиатских странах, включая Китай, Корею, Вьетнам и Японию.

В Японии, Корее и Китае готовят блюда из медуз *Stomolophus meleagris*, *Catostylus mosaicus*, *Rhopilema esculentum* и *Rhopilema hispidum* уже более 1700 лет. К съедобным видам медуз относятся *Aurelia aurita*, *Crambionella orsini*, *Chrysaora pacifica*, *Lobonema smithii*, *Lobonemoides gracilis* и *Stomolophus nomuria*. Готовые к употреблению обессоленные медузы низкокалорийны и практически не содержат жира, около 5% белка и 95% воды. Медуз рекомендуют при повышенном кровяном давлении и других заболеваниях; они являются диетическим продуктом. Еще в Средние века из распространенной в Черном море [медузы Корнерот](#) изготавливали мочегонные и слабительные средства. А сейчас из яда медуз производят лекарства для лечения легочных болезней и регулирования кровяного давления.



Медузы являются объектом промысла. В 2001 году мировая добыча съедобных медуз составила 320 тысяч тонн. За 2021 год в исключительной экономической зоне России в Японском море рыбаки Российской Федерации добыли 549 тонн медуз^[5].

Стрекательные клетки

Основная статья: [Книдоцит](#)

Для охоты на добычу и защиты от врагов щупальца медуз снабжены специальными стрекательными клетками, или *книдоцитами*. Книдоциты бывают различных типов:

- *пенетранты* — остроконечные нити, которые втыкаются в тело жертвы, впрыскивая жгучую субстанцию;
- *глютинанты* — длинные нити, покрытые липкой субстанцией, обездвиживают жертву, облепляя её множеством таких книдоцитов; также участвуют в пассивном передвижении полипа, прицепляясь к движущемуся объекту;
- *вольвенты* — короткие нити, запутывающие жертву, и другие (см. [Разновидности книдоцитов](#))

Рисунки Эрнста Геккеля



НДТК
апу
раб
кто
ом
ме
ед
ду
уу
ны
ны
ы



Примечания

1. Зоология беспозвоночных. Т. 1: от простейших до моллюсков и артропод. Под ред. В. Вестхайде и Р. Ригера. М.: Т-во научных изданий КМК, 2008, 512 с.
2. Медузы // Биология / Сост. С. Т. Исмаилова. — 3-е изд. — М.: «Аванта+», 1996. — Т. 2. — С. 315. — (Энциклопедия для детей). — ISBN 5-86529-012-6.
3. Энциклопедия книжного клуба «XXI век». — М.: Астрель • АСТ, 2002. — Т. 12 М—Н. — С. 13. — ISBN 5-17-011630-6.
4. Purcell J. E., Arai M. N. Interactions of pelagic cnidarians and ctenophores with fish: a review (<https://www.researchgate.net/publication/226927949>) (англ.) // Hydrobiologia. — 2001. — Vol. 451. — P. 27–44. — doi:10.1023/A:1011883905394 (<https://dx.doi.org/10.1023%2FA%3A1011883905394>) .
5. Сведения об улове рыбы и добыче других водных биоресурсов за 2021 год (<https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2022/05/svedeniya-ob-ulove-za-yanvar-dekabr-2021.pdf>) .
Дата обращения: 8 октября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240108>

Ссылки

- [Медузы](#) // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- *Медузы* — статья из [Большой советской энциклопедии](#).

У этой статьи есть 3 проблемы, помогите их исправить:

- Достоверность этой статьи поставлена под сомнение.
- В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).
- Содержание этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы литературного русс

[\[скрыть\]](#)

[Узнать больше](#)

[Узнать больше](#)

[Узнать больше](#)

[Сообщить об ошибке](#)

