

Совет давать детям арахис с раннего возраста помог тысячам малышей избежать аллергии.



1 из 2 | Спустя десять лет после того, как знаковое исследование доказало, что кормление детей раннего возраста продуктами с арахисом может предотвратить развитие опасной для жизни аллергии, новое исследование [Читать дальше](#)



АВТОР: ДЖОНЕЛ АЛЕЧИА

Обновлено в 16:46 по Гринвичу +3, 21 октября 2025 года

[Leer en español](#)

Спустя десять лет после того, как знаковое исследование доказало, что кормление детей младшего возраста продуктами с арахисом может [предотвратить развитие](#) опасной для жизни аллергии, новое исследование показало, что эти изменения существенно повлияли на ситуацию в реальном мире.

Распространенность аллергии на арахис в США начала снижаться после того, как в 2015 году были выпущены рекомендации, перевернувшие медицинскую практику: теперь детям разрешалось вводить этот аллерген в рацион уже с 4 месяцев.

Распространенность аллергии на арахис у детей в возрасте от 0 до 3 лет снизилась более чем на 27 % после того, как в 2015 году были выпущены рекомендации для детей из группы риска, и более чем на 40 % после того, как в 2017 году рекомендации были расширены.

«Это поразительно, правда?» — сказал доктор Дэвид Хилл, аллерголог и исследователь из Детской больницы Филадельфии, автор исследования [опубликованного в понедельник](#) в медицинском журнале Pediatrics. Хилл и его коллеги проанализировали электронные медицинские карты из десятков педиатрических клиник, чтобы отследить случаи пищевой аллергии у детей младшего возраста до, во время и после публикации рекомендаций.

«Сегодня я могу с уверенностью сказать, что детей с пищевой аллергией стало меньше, чем было бы, если бы мы не предприняли эти меры в сфере общественного здравоохранения», — добавил он.

С 2015 года около 60 000 детей избежали пищевой аллергии, в том числе 40 000 детей, у которых в противном случае развилась бы аллергия на арахис. Тем не менее около 8% детей страдают от пищевой аллергии, в том числе более 2% — от аллергии на арахис.

Аллергия на арахис возникает, когда иммунная система организма ошибочно распознает белки арахиса как вредные и выделяет химические вещества, которые вызывают аллергические симптомы, в том числе крапивницу, респираторные симптомы, а иногда и опасную для жизни анафилаксию.

Читать дальше ▼