

+7 (495) 844-6558

О клинике

Главная » Направления » Ортопедия и травматология » Кровотечение. Оказание первой помощи

Оказание первой помощи при кровотечениях

Кровотечение - это истечение крови из кровеносных сосудов в органы, ткани, в естественные полости тела или во внешнюю среду. Пострадавшему необходима срочная медицинская помощь, так как быстрая и значительная потеря крови несет серьезную угрозу здоровью и может привести к летальному исходу.


Причины кровотечения

Вызвать кровотечение могут следующие факторы:

- ▣ механическое повреждение сосудов;
- ▣ новообразование или воспалительный процесс в стенках сосудов;
- ▣ ухудшение целостности сосудов вследствие инфекции, недостатка витаминов или отравления организма.



Помните, что своевременная помощь при кровотечении способна спасти жизнь пострадавшему!





1/3

Помощь при кровотечении. Виды кровотечений



1/3

Помощь при кровотечении. Виды кровотечений

Виды кровотечений

Вид кровотечения зависит от того, какой сосуд пострадал, в каком участке тела он локализован, какова интенсивность кровопотери.

Классификация по виду повреждения кровеносных сосудов:

- ▣ капиллярное кровотечение;
- ▣ венозное;
- ▣ внутреннее (паренхиматозное);
- ▣ артериальное;
- ▣ смешанное кровотечение.

Классификация по причине, вызвавшей кровотечение:

- ▣ патологическое кровотечение;
- ▣ травматическое.


Классификация по месту возникновения кровопотери:

- ▣ внешнее;
- ▣ внутреннее.

Классификация по объему кровопотери:

В среднем в организме взрослого человека циркулирует около 5 литров крови. В зависимости от объема вылившейся жидкости врачи выделяют следующие степени кровопотери:

- ▣ легкая степень (меньше 0,5 литров);
- ▣ средняя (меньше 1 литра);



— массивная (около 2 литров);

- ☑ смертельная (около 3 литров), т.е. больше половины всего объема крови;
- ☑ абсолютно смертельная (больше 3,5 литров), т.е. выше 60%.



Первая помощь при кровотечении - это система лечебных и профилактических мер, которые необходимо принять при повреждении кровеносных сосудов (артерий, капилляров и вен) до появления квалифицированной медицинской помощи. Для каждого вида кровотечения существуют свои особенности в оказании помощи.

Общие правила первой помощи при кровотечении

Если пострадавший потерял значительную часть крови, постарайтесь уложить его и приподнять ему ноги.

Нельзя прикасаться руками к ране и удалять из нее осколки стекла.

При попадании в рану песка и ржавчины, не стоит промывать повреждение, так как это усилит кровотечение.

При загрязнении раны нужно осторожно удалить грязь в направлении от раны, затем антисептиком обработать очищенные края.


При обрабатывании краев раны раствором йода не допускается попадание антисептика внутрь раны.

В зависимости от вида кровопотери постарайтесь остановить кровь с помощью жгута, закрутки или пережатия поврежденного сосуда.

Первая помощь при капиллярном кровотечении

Кровотечение из капилляров не сопровождается большой кровопотерей и сравнительно быстро останавливается. Признак повреждения капилляров - появление на ране несильной струйки крови.

В первую помощь при данном кровотечении входит обработка спиртовым антисептиком (йодом) краев раны, на которую накладывают асептическую марлевую повязку. Обратите внимание, чтобы повязка не была тугой. Обычно при капиллярном кровотечении нет необходимости обращаться в больницу, исключение составляют ситуации, когда повреждения обширны.





1/2

Первая помощь при
кровотечении



1/2

Первая помощь при
кровотечении

Первая помощь при венозном кровотечении

Признак **венозного кровотечения** - быстро вытекающая темная кровь. Течение ее равномерно, без фонтанирования и пульсации.

При венозном кровотечении могут появиться кровяные сгустки, удалять их нельзя, так как в этом случае потеря крови может усилиться.


Для **остановки кровотечения** нужно наложить на рану давящую асептическую повязку. При продолжении кровопотери необходимо провести наложение жгута ниже поврежденного места. Чтобы меньше травмировать мягкие ткани и кожу, на них (под жгут) кладут мягкую прокладку. Необходимо сделать записку с указанием времени наложения жгута. Максимальное время ношения жгута - 1 час в теплое время и 30 минут при минусовой температуре. Жгут - это шокогенный фактор, поэтому чем меньше времени он используется, тем лучше. Необходимо выполнять процедуру контроля жгута на всех этапах: дольше этого времени жгут держать не рекомендуется, иначе может начаться отмирание обескровленных тканей. При отсутствии жгута можно сделать закрутки из подручных средств: бинт, пояс, полотенце, кусок ткани с применением ручки и короткой палки. Временные рамки закруток такие же. Без назначения врача старайтесь не использовать никакие кровоостанавливающие препараты.

Первая помощь при артериальном кровотечении

Артериальное кровотечение является одним из самых опасных. Главный **признак повреждения артерии** - кровь ярко-алого цвета, вытекающая пульсирующей струей и с большой скоростью. В случае повреждения крупных артерий кровь начинает бить прерывисто, фонтаном.

Первая помощь при данном **кровотечении** заключается в наложении кровоостанавливающего жгута выше уровня раны. Также можно применять закрутку. Временные ограничения - те же.

При отсутствии жгута или закрутки можно остановить кровотечение, прижав палец к артерии выше поврежденного участка, т.е. в точке пульсации.



приподнятом положении.

Первая помощь при внутреннем кровотечении

Внутреннее кровотечение очень опасно, так как его невозможно заметить визуально. Чаще всего встречается при повреждении внутренних органов. Предположить, что у человека открылось **внутреннее кровотечение** (кровотечение в брюшную полость, легочное или маточное) можно по следующим симптомам: головокружение или обморок, бледная кожа, слабый и частый пульс, поверхностное дыхание, холодный пот.

Помощь при данном кровотечении следующая: пострадавшему нужно обеспечить покой в положении полусидя. К предполагаемому месту повреждения сосудов приложить лед или компресс, срочно доставить больного в медицинское учреждение.



В клинике «МедикСити» каждый день с 9.00 до 21.00 работает **травмпункт**. **Опытные врачи-хирурги** и **травматологи** окажут вам квалифицированную медицинскую помощь при любых видах кровотечения.

Комплексная диагностика с применением современной аппаратуры (**МРТ, рентген, УЗИ**) поможет выявить истинную причину кровопотери, что позволит выбрать правильную тактику лечения. При необходимости вы можете посетить других специалистов нашей клиники: **гастроэнтерологов, кардиологов, гинекологов** и т.д. Мы с вами рядом каждый день и всегда готовы оказать необходимую помощь!

Материал подготовлен при участии специалиста:

Бикбулатов Вадим Рифкатович
Врач-травматолог, ортопед


Наши специалисты

Бесчастнов Дмитрий Валерьевич
Врач-травматолог, ортопед
Первая квалификационная категория

Бикбулатов Вадим Рифкатович
Врач-травматолог, ортопед

Гриценко Евгений Александрович
Врач-травматолог, ортопед
Первая квалификационная категория

Кириченко Алексей Викторович



Цены на данные услуги

+7 (495) 844-6558

[Главная](#)

[О клинике](#)

[Документы](#)

[Отзывы](#)

[Контакты](#)

[Налоговый вычет](#)

[Политика в отношении обработки персональных данных](#)

[Политика конфиденциальности персональных данных пользователей сайта](#)

[Версия для ПК](#)

