



Здоровье мужчин

Средний уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое за последние 50 лет, говорят ученые

Эксклюзив: Исследователи предупреждают о 'серьезном кризисе мужского репродуктивного здоровья', частично вызванном ожирением и диабетом

Hannah Devlin *Science correspondent*

Вт 7 июля 2026 года в 16.41 по восточному времени

 Предпочитаю Guardian в Google

По данным ученых, средний уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое за последние 50 лет, которые говорят, что общество сталкивается с кризисом мужской фертильности.

Согласно данным, представленным во вторник на ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне, общий уровень тестостерона у мужчин снизился на 54% в период с 1972 по 2019 год.

Ожидается, что свою роль сыграют растущий уровень ожирения и диабета, но авторы исследования предполагают, что такие факторы окружающей среды, как химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, которые содержатся в различных предметах домашнего обихода, и глобальное потепление, также могут быть причиной столь резкого снижения показателей.

«Я думаю, что мы столкнулись с серьезным кризисом в области мужского репродуктивного здоровья, которому в настоящее время уделяется недостаточно внимания», — сказал профессор Хагай Левин из [Школы общественного здравоохранения и общественной медицины Еврейского университета — Хадассы Браун](#) в Израиле.

«За этот период мы наблюдали снижение общего уровня тестостерона более чем на 50%, — сказал он. — Каждый год уровень тестостерона снижался более чем на 1%, так что это не случайность и не статистическая ошибка. Это очень устойчивая тенденция».

Полученные результаты станут важным вкладом в широко обсуждаемую тему снижения мужской фертильности и его причин. Предыдущие исследования той же группы ученых, которые показали, что [количество сперматозоидов резко сократилось](#) за последние 40 лет, привлекли внимание общественности. Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший недавно назвал снижение мужской фертильности «экзистенциальной проблемой».

Однако эти утверждения вызвали [споры в научном сообществе](#). Профессор Имперского колледжа Лондона и консультант по репродуктивной эндокринологии Чанна Джаясена сказал, что последние наблюдения за уровнем тестостерона должны стать «важной проверкой реальности».

«Тот факт, что эти исследования проводились в разные исторические периоды, убеждает меня, — сказал он. — Я действительно считаю, что репродуктивное здоровье мужчин ухудшается и, судя по всему, ухудшалось с течением времени».

Взаимосвязь между уровнем тестостерона у мужчин и их здоровьем двусторонняя и сложная. Тестостерон регулирует выработку спермы, половое влечение, помогает наращивать мышечную массу, повышает плотность костной ткани и влияет на настроение, уровень энергии и обмен веществ. [Факторы, связанные со здоровьем](#), такие как ожирение, при котором избыток жира в организме увеличивает превращение тестостерона в эстроген, могут привести к снижению уровня тестостерона. Кроме того, в медицинском сообществе ведутся активные споры об использовании добавок с тестостероном, которые, как ни парадоксально, могут подавлять выработку спермы.

«Репродуктивное здоровье — очень важный показатель общего состояния здоровья, — говорит Левин. — Мы живем в среде, которая не идеальна для нашего здоровья с точки зрения воздействия химических веществ, климата и образа жизни».

В метаанализе были объединены шесть предыдущих лонгитюдных исследований уровня тестостерона, каждое из которых включало как минимум три временных отрезка. В общей сложности они включали данные 118 593 человек из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании за период с 1972 по 2019 год.

Каждое из исследований по отдельности выявило снижение уровня тестостерона, а при объединении данных общее снижение составило 54 %, причем после 2000 года этот показатель, по-видимому, начал снижаться быстрее.

В отдельных исследованиях учитывался возраст, но, возможно, на результаты повлияли искажающие факторы, такие как разница в среднем возрасте участников. Также не учитывалось ожирение, которое, как известно, тесно связано с низким уровнем тестостерона.

«Если бы мне пришлось угадывать — и это было бы обоснованное предположение, — я бы сказал, что от четверти до половины случаев ухудшения состояния можно объяснить ожирением и метаболическим синдромом», — сказал Левин.

Others said that such a conclusion would be premature. “Obesity and diabetes could easily account for all of this,” said Jayasena. “There appears to be a clear reduction in testosterone levels. What we need to do is to clarify, in addition to obesity and diabetes, whether environmental factors are provoking this.”

It is less clear which environmental factors might be involved, with studies on air pollution and endocrine-disrupting chemicals tending to produce inconsistent results. In light of uncertain evidence, Levine said, the precautionary principle should be applied.

“The level of certainty that we need is not 95%,” he said. “We should find better ways to prevent exposure of the general public to hazardous chemicals. And we don’t do it well enough at the moment.”

Prof Allan Pacey, a professor of andrology at the University of Manchester, who was not involved in the work, said a concern about the narrative that men have low testosterone is the [increasing promotion of testosterone supplements](#) on social media.

“The solution that’s being promoted is that we give you testosterone,” he said. “But if you give a man testosterone, you switch off his sperm production. I’ve seen that in the clinic.”

More on this story

Science Weekly

Is male testosterone in freefall? - podcast

3d ago

Chinese-owned Syngenta to build new £100m bioscience hub in UK

16 Mar 2026

World’s largest GPS penis traced across Bannau Brycheiniog for charity

3 Nov 2024

Big pharma will stop investing in UK, top scientist warns after Merck’s £1bn exit

11 Sept 2025

US drugmaker scraps £1bn research centre

10 Sept 2025



Most viewed
