

[Главная](#) > [БЭЭ](#) > [Водные объекты](#) > [А](#) > Ангара

БОЛЬШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Ангара

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ангара — единственная река, вытекающая из Байкала, и крупнейший правый приток Енисея. Она проходит по Иркутской области и Красноярскому краю, связывает Байкальский и Енисейский бассейны и почти на всём протяжении преобразована каскадом крупных водохранилищ.



Ангара в Восточной Сибири. Фото: Ninara / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Кратко

Ангара — единственная река, вытекающая из Байкала, и крупнейший правый приток Енисея.

Длина — около 1779 км; площадь бассейна с водосбором Байкала — около 1,04 млн км².

Средний сток в створе Богучанского гидроузла — 106,8 км³ в год.

Русло разделено Иркутским, Братским, Усть-Илимским и Богучанским водохранилищами.

Каскад ГЭС регулирует уровень и сток, меняет ледовый и температурный режимы и разобщает речные участки.

Ангара — единственная река, вытекающая из Байкала, и крупнейший правый приток Енисея. Она проходит по Иркутской области и Красноярскому краю, связывает Байкальский и Енисейский бассейны и почти на всём протяжении преобразована каскадом крупных водохранилищ.

Подзаголовок: Единственная река, вытекающая из Байкала, и крупнейшая водная артерия Восточной Сибири.

Ангара рассматривается как единая система Байкала, русла, притоков, четырёх водохранилищ и нижнего выхода к Енисею. Такое представление необходимо, поскольку состояние одного створа или водохранилища не характеризует всю реку.

Основные сведения

Длина Ангары по Государственному водному реестру и профильным сводкам составляет около 1 779 км, площадь собственного бассейна вместе с водосбором Байкала — около 1,04 млн км². Река начинается из широкого истока у Листвянки и Байкальска в Иркутской области и впадает справа в Енисей у посёлка Стрелка в Красноярском крае. Она не тождественна Верхней Ангаре: Верхняя Ангара — отдельная река, впадающая в северную часть Байкала.

Ангара переносит основной поверхностный сток Байкала и играет двойную роль: естественного звена водного баланса озера и основы крупного гидроэнергетического каскада. Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Богучанская ГЭС создали водохранилища, которые изменили скорость течения, уровень, температурный и ледовый режимы, миграции рыб, береговые процессы и размещение населения.

Географическое положение

Бассейн расположен в Восточной Сибири. Верхняя и средняя части Ангары лежат в Иркутской области, нижняя — в Красноярском крае. Река направлена

преимущественно на север и северо-запад, пересекая Иркутско-Черемховскую равнину, Лено-Ангарское плато и юго-запад Среднесибирского плоскогорья. Водораздел включает горные районы вокруг Байкала, таёжные плато, степные участки Приангарья и крупные притоки.

В гидрографическом отношении Ангара принадлежит бассейну Енисея и Карского моря. В водохозяйственном управлении верхняя часть вместе с Байкалом относится к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, а нижние участки связаны с деятельностью Енисейского бассейнового водного управления. Границы водохозяйственных участков проходят по створам гидроузлов и не совпадают с обычным делением на верхнее, среднее и нижнее течение.

Исток Ангары и Шаман-камень

Исток расположен в юго-западной оконечности Байкала между Листвянкой и портом Байкал. Глубинная байкальская вода выходит в широкое русло, поэтому расход у истока значительно больше, чем у обычной реки, начинающейся из родника. Шаман-камень — выступ скального порога в истоке; он важен как геоморфологический и культурный объект, но не «удерживает» уровень Байкала в инженерном смысле.

Подпор Иркутской ГЭС распространился до Байкала: озеро и исток работают как часть единой регулируемой системы. Уровень Байкала и расход через гидроузел ограничиваются законодательством и правилами использования водных ресурсов. Фольклорная легенда о дочери Ангаре и отце Байкале относится к культурной традиции; гидрологически исток определяется рельефом, водным балансом озера и работой гидроузла.

Верхнее течение

Верхний участок от Байкала до Иркутской ГЭС сохраняет сильное влияние озёрной воды: низкую минерализацию, сравнительно устойчивый естественный приток и особый температурный режим. Ниже плотины река проходит через Иркутск, принимает Иркут и Ушаковку. Незамерзающие или поздно замерзающие участки связаны с поступлением воды из глубин Байкала и регулируемым сбросом; их протяжённость меняется с температурой воздуха и режимом ГЭС.

Далее Ангара проходит рядом с Ангарском, Усольем-Сибирским и Свирском и переходит в подпор Братского водохранилища. Этот участок наиболее урбанизирован и испытывает влияние коммунальных стоков, химической, нефтехимической, энергетической и бывшей целлюлозно-бумажной промышленности. Оценивать качество воды следует по отдельным створам выше и ниже городов и устьев притоков.

Среднее течение

Средняя Ангара преобразована Братским и Усть-Илимским водохранилищами. Братское водохранилище глубоко заходит в долины Оки, Ии и других притоков, образуя длинные заливы. Скорость течения здесь мала, сезонные колебания уровня определяются полезным объёмом и графиком работы гидроузла. Берега сложены породами разной устойчивости, поэтому на отдельных участках продолжаются оползни и абразия.

Ниже Братской ГЭС сравнительно короткий речной участок переходит в Усть-Илимское водохранилище. Город Братск расположен у гидроузла и на берегах водохранилища; Усть-Илимск связан с одноимённым водохранилищем и промышленным узлом. После затопления прежние пороги и перекаты оказались под водой, а водные сообщества приобрели озёрно-речные черты.

Нижнее течение и устье

Ниже Усть-Илимской ГЭС Ангара поступает в Богучанское водохранилище, которое протянулось через Иркутскую область и Красноярский край. Кодаинск расположен у Богучанского гидроузла. Ниже плотины сохраняется свободнотекущий участок с островами, перекатами и таёжными берегами; его режим всё равно определяется каскадом и боковым притоком.

Устье находится у посёлка Стрелка, где Ангара впадает справа в Енисей. Воды различаются по температуре, прозрачности, минеральному и взвешенному составу и смешиваются постепенно. Богучанский гидроузел влияет на расходы и температуру нижнего участка, но не превращает Ангару в отдельный от Енисея бассейн: она остаётся его наиболее водоносным правым притоком.

Длина, бассейн и расход воды

Значение 1 779 км относится к собственно Ангаре от Байкала до Енисея. Его нельзя складывать с Селенгой и Енисеем и представлять как длину Ангары. Площадь около 1 039 тыс. км² включает огромный водосбор Байкала; площадь непосредственного бокового водосбора ниже озера значительно меньше. Код бассейна в ГВР начинается с 16 и относится к Ангара-Байкальскому бассейновому округу; конкретный код зависит от водохозяйственного участка, поэтому единый участковый код для всей реки не публикуется как универсальный.

Средний расход увеличивается вниз по течению: у истока он отражает сток Байкала, у гидроузлов — приток к конкретному водохранилищу, а у нижних створов учитывает Оку, Тасееву и другие притоки. Государственный доклад о Байкале за 2024 год приводит среднесуточный сток в створах Иркутского, Братского, Усть-Илимского и Богучанского гидроузлов соответственно около 59,9; 91,6; 100,1 и 106,8 км³ в год, что эквивалентно примерно 1 900; 2 900; 3 170 и 3 390 м³/с. В устьевой зоне справочные оценки выше и требуют указания поста и периода.

Притоки Ангары

В верхнем течении справа и слева впадают Иркут, Китой и Белая; они переносят горный сток Восточного Саяна и загрязняющие вещества из населённых и промышленных районов. Ока и Ия впадают в Братское водохранилище и формируют протяжённые заливы; их положение после подпора описывают как впадение в водохранилище на Ангаре. Илим связан с Усть-Илимским водохранилищем.

Тасеева — крупнейший по водности нижний приток, образованный Чуной и Бирюсой; она впадает слева ниже Богучанской ГЭС. К значимым притокам относятся также Мура, Чадобец, Иркиннеева, Кова и Каменка. Берег и длину каждого водотока следует брать из его записи ГВР: одинаковые названия встречаются в разных бассейнах. Тасееву, Оку и Иркут нельзя смешивать с одноимёнными реками европейской части России.

Гидрологический режим

Естественный режим Ангары необычен для сибирской реки: Байкал сглаживает сезонные колебания и обеспечивает значительный зимний сток. Боковые притоки имеют снеговое и дождевое питание, выраженное весенне-летнее половодье и паводки. После создания каскада уровни и расходы определяются сочетанием притока, полезной ёмкости водохранилищ, ограничений по уровням и заданиями водохозяйственного регулирования.

Ниже ГЭС возникают суточные и недельные колебания от энергетического режима. Водоохранилища позже замерзают и раньше вскрываются, чем мелкие озёра; ниже плотин возможны полыньи. Ледостав неодинаков по течению: открытая вода у Иркутска не означает отсутствие льда на Братском или Богучанском водохранилищах. Паводковые риски связаны главным образом с боковыми притоками, заторами и сочетанием притока с ограничениями каскада.

Ангарский каскад ГЭС

Каскад включает Иркутскую, Братскую, Усть-Илимскую и Богучанскую ГЭС. Первые агрегаты введены соответственно в 1956, 1961, 1974 и 2012 годах. Установленные мощности по государственному докладу о Байкале за 2024 год составляют около 761,2; 4 500; 3 840 и 2 997 МВт. Станция, плотина и водохранилище — разные объекты: мощность характеризует оборудование ГЭС, напор — гидроузел, а площадь и объём — водохранилище.

Каскад обеспечивает производство электроэнергии и регулирование стока, но разделил реку плотинами без непрерывного судоходного пути. Затопление долин потребовало переноса поселений и инфраструктуры, затронуло леса, сельскохозяйственные земли и археологические объекты. Экологические последствия включают фрагментацию местообитаний, изменение температуры и наносов, переработку берегов, накопление древесины и перестройку рыбных сообществ.

Иркутская ГЭС и водохранилище

Иркутская ГЭС расположена в Иркутске примерно в 55 км ниже истока. Водоохранилище протянулось к Байкалу; собственная речная часть имеет площадь около 154 км² и полный объём около 2,1 км³. В расширенных водохозяйственных

расчётах Байкал участвует в регулировании как огромная естественная ёмкость, поэтому параметры озера нельзя механически записывать как площадь Иркутского водохранилища.

Подпор изменил исток и прибрежные уровни Байкала. Режим гидроузла должен одновременно учитывать водоснабжение Иркутска, энергетику, безопасность нижнего бьефа и допустимые уровни озера. Сброс глубинной байкальской воды влияет на температуру и ледовые условия ниже плотины.

Братская ГЭС и водохранилище

Братская ГЭС имеет установленную мощность 4 500 МВт. Водоохранилище при НПУ занимает около 5 470–5 480 км², полный объём — около 169,3 км³, полезный — около 35,45–48,2 км³ в зависимости от принятой отметки допустимой сработки и документа. Это один из крупнейших искусственных водоёмов мира по объёму.

Подпор распространился по Ангаре и долинам Оки и Ии. Заполнение сопровождалось затоплением населённых мест, лесов и транспортных связей. Современные проблемы включают переработку берегов, плавающую древесину, изменение рыбных местообитаний, локальное загрязнение заливов и значительные колебания уровня.

Усть-Илимская ГЭС и водохранилище

Усть-Илимская ГЭС мощностью 3 840 МВт начала вводиться в 1974 году. Водоохранилище имеет площадь около 1 922 км², полный объём около 58,8 км³ и полезный около 2,7 км³. Небольшая по сравнению с полным объёмом регулирующая ёмкость означает, что его режим тесно связан с Братским водохранилищем и притоком.

Заливы сформированы в долинах Илима и других рек. На качество воды влияют промышленный узел Усть-Илимска, притоки и затопленное органическое вещество. Длительное пребывание воды способствует осаждению взвеси, но не гарантирует удаления растворённых загрязнителей. Береговая абразия и лесной мусор остаются локальными проблемами.

Богучанская ГЭС и водохранилище

Богучанская ГЭС у Кодинска имеет установленную мощность 2 997 МВт; первые агрегаты введены в 2012 году. Водоохранилище при НПУ 208 м занимает около 2 326 км², протянуто примерно на 375 км, полный объём близок к 58,2 км³, полезный — около 2,3 км³. Правила использования утверждены Росводресурсами и разделяют гидрометеорологические требования, судоходные попуски и ограничения уровней.

Наполнение затопило таёжные долины, участки поселений, леса и археологические территории. Подготовка ложа и оставшаяся древесина влияют на органическое вещество и навигационные риски. После наполнения формируются новые береговые процессы и сообщества, а нижний бьеф получает зарегулированный расход и изменённый температурный режим.

Населённые пункты и транспорт

Иркутск расположен на обоих берегах Ангары ниже истока. Ангарск находится в долине Ангары, но его промышленная территория связана также с притоками и каналами; Усолье-Сибирское и Свирск расположены у верхнего участка и Братского водохранилища. Братск — у Братского гидроузла и водохранилища, Усть-Илимск — у Усть-Илимского, Кодинск — у Богучанского.

Плотины не имеют единой цепи судопропускных сооружений, поэтому судоходство разобщено по отдельным бьефам и водохранилищам. Исторические пороги препятствовали сквозному плаванию, а после затопления появились длинные глубоководные участки, но каскад не стал непрерывной магистралью. Современные перевозки включают местное пассажирское сообщение, снабжение удалённых поселений и технологические грузы.

Природные экосистемы

Верхняя Ангара переносит байкальскую воду в речные сообщества, ниже сменяются острова, пойменные протоки, сосновые и лиственничные леса, заболоченные понижения и скальные берега. Свободнотекущие участки служат экологическими коридорами, тогда как водохранилища образуют новые крупные озёрные экосистемы с заливами, мелководьями и зонами сезонной осушки.

Регулирование изменяет затопление пойм, температуру, перенос органического вещества и наносов. На мелководьях развиваются макрофиты и планктон, в глубоких частях возможна стратификация. Таёжные пожары усиливают поступление золы, растворённого органического вещества и эрозионного материала. Связь с Байкалом требует учитывать охрану всей Байкальской природной территории, а не только воды непосредственно у истока.

Рыбы и водные биоресурсы

Для бассейна характерны хариус, ленок, таймень, щука, окунь, налим, сиговые и другие виды, но состав различается между истоком, притоками, водохранилищами и нижним течением. Байкальские эндемики не должны автоматически включаться в перечень Ангары: их устойчивое обитание ниже истока требует отдельных ихтиологических данных.

Плотины прекратили дальние перемещения и разделили популяции. В водохранилищах возросло значение озёрных и эврибионтных рыб, изменились нерестовые субстраты и кормовая база. Рыбохозяйственные мероприятия включают регулирование вылова, охрану нерестилищ и искусственное воспроизводство, однако выпуск молоди не заменяет сохранение притоков, качества воды и свободнотекущих участков.

Качество воды

Качество воды неодинаково по створам. У истока оно в значительной мере определяется Байкалом; ниже Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и промышленных узлов возрастает влияние коммунальных и промышленных выпусков. Государственный мониторинг оценивает кислородный режим, органическое вещество, соединения азота и фосфора, нефтепродукты, фенолы, металлы и специфические вещества. Класс качества необходимо сопровождать годом, постом и перечнем нормируемых показателей.

Государственные доклады 2023–2024 годов показывают локальные различия между верхней Ангарой, заливами Братского и Усть-Илимского водохранилищ и нижними участками. Притоки способны приносить более загрязнённую воду, чем основное русло; в заливах с медленным обменом накапливаются взвесь и

органическое вещество. Формулировка «вода Ангары чистая» или «вся Ангара загрязнена» методически неверна.

Источники загрязнения

Коммунальные очистные сооружения приносят органическое вещество, биогенные элементы и микробиологическую нагрузку при недостаточной очистке. Нефтехимия, химическая промышленность, энергетика, горнодобывающие и лесоперерабатывающие производства формируют разные наборы загрязнителей. Конкретное предприятие можно связывать с воздействием только по официальным разрешениям, мониторингу, надзорным материалам или судебным решениям.

Особое значение имеет накопленный вред в Усолье-Сибирском и других промышленных территориях; его ликвидация требует контроля поверхностных и подземных вод. Ливневый и талый сток переносит нефтепродукты, соли и взвесь. Затопленная древесина и береговая эрозия увеличивают органическую нагрузку, но не являются эквивалентом токсичного промышленного сброса.

Экологические проблемы

Ключевая системная проблема — почти полное зарегулирование: природная река разделена водохранилищами, изменены температура, лёд, наносы, уровни и миграции рыб. Затопление преобразовало долины и местообитания, а сезонная сработка создаёт широкие осушаемые полосы. Береговая переработка угрожает инфраструктуре и вносит взвесь; плавающая древесина мешает судоходству и локально меняет кислородный режим.

Другие проблемы — неоднородное качество воды, накопленный промышленный вред, загрязнённые донные отложения, пожары и эрозия в бассейне.

Климатическое потепление меняет сроки льда, соотношение снегового и дождевого стока и температуру воды, но последствия зависят от управления каскадом. Ни одно отдельное маловодье или паводок нельзя объяснять только климатом без атрибуционного исследования.

Связь Ангары и Байкала

Ангара — единственный поверхностный сток Байкала и главная расходная часть его водного баланса после испарения. Объём сброса через Иркутский гидроузел связан с притоком в озеро и допустимым диапазоном уровня. Чрезмерное удержание воды повышает уровни и риски для берегов, чрезмерный сброс снижает уровень и воздействует на мелководья, дельты притоков и водопользование.

Правовое регулирование включает федеральный закон об охране Байкала, постановления о предельных уровнях и правила использования водных ресурсов каскада. Временные решения в экстремально многоводные или маловодные периоды должны иметь срок и обоснование. Ангара нельзя управленчески отделять от Байкала: изменение истокового расхода одновременно влияет на озеро, Иркутск и все нижние гидроузлы.

Водоснабжение и хозяйственное использование

Ангара обеспечивает питьевое и промышленное водоснабжение Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска и других населённых пунктов, гидроэнергетику, рыбное хозяйство, рекреацию и локальный транспорт. Каскад поддерживает энергосистему Сибири и крупную промышленность, но водопользование ограничено санитарными, экологическими и уровенными требованиями.

Водозабор требует зон санитарной охраны и технологической подготовки воды. Промышленный оборотный цикл уменьшает забор и сброс, но не отменяет контроль. Рекреация создаёт нагрузку на берега, отходы и риск пожаров. Экономическая ценность воды не означает допустимость необратимого ухудшения экосистем.

Особо охраняемые природные территории

Исток Ангара связан с центральной экологической зоной Байкальской природной территории и объектом Всемирного наследия UNESCO «Озеро Байкал». Прибайкальский национальный парк охраняет побережья у юго-западной части озера и близкие водосборы, однако границы конкретных участков следует проверять по официальной карте. В бассейне притоков расположены Тофаларский

заказник и другие территории Восточного Саяна, сохраняющие истоки и таёжные экосистемы.

На нижней Ангаре и притоках охраняются таёжные, болотные и речные комплексы региональных ООПТ Красноярского края. В статью не включаются Байкальский заповедник или удалённые заповедники только по признаку нахождения в регионе: прямая гидрологическая связь должна быть подтверждена водосбором. ООПТ не заменяют водоохранные зоны и режим всей Байкальской природной территории.

Мониторинг и управление

Росгидромет^[6] и Иркутское УГМС ведут наблюдения за уровнями, расходами и качеством воды. Росводресурсы^[5]^[4] и Енисейское бассейновое водное управление^[2]^[1] устанавливают режимы гидроузлов, ведут ГВР и СКИОВО. Региональные органы контролируют природопользование, Росприроднадзор — соблюдение федеральных требований, Росрыболовство и научные организации — состояние биоресурсов.

Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН^[8] исследует бассейн и антропогенные преобразования; Лимнологический институт СО РАН^[9] — Байкал и исток; Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева — управление каскадом; Институт земной коры — геологические и береговые процессы. Мониторинг объединяет посты, лабораторный анализ, дистанционное зондирование, модели притока и обследование берегов.

Изменение климата

Рост температуры воздуха сокращает продолжительность ледового периода и влияет на испарение. Изменение снега, летних осадков и частоты пожаров перераспределяет приток с огромного водосбора Байкала и боковых рек. На нижнем бассейне многолетняя мерзлота встречается мозаично; её деградация способна влиять на устойчивость склонов и состав стока, но эффект зависит от местных грунтов.

Каскад сглаживает часть колебаний, одновременно затрудняя отделение климатического сигнала от управленческого. Для оценки нужны многолетние ряды

естественного притока, температуры, льда и осадков. Адаптация включает обновление правил регулирования, прогноз паводков, защиту берегов, контроль пожаров и сохранение притоков.

История освоения и культура

Берега Ангары издавна использовали эвенки, буряты и другие народы. Русские остроги и поселения появились в XVII веке, затем развивались торговля, судоходство, лесная и горная промышленность. Строительство каскада в XX–XXI веках радикально изменило долины, транспорт, расселение и хозяйство; часть старых поселений и культурных ландшафтов оказалась в зоне затопления.

Название обычно связывают с эвенкийскими и бурятскими гидронимами, обозначающими разинутую пасть или ущелье, но этимологии имеют варианты. Легенда об Ангаре, убежавшей от Байкала к Енисею, является фольклором. Она объясняет культурное восприятие истока, а не физику стока.

Интересные факты

Ангара — единственный поверхностный сток Байкала. Её собственная длина около 1 779 км, а не длина системы Селенга — Байкал — Ангара — Енисей. У истока течение формируется водой огромного озера, поэтому сезонность сглажена. Незамерзающая вода у Иркутска связана с температурой байкальского стока и работой ГЭС. Четыре гидроузла разделяют реку на отдельные бьефы.

Братское водохранилище имеет полный объём около 169,3 км³. Исторические пороги средней Ангары скрыты подпором. Богучанское водохранилище — самое молодое в каскаде. Верхняя Ангара не является верховьем Ангары, а впадает в Байкал. Шаман-камень — природно-культурный объект, а не инженерный регулятор уровня озера.

Источники

Российские официальные и научные источники

1. Енисейское бассейновое водное управление СКИОВО бассейна реки Ангара, включая озеро Байкал: приказ и водохозяйственные балансы, 2023. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
2. Енисейское бассейновое водное управление Материалы СКИОВО и НДВ бассейнов Ангары и Байкала, 2023. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
3. Правительство Российской Федерации Постановление № 234 о предельных значениях уровня воды в озере Байкал, редакция 2025 года, 2025. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
4. Росводресурсы Братское водохранилище: официальная карточка и нормативные параметры, 2026. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
5. Росводресурсы Правила использования водных ресурсов Богучанского водохранилища, 2015. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
6. Росгидромет Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации, 2024. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
7. Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН Система каскадного моделирования режимов работы Ангарских ГЭС, 2025. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
8. Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН География Иркутской области: водные ресурсы и Ангарский каскад, 2024. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
9. Лимнологический институт СО РАН Биогенные элементы в Байкале и вынос фосфора водами Ангары, 2026. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
10. Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН Моделирование зон затопления в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, 2017. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
11. Институт земной коры СО РАН Геохимия воды Ангарских водохранилищ и гидрохимические исследования: публикации 2018 года, 2018. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
12. Водные ресурсы Иркутское водохранилище: история создания и гидрохимические исследования водотоков и заливов, 2024. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15
13. ВНИРО Рекомендации по искусственному воспроизводству водных биоресурсов Байкальского рыбохозяйственного бассейна на 2027–2029 годы, 2026. [Открыть источник](#)
Дата обращения: 2026-07-15

14. ВНИРО Динамика видового состава ихтиофауны Богучанского водохранилища, 2023.

[Открыть источник](#)

Дата обращения: 2026-07-15

Международные и зарубежные источники

15. UNESCO World Heritage Centre Lake Baikal, World Heritage property 754, 2026. [Открыть](#)

[источник](#)

Дата обращения: 2026-07-15

16. Wikimedia Commons The Angara River (1): image and license metadata, 2009. [Открыть](#)

[источник](#)

Дата обращения: 2026-07-15

17. Encyclopaedia Britannica Angara River: geographic overview, 2026. [Открыть источник](#)

Дата обращения: 2026-07-15

18. Energy Systems Research Modeling the Angara-Yenisei Cascade Operations Based on Firm Winter Power Output Maximization, 2026. [Открыть источник](#) DOI:

10.25729/esr.2026.01.0010

Дата обращения: 2026-07-15

[Сообщить об ошибке](#)

ГЛАВНОЕ

01 **От 31,6% до 91,6%: как исполняется бюджет нацпроекта «Экологическое благополучие»**

9 сентября, 14:32

02 **Владимир Путин: «Мы будем следить за соблюдением высоких экологических требований»**

3 сентября, 21:32

03 **Владимир Путин назвал природу Дальнего Востока основой для развития туризма**

3 сентября, 13:30

04 **Минприроды опубликовало вызвавший споры проект стратегии развития ООПТ**

2 сентября, 08:54



Российский
Лесотехнический
Форум

Отраслевой форум
лесопромышленного комплекса
и деревообрабатывающей индустрии

7–8 октября 2026

Москва, Конгресс-центр
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Подробнее на сайте

rupaperweek.moscow/fortechforum

ЭкоМонитор

Москва [Сменить](#)
Москва

Данные собираются...

Данные собираются...

Связанные термины

Байкал



Адаптация к изменению климата



Антропогенное загрязнение



Аккумуляция загрязняющих веществ



Аэробные микроорганизмы



Анаэробные микроорганизмы



Водные объекты по алфавиту

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
Ж	З	И	Й	К	Л	М
Н	О	П	Р	С	Т	У
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Э
Ю	Я	0–9				

По теме на НИА «Экология»



11 августа 2025, 09:41

На берегу Ангары собрали 1,5 тонны мусора, установили скамейки и урны из переработанного пластика



10 февраля 2025, 14:08

Из Ангары подняли судно, пролежавшее на дне реки 30 лет



21 февраля 2023, 17:11

В этом году завершится реконструкция очистных на берегу Ангары



25 июня 2024, 09:06

Братское водохранилище очистят от рыболовных сетей



18 марта 2024, 18:01

Ангару загрязняют опасными отходами

Все материалы →



Национальное информационное
агентство

Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-
80306

- Категория материалов 18+

РЕДАКЦИЯ

О редакции

Общие вопросы —
info@nia.eco

Сотрудничество —
eco@nia.eco

ИЗДАНИЕ

Контур событий

Главная

Новости

[Политика конфиденциальности и cookies](#) [Настройки cookies](#) [Список запрещённых в РФ организаций](#)

© 2026 — НИА «Экология». Все права защищены. Дизайн: [nia.eco](#)

При копировании материалов ссылка на [nia.eco](#) обязательна.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.