



Цитология, 2022, Т. 64, № 1, стр. 36–46

ИММУНОЛОКАЛИЗАЦИЯ BDNF, GDNF И NT-3 В ТЕМЕННОЙ КОРЕ КРЫСЫ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ОККЛЮЗИИ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ

С. Г. Калиниченко^{1,*}, А. В. Коробцов¹, Н. Ю. Матвеева¹

¹ Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ
690002 Владивосток, Россия

* E-mail: sgkalinichenko@gmail.com

Поступила в редакцию 17.10.2021

После доработки 05.11.2021

Принята к публикации 08.11.2021

EDN: [SUMABT](#)

DOI: [10.31857/S0041377122010047](#)



Полный текст (PDF)

[Аннотация](#)

[Полный текст](#)

[Список литературы](#)

[Дополнительные материалы](#)

Аннотация

Исследовали иммунолокализацию нейротрофического фактора мозга (BDNF), нейротрофина-3 (NT-3) и глиального нейротрофического фактора (GDNF) в теменной коре крыс на модели фокального инсульта, вызванного постоянной окклюзией средней мозговой артерии. Пространственная плотность маркированных клеток постоянно варьирует по слоям коры и на разных сроках ишемического процесса, демонстрируя в ядре инсульта и пенумбре противоположные топографические тренды. Для всех исследованных нейротрофинов характерна значительная редукция иммунореактивных клеток в IV–VI слоях коры в первые и третьи сутки ишемии. В супрагранулярных слоях их количество остается относительно стабильным, либо слегка снижается по сравнению с контролем. На 8-е сут ишемии в ядре инсульта нейротрофины в нейронах почти не выявляются, а в пенумбре возникает индукция иммунореактивности. В пенумбре NT-3-иммунореактивные нейроны превалируют в слоях II–III, BDNF выявляется в нейронах слоев II–III и V, а основную популяцию GDNF-иммунореактивных клеток составляют астроциты. Топография нейротрофинов в контралатеральном полушарии повторяет паттерн их локализации в области пенумбры. Неоднородная стратификация нейротрофинов и их избирательная реакция на ишемическое повреждение определяются их различным участием в поддержании цитопротективных и нейродеструктивных эффектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейротрофический фактор мозга BDNF, нейротрофин-3 NT-3, глиальный нейротрофический фактор GDNF, селективная нейропротекция, окклюзия средней мозговой артерии, инсульт

Инструменты

[следующая статья выпуска](#)


[предыдущая статья выпуска](#)

[содержание выпуска](#)



[Информация о журнале](#)

[Отправить рукопись в журнал](#)



[Пользовательское соглашение](#)

Свяжитесь с нами



info@sciencejournals.ru

Время работы



Пн.-пт.: 10.00-19.00

Сб., вс.: выходные дни