

Ваш регион:



Скачать
каталог

Где
купить?

8 (800) 200-33-
22



Россия



О компании

Медицинская техника

Ортопедическая продукция

Медицинская техника

Ортопедическая продукция

Тонометры

Пульсоксиметры

Ингаляторы

Термометры

Гигиена полости рта

Приборы для детей

Массажеры

Увлажнители воздуха

ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ ДАВЛЕНИЕ. НОРМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РАЗНИЦЫ МЕЖДУ НИМИ

29.12.2023

Сердце — это настоящий мышечный «мотор», который выбрасывает кровь в кровяное русло. В процессе движения крови по сосудам на их стенки оказывается определенное давление, которое и называется артериальным. Эталонным показателем АД здорового человека принято считать 120/80 мм.рт.ст. Но в жизни этот показатель не может оставаться стабильным, и меняется под воздействием определенных факторов. Эта статья поможет вам разобраться в том, какие показатели АД считаются нормальными, что такое верхнее и нижнее давление, и как правильно его измерять.

8 (800) 200 33 22




Что такое верхнее и нижнее артериальное давление

Анатомически сердце состоит из предсердий и желудочков. Его работа предполагает две фазы:

1. Сокращение (систола). В этой фазе происходит выброс крови в сосуды и ее дальнейшая транспортировка к органам и тканям.
2. Расслабление (диастола). В этой фазе происходит расслабление сердца.

В зависимости от этих фаз артериальное давление тоже делится на два вида:

1. Систolicеское артериальное давление (САД, верхнее давление). Этот показатель отображает силу, с которой кровь давит на сосудистую стенку во время систолы.
2. Диастolicеское давление (ДАД, нижнее). Этот показатель отображает силу, с которой кровь давит на сосудистую стенку в момент диастолы.



Систолическое и диастолическое давление — это важные показатели здоровья сердечно-сосудистой системы. Измеряя АД, важно обращать внимание на каждый из этих показателей. В некоторых случаях они оба повышены или понижены, но иногда меняется только один показатель (например, только высокое верхнее давление или низкое нижнее давление). Например, верхнее давление низкое может быть при некоторых болезнях сердца и щитовидной железы, а высокое нижнее давление может быть сигналом инсульта.

Второй важный показатель, на который нужно обращать внимание при измерении АД — разница между верхним и нижним давлением. Его норма составляет 30-50 мм.рт.ст. Снижение этого показателя может быть симптомом атеросклеротической болезни или заболеваний почек, а повышение иногда сопровождает эндокринные патологии и болезни опорно-двигательной системы.

Норма систолического и диастолического давления

Артериальное давление — это нестабильный показатель. Он зависит от возраста человека, скорости и частоты сердечных сокращений, состояния кровеносных сосудов и многих других внешних и внутренних факторов. Эти факторы меняются в течение всего дня, поэтому АД меняется тоже.

Разобраться подробнее с тем, какое нормальное верхнее давление и нижнее, поможет эта таблица:




ВОЗРАСТ	СИСТОЛИЧЕСКОЕ АД		ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ АД	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
до 1 года	96	95	66	65
1-10 лет	103	103	69	70
10-20 лет	123	116	76	72
20-30 лет	126	120	79	75
30-40 лет	129	127	81	80
40-50 лет	135	137	83	84
50-60 лет	142	144	85	85
60-70 лет	145	159	82	85
70-80 лет	147	157	82	83
80-90 лет	145	150	78	79

Правила измерения артериального давления

Чтобы процедура измерения артериального давления была комфортной, а показатель АД был максимально точным, мы рекомендуем придерживаться следующих правил:

- Отдых. За 30 минут до измерения АД нужно воздержаться от физической нагрузки, стресса, эмоциональных переживаний, курения. В момент процедуры вы должны быть расслаблены и спокойны.
- Правильное положение тела. Измерять давление нужно в положении сидя. Лучше всего сесть на стул, не скрещивая ноги, и положить руку, на которой будет фиксироваться манжета, на ровную поверхность. Рука должна быть на уровне сердца.
- Фиксация манжеты. Манжета крепится на плече на 1-2 см выше локтевой ямки. Она должна быть зафиксирована надежно, но при этом не передавливать плечо и кровеносные сосуды.
- Тишина и покой. Во время измерения давления важно оставаться в неподвижном положении и не разговаривать. Любое движение может нарушить процедуру и вы получите недостоверный показатель АД.
- Трехкратное измерение. Кардиологи рекомендуют измерять артериальное давление три раза подряд с промежутком в 2-3 минуты между каждым измерением. Среднее значение этих показателей будет самым достоверным.



Если вы ведете дневник артериального давления, то после процедуры запишите полученный показатель АД. Зафиксируйте систолическое и диастолическое давление, время измерения, свое самочувствие и прием лекарственных препаратов.

Важной составляющей правильного, точного и комфортного измерения артериального давления является надежный тонометр. Выбирая тонометр B.Well, вы приобретаете домашнего помощника, который сделает рутинный контроль давления легкой и быстрой процедурой.

Тонометр B.Well PRO-33 — на страже вашего давления!

Если вы хотите контролировать свое давление или облегчить эту процедуру своим близким людям — выбирайте автоматический тонометр B.Well PRO-33. Прибор разработан швейцарскими экспертами и рекомендован к использованию Российским кардиологическим обществом. Он рекомендован для использования как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.





- Технология Intellect Classic. Эта технология обеспечивает комфортное измерение давления и получения максимально точного показателя. Тонометр автоматически определяет нужный уровень накачки воздуха в манжету, благодаря чему предотвращается пережатие плеча.
- Индикатор аритмии. Помимо систолического и диастолического давления тонометр позволяет оценить сердечный ритм. Если прибор зафиксирует нарушение пульса и ритма — он проинформирует об этом пользователя соответствующим сообщением на дисплее.
- Универсальная манжета. Размер манжеты 22-42 см подходит для пользователя с любым телосложением.
- Простое управление. Тонометр оснащен всего одной кнопкой, с помощью которой и происходит активация прибора. Для измерения артериального давления достаточно нажать на кнопку, все остальные манипуляции тонометр сделает сам. Пользователю останется только посмотреть на экран и оценить полученный показатель АД.
- Индикатор разряда батареи. Если заряд тонометра будет близок к нулю — прибор сообщит об этом и «попросит» подключиться к сети для зарядки.

*#артериальное давление #давление #давление человека повышенное #дневник давления
#измерение давления #контроль давления #низкое давление #снижать давление*

Поделитесь статьёй с друзьями



< **Предыдущая** **Следующая** >

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ

04.07.2018

06.07.2018

05.10.2017

Ваш регион:



Скачать
каталог

Где
купить?

8 (800) 200-33-22



Россия



ТОНОМЕТРЫ ВРЕПДА
B.WELL ПРОШЛИ
ТЕСТИРОВАНИЕ
РОССИЙСКИМ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ
ОБЩЕСТВОМ

КАК ПРАВИЛЬНО
ИЗМЕРЯТЬ
АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ
ТОНОМЕТРОМ
СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ

КАКОЙ ТОНОМЕТР
КУПИТЬ ДЛЯ ДОМА И
СЕМЬИ?



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

О КОМПАНИИ

B.Well Swiss
Новости

ПОДДЕРЖКА

Сервисные центры
Документация
Помощь в выборе
Статьи и Рекомендации

ГДЕ КУПИТЬ

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Тонометры
Пульсоксиметры
Ингаляторы и небулайзеры
Термометры
Гигиена полости рта
Приборы для детей
Массажеры
Увлажнители воздуха

ЛИНИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ

Линия MED
Линия PRO
Линия TECHNO

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ КОНТАКТЫ

Бандажи и корсеты
Компрессионный трикотаж
Стельки и корректоры стопы
Опоры
До и после операции
Беременность и роды

ЛИНИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Линия CARE
Линия MED
Линия ORTHO
Линия PRO

Центральный офис
Офисы в России
Обратная связь

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
САЙТА

ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ
ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Служба заботы
B.Well

8 800 200-33-22
Время работы:
пн-пт с 07:00 до 21:00

Реквизиты

АО «Альфа-Медика»
ОГРН 1027700167868
ИНН 7726235982
КПП 774301001

Присоединяйтесь
к нам!

