

Энергетическая динамика и фенология размножения бесхвостых земноводных: выводы из динамической игры

Получить доступ

Шеннон Дж. Макколи ✉, Сара С. Бушар, Брайан Дж. Фарина, Кавита Исваран, Сухель Куадер, Дэниел У. Вуд, Колетт М. Сент-Мэри

Поведенческая экология, том 11, выпуск 4, июль 2000 года, страницы 429–436, <https://doi.org/10.1093/beheco/11.4.429>

Опубликованный: 01 июля 2000 года **История статьи** ▼

Абстрактный

Мы разработали модель динамической оптимизации для изучения фенологии размножения бесхвостых земноводных. Мы оценили последствия для приспособленности самцов, использующих одну из четырех альтернативных стратегий: призывание, сопровождение, поиск пищи или укрытие. На поведение самцов потенциально влияют различные факторы, в том числе запас энергии, риск стать добычей хищника, затраты на призывание, вероятность найти пищу, распределение самцов по энергетическому состоянию в популяции и вероятность дожить до следующего сезона размножения. Мы варьировали эти параметры, чтобы определить, насколько сильно каждый из них влияет на фенологию размножения и структуру хора. Манипулируя параметрами, связанными с энергетическими затратами и выгодами от принятия индивидуальных решений, мы смоделировали три основных типа фенологии размножения бесхвостых земноводных: взрывной, непрерывный и продолжительный с эпизодическим пением. Повышение вероятности успешного поиска пищи привело к переходу от взрывного типа размножения к продолжительному с эпизодическим пением. Снижение затрат на пение привело к непрерывному пению. Наша модель предсказывает, что сателлитное поведение будет редкой стратегией, к которой прибегают особи с

Полный

Помощь

относительно низким запасом энергии. Кроме того, особи, использующие стратегию «спутника», должны чередовать «спутничество», поиск пищи и брачные крики в зависимости от уровня энергии. Наши результаты показывают, что энергетические затраты на размножение и ограниченность ресурсов могут быть решающими факторами, влияющими на фенологию пения бесхвостых земноводных. Мы предполагаем, что в зависимости от доступности ресурсов самцы принимают решения, руководствуясь двумя стратегиями: стратегией минимизации голода и стратегией максимизации энергетического состояния.

Раздел Проблем: [Статья](#)

Международное общество поведенческой экологии

В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.

Войти

 [Получить помощь с доступом](#)

Личный кабинет

- Войдите, используя адрес электронной почты/имя пользователя и пароль
- Получать оповещения по электронной почте
- Сохранить поисковые запросы
- Купить контент
- Активировать код покупки/пробной версии
- Добавьте свой идентификатор ORCID

Войти

[Зарегистрироваться](#)

Институциональный доступ

Sign in through your institution

[Войдите с помощью читательского билета](#)

[Войдите, указав имя пользователя и пароль](#)

[Обратитесь за помощью к библиотекарю](#)

Полный

[Помощь](#)

**Управление
корпоративным
аккаунтом**

[Войдите в систему как
администратор](#)

Purchase

[Subscription prices and ordering for this journal](#)

[Purchasing options for books and journals across Oxford Academic](#)

Short-term Access

To purchase short-term access, please sign in to your personal account above.

Don't already have a personal account? [Register](#)

Energetic dynamics and anuran breeding phenology : insights from a dynamic game - 24 Hours access

EUR €53.00

GBP £44.00

USD \$58.00

Rental

This article is also available for rental through DeepDyve.



Полный

[Помощь](#)