




Локтионов Андрей Геннадьевич — пластический хирург в Москве | абдоминопластика, бодилифт, липосакция, липофиллинг, маммопластика > Блог >
Анатомия молочной железы женщины: как устроена грудь и что влияет на её размер и форму

Анатомия молочной железы женщины: как устроена грудь и что влияет на её размер и форму

Рассказываю в статье о том, как устроены молочные железы и что влияет на их изменения во время беременности, похудения или, наоборот, набора веса.



Анатомия молочных желез: строение, функции и изменения

У человека в норме присутствует одна пара молочных желез. Однако иногда встречается атактистическое явление — добавочные молочные железы. Они могут располагаться в подмышечной области или на животе, часто только с одной стороны, при этом могут отсутствовать сосок и ареола. У мужчин молочные железы остаются рудиментарными на протяжении всей жизни, тогда как у женщин они начинают активно развиваться с наступлением полового созревания.

Этапы развития молочных желез

Молочные железы проходят несколько стадий развития. У младенцев обоих полов они практически идентичны. В подростковом возрасте, с началом гормональных изменений и работы яичников, начинается их активный рост. С приходом менструаций ткань желез подвергается регулярным циклическим трансформациям в зависимости от фаз цикла.



В период менопаузы железистая ткань постепенно заменяется жировой – этот процесс называется инволюцией. Максимального развития молочные железы достигают во время беременности, однако их основная функция – лактация – активизируется только после родов.

Строение и расположение молочных желез

Молочная железа расположена на передней поверхности грудной клетки, впереди от фасции большой грудной мышцы, с которой она соединена рыхлой соединительной тканью, обеспечивающей ее подвижность. Внутри железы проходят поддерживающие связки Купера, которые формируют каркас груди и вплетаются в глубокие слои кожи.

У женщин молочные железы размещены симметрично по обеим сторонам грудной клетки, между III и VI ребром, доходя медиально до грудины, а латерально – до средней подмышечной линии.

На передней поверхности железы, немного книзу от центра, расположен сосок (*papilla mammae*), который содержит выходные отверстия млечных протоков. Вокруг него находится пигментированный участок кожи – ареола (*areola mammae*). В структуре ареолы и соска присутствуют мышечные волокна, которые сокращаются, помогая выделению молока при грудном вскармливании.

По строению молочная железа относится к сложным альвеолярно-трубчатым железам. В ее составе насчитывается от 15 до 20 долек, каждая из которых соединена с соском посредством отдельного млечного протока. В ретроареолярной области протоки расширяются, образуя небольшие резервуары для молока, что особенно важно в период лактации.

Кровоснабжение молочных желез

Молочные железы получают питание от нескольких артерий:

- внутренней грудной артерии,
- латеральной грудной артерии,
- межреберных артерий.

Венозный отток осуществляется по системе сосудов, часть из которых сопровождает артерии, а другая часть образует поверхностную венозную сеть.

Размер и форма молочных желез

Форма и размер молочных желез у каждой женщины индивидуальны. При этом сама железистая ткань занимает меньший объем, чем вся грудь, так как значительная часть объема определяется толщиной подкожного жирового слоя.

Форма груди зависит от плотности соединительнотканной капсулы, поддерживающей железу, а также от состояния связок Купера. Эти факторы определяют, будет ли грудь упругой или склонной к птозу (опущению).

Важно понимать, что размер и форма молочных желез не влияют на способность женщины к грудному вскармливанию. Однако они играют значительную роль в восприятии женской привлекательности.

Размер груди обычно выражается в цифрах, соответствующих размерам бюстгалтеров. Средний объем груди составляет около 80 см в обхвате. Интересный факт: левая грудь часто немного больше правой, и асимметрия в пределах 1-2 размеров считается нормой, а не патологией.

Если же асимметрия молочных желез вызывает эстетический или психологический дискомфорт, можно рассмотреть хирургическую коррекцию. Однако врачи не рекомендуют проводить операции до 18-20 лет, поскольку окончательное развитие груди завершается к 20-25 годам.

Изменения молочных желез в период беременности и лактации

На протяжении менструального цикла молочная железа подвергается гормональным колебаниям, но наиболее значительные изменения происходят во время беременности.

- Уже ко второму месяцу беременности наблюдается увеличение ареолы и усиление ее пигментации.
- Внутри железы активно разрастаются железистые структуры, подготавливаясь к лактации.
- К моменту родов молочные железы достигают максимального объема и полностью перестраиваются для выработки молока.

В среднем размер молочной железы у женщин составляет 10-12 см в поперечнике, 2-3 см в толщину, а вес варьируется от 150 до 200 г у нерожавших.

Заключение

Анатомия молочных желез – сложная и уникальная система, изменяющаяся на протяжении жизни женщины. Их развитие, форма и функциональность напрямую зависят от возраста, гормонального фона и индивидуальных особенностей организма. Независимо от внешних характеристик, главная биологическая роль молочных желез – обеспечение грудного вскармливания. Однако их эстетическое значение также неоспоримо, и при необходимости современные методы пластической хирургии позволяют скорректировать их форму и размер, обеспечивая не только красоту, но и уверенность в себе.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

Позвонить

Написать в WhatsApp

Пластика тела

Абдоминопластика

Маммопластика

Липосакция

Липофилинг

Лабиопластика

Фемороластика

Бодилифт

Комплексная пластическая операция

О хирурге

О враче

Мои работы

Цены

Блог

Отзывы

Пациентам

Услуги и цены

Пластика тела

Абдоминопластика

Маммоластика

Липосакция

Липофилинг

Брахиопластика

Лабиопластика

Фемороластика

Бодилифт

Комплексная пластическая операция



 Карта сайта

 Политика обработки персональных данных

 Согласие на рассылку

 Согласие на обработку персональных данных

Контакты


+7 (495) 222 03 66

+7 (985) 525 99 97

(Viber, WhatsApp, Telegram)

information@dr-loktionov.ru

Университетская клиническая больница № 1 Клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова



В Телеграм канал добавил НОВОЕ видео с операцией >>



